

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الجزء الثاني

الرياضيات

السنة الاولى من التعليم الثانوي

الشعب

• رياضيات

• رياضيات تقنية

• علوم



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية والتكوين

الرِّياضِياتُ

السنة الأولى من التعليم الثانوي

الجزء الثاني

الشعب

رياضيات .

رياضيات تقنية .

علوم .



المعهد التربوي الوطني - الجزائر

1989 - 1988

الباب السادس

المعادلات والمتراجحات

20. كثيرات الحدود

21. المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى

22. المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية

23. جمل معادلات وجمل متراجحات

تعتبر المواضيع الواردة في هذا الباب من أهم المواضيع المدروسة في السنة الأولى من التعليم الثانوي ، إذ أنها تمكن التلميذ من التحكم في آليات الحساب الجبري مثل النشر ، التحليل والاختزال . وتدربه على الاستعمال الدقيق والسليم للتكلفوات والاستلزمات وأنها تزوده بالوسائل والأدوات الرياضية التي يحتاج إليها في الدراسات المقبلة ، إذ لها تطبيقات كثيرة ومفيدة مثلاً في دراسة الدوال وفي دراسة إشارة المشتقفات .

1 - كثيرات الحدود لمتغير حقيقي :

1.1 - وحدات الحد لمتغير حقيقي

التعريف

إذا كان A عدداً حقيقياً وكان \mathcal{D} عدداً طبيعياً فإن : الدالة التي ترافق بكل عدد حقيقي s العدد الحقيقي A^s تسمى دالة وحدة الحد .

- العدد الحقيقي A^s يدعى وحدة الحد للمتغير الحقيقي s .
- العدد الحقيقي A يسمى معامل وحدة الحد A^s .
- إذا كانت $A \neq 0$ فإن العدد الطبيعي \mathcal{D} يسمى درجة وحدة الحد A^s .
- إذا كان $A = 0$ فإن وحدة الحد A^s يسمى وحدة المعدوم .
نلاحظ أن درجة وحدة المعدوم غير معينة .
- وحدات الحد التي لها نفس الدرجة تسمى وحدات الحد المتشابهة .
- أمثلة :

(1) $-2s^3$ هو وحدة درجته 3 ومعامله (-2)

(2) $(2s-1)^2$ هو وحدة درجته 4 ومعامله (1-2)

(3) كل عدد حقيقي ثابت A هو وحدة درجته 0 ومعامله 1 .

(4) $\frac{1}{s^2}$ ليس وحدة حدة لأنها لا يمكن كتابتها على الشكل $s^{\mathcal{D}}$ مع \mathcal{D} عدد طبيعي .

2.1 - كثيرات الحدود لمتغير حقيقي

التعريف

كثير الحدود للمتغير الحقيقي s هو مجموع وحدات حد للمتغير الحقيقي s .

مثال :

$$ك(s) = -4s^2 + 5s^5 + s^3 - 3s^2 + 2s - s^3 - 8s + 4.$$

ك(s) هو كثير حدود للمتغير الحقيقي s .

باستعمال قواعد الحساب في ح يمكن كتابته كما يلي :

$$ك(s) = 5s^5 - 7s^2 - 6s - 4.$$

وهذه الكتابة تسمى **الشكل المبسط والمرتب** لكثير الحدود ك(s)

• الدالة كثير الحدود .

الدالة تا التي ترقى بكل عدد حقيقي س كثير الحدود تا(s) تسمى دالة كثير الحدود .

• كثير الحدود المعادوم

كثير الحدود المعادوم هو كثير حدود تا(s) يتحقق ما يلي :

$$\forall s \in \mathbb{H} : \quad تا(s) = 0$$

• الكتابة العامة لكثير حدود مبسط غير معادوم .

يمكن كتابة أي كثير حدود تا(s) مبسط ومرتب وغير معادوم على الشكل العام التالي :

$$تا(s) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n s^n \quad \text{حيث } a_0 \neq 0$$

• العدد الطبيعي n يسمى درجة كثير الحدود تا(s) .

• وحدات الحد $a_n s^n$; $a_{n-1} s^{n-1}$; ... ; $a_1 s$; a_0 تسمى

حدود كثير الحدود تا(s) .

• الأعداد الحقيقية a_0, a_1, \dots, a_n تسمى معاملات كثير الحدود تا(s) .

1) كل كثير حدود من الدرجة الأولى يكتب على الشكل العام :
 $a_1 s + b$ حيث $a_1 \neq 0$

2) كل كثير حدود من الدرجة الثانية يكتب على الشكل العام :
 $a_2 s^2 + a_1 s + b$ حيث $a_2 \neq 0$

3) كل كثير حدود من الدرجة الثالثة يكتب على الشكل العام :
 $a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + b$ حيث $a_3 \neq 0$

درجتا مجموع وجداء كثيري حدود

نذكر فيما يلي نتائجتين تتعلقان بدرجتي مجموع وجداء كثيري حدود .
• إن درجة مجموع كثيري حدود هي أصغر من أو تساوي درجة كثيري الحدود الذي له أكبر درجة

مثلاً : إذا كان

$$1) \text{Ta}(s) = s^2 - s \quad \text{و} \quad \text{Ha}(s) = -s^2 + 2s + 1$$

فإن $\text{Ta}(s) + \text{Ha}(s) = s + 1$

نلاحظ في هذا المثال أن درجة $(\text{Ta}(s) + \text{Ha}(s))$ تساوي 1 وهي أصغر من درجتي $\text{Ta}(s)$ و $\text{Ha}(s)$.

$$2) \text{K}(s) = s^3 - 2 \quad \text{و} \quad \text{Ha}(s) = -s^2 + 2s + 1$$

فإن $\text{K}(s) + \text{Ha}(s) = s^3 - s^2 + 2s - 1$

نلاحظ في هذا المثال أن درجة $(\text{K}(s) + \text{Ha}(s))$ تساوي درجة $\text{K}(s)$ الذي له أكبر درجة .

• إن درجة جداء كثيري حدود تساوي مجموع درجتيها

مثلاً : إذا كان

$$\text{Ta}(s) = s^3 - s \quad \text{و} \quad \text{Ha}(s) = -s^2 + 2s - 1$$

فإن $\text{Ta}(s) \times \text{Ha}(s) = -s^5 + 2s^4 - 2s^2 + s$

نلاحظ أن درجة $(ta(s) \times ha(s))$ هي 5 وتساوي مجموع درجتي $ta(s)$ و $ha(s)$.

3.1 - كثير الحدود المعدوم

لقد رأينا أن كثير الحدود المعدوم هو كثير الحدود $ta(s)$ بحيث :

$$\forall s \in \mathbb{C} : ta(s) = 0$$

نقبل النتيجة التالية :

يكون كثيرُ حدودٍ مبسطًّا كثير الحدود المعدوم إذا وفقط إذا كانت كل معاملاته معدومة .

أي بعبارة أخرى :

$$\boxed{\forall s \in \mathbb{C} : 1s^0 + 2s^1 + \dots + ns^n = 0 \iff 1 = 0 + 0s^1 + \dots + 0s^n}$$

تطبيق : يمكن استعمال هذه النتيجة للبحث عن العنصر الحيادي لعملية داخلية

مثلاً : إذا كانت \star عملية داخلية في \mathbb{C} حيث :

$$s \star u = (s + 2)(u + 2)$$

فإن العنصر الحيادي هـ (إن وجد) معرف كما يلي :

$$\forall s \in \mathbb{C} : s \star \text{هـ} = s \quad (\text{لأن } \star \text{ عملية تبديلية})$$

$$\left[\forall s \in \mathbb{C} : s \star \text{هـ} = s \right]$$

$$\left[\forall s \in \mathbb{C} : (s + 2)(u + 2) = s \right] \iff$$

$$(1) \left[0 = (s + 1)(u + 2) + (s + 2) \right] \iff$$

القضية (1) تعني أن كثير الحدود $(s + 1)(u + 2) + (s + 2)$ هو كثير الحدود المعدوم .

إذن :

$$\left[\begin{array}{l} 0 = (2 + \mathfrak{a})s + (1 + \mathfrak{a}) \\ \Downarrow \\ \left(\begin{array}{l} 0 = 2 + \mathfrak{a} \\ 0 = 1 + \mathfrak{a} \end{array} \right) \end{array} \right]$$

أي : $\mathfrak{a} = -1$

إذن العنصر الحيادي للعملية \star هو (-1) .

4.1 - تساوي كثيري حدود

التعريف

يتساوى كثيرا الحدود تا (س) و ها (س) إذا وفقط إذا تحقق ما

يلى :

$$\forall s \in \mathbb{C} : Ta(s) = Ha(s)$$

قبل النظرية التالية :

يتساوى كثيرا حدود مبسطان إذا وفقط إذا كانت لها نفس الدرجة وكانت معاملات وحيدات الحد المتشابهة فيها متساوية

مثلاً :

$$Ta(s) = 1 + s^2 - \mathfrak{a}s + \mathfrak{b}$$

$$Ha(s) = 2 + s^2 + s + \mathfrak{a}$$

يتساوى كثيرا الحدود تا (س) و ها (س) إذا وفقط إذا كان :

$$\left. \begin{array}{l} 1 = 1 \\ \mathfrak{a} = \mathfrak{b} \\ 2 = \mathfrak{a} \\ \mathfrak{b} = \mathfrak{b} \end{array} \right\} \text{أي} \quad \left. \begin{array}{l} 2 = 1 + \mathfrak{a} \\ \mathfrak{b} = -1 - \mathfrak{a} \\ \mathfrak{a} = \mathfrak{b} \\ 2 = \mathfrak{b} \end{array} \right\}$$

2 - كثيرات الحدود لمتغيرين حقيقيين :

1.2 - وحدات الحد لمتغيرين حقيقيين

التعريف

ن ، ه عدوان طبيعيان ؛ أ عدد حقيقي .
الدالة التي ترقى بكل ثنائية (س ، ع) من ح \times ح العدد الحقيقي
 λ س λ ع تسمى دالة وحيد الحد للمتغيرين الحقيقيين س ، ع

- العدد الحقيقي λ س λ ع يسمى وحيد حد للمتغيرين الحقيقيين س ، ع .
- العدد الحقيقي أ هو معامل وحيد الحد λ س λ ع .
- إذا كان $\lambda \neq 0$ فإن :
- العدد الطبيعي ن هو درجة وحيد الحد λ س λ ع بالنسبة إلى المتغير س .
- العدد الطبيعي ه هو درجة وحيد الحد λ س λ ع بالنسبة إلى المتغير ع .
- درجة وحيد الحد λ س λ ع بالنسبة إلى المتغيرين س ، ع هو ($\text{ن} + \text{ه}$) .
- إذا كان $\lambda = 0$ فإن وحيد الحد λ س λ ع يسمى وحيد الحد المعدوم .

مثال :

$2 \text{س}^2(\text{ع}^2 - \text{س}^2\text{ع})^2$ هو وحيد حد للمتغيرين الحقيقيين س ، ع ويمكن كتابته كما يلي :

$$2 \text{س}^2(\text{ع}^2 - \text{س}^2\text{ع})^2 = 2 \text{س}(\text{س}^4\text{ع}^4 - 2 \text{س}^5\text{ع}^2)$$

إن $2 \text{س}^5\text{ع}^4$ هو وحيد الحد المبسط لوحيد الحد
 $2 \text{س}^2(\text{ع}^2 - \text{س}^2\text{ع})^2$.

معامله هو 2 ؛ درجته بالنسبة إلى المتغير س هي 5 ؛
درجته بالنسبة إلى المتغير ع هي 4 .
درجته بالنسبة إلى المتغيرين س ، ع هي 9 .

2.2 - كثیرات الحدود للمتغيرين حقيقين :

التعريف

كثير حدود للمتغيرين الحقيقيين س ، ع هو مجموع وحدات حد للمتغيرين الحقيقيين س ، ع .

أمثلة :

1) $s^2 - (\sqrt{2} + 1)su^3$ هو كثير حدود للمتغيرين س ، ع درجه 2 بالنسبة إلى المتغير س و 3 بالنسبة إلى المتغير ع و 4 بالنسبة إلى المتغيرين س ، ع .

2) $\frac{1}{s^2} - (\sqrt{2} + 1)su^3$ ليس كثير حدود .

3) $T(s, u) = \frac{1}{2}s^4u^2 + s^3u^4 - s^2u^3$ هو كثير حدود للمتغيرين س ، ع .

درجته 3 بالنسبة إلى المتغير س و 4 بالنسبة إلى المتغير ع و 5 بالنسبة إلى المتغيرين س ، ع .

نلاحظ أن كل حد من $T(s, u)$ له نفس الدرجة بالنسبة إلى المتغيرين س ، ع .

يدعى ، في هذه الحالة ، $T(s, u)$ كثير حدود متجانس من الدرجة 5 .

4) $s^4u + su - s^3u^2$ هو كثير حدود غير متجانس .

3 - تحليل كثير حدود :

إن تحليل كثير حدود هو كتابته على شكل جداء كثیرات حدود . نذكر فيما يلي بعض القواعد التي تسمح بتحليل كثير حدود .

1.3 - التحليل بواسطة عامل مشترك

يمكن كتابة مجموع جداءات لها عامل مشترك على شكل جداء حسب القاعدة التالية :

$$س + ع + ص = (س + ع + ص)$$

أمثلة :

$$1) 5س^2ع^2 - 2س^3ع = س^2ع(5ع - 2س)$$

$$2) سع + س - ع - 1 = س(ع + 1) - (ع + 1) = (س - 1)(1 + ع)$$

$$3) س^3 + سع + س^2ع + ع^2 = (س^3 + س^2ع) + (سع + ع^2) = س^2(س + ع) + ع(س + ع) = (س + ع)(س^2 + ع)$$

2.3 - التحليل باستعمال المتطابقات الشهيرة :

نذكر فيما يلي بعض المتطابقات الشهيرة المدرosaة خلال السنوات السابقة .

$$(س + 1)^2 = س^2 + 2س + 1$$

$$(س - 1)^2 = س^2 - 2س + 1$$

$$(س + 1)^3 = س^3 + 3س^2 + 3س + 1$$

$$(س - 1)^3 = س^3 - 3س^2 + 3س - 1$$

$$(س + 1)^4 = س^4 + 4س^3 + 6س^2 + 4س + 1$$

$$(س - 1)^4 = س^4 - 4س^3 + 6س^2 - 4س + 1$$

أمثلة : توضّح الأمثلة التالية فكرة استعمال المتطابقات الشهيرة في تحليل كثيرات الحدود .

$$1) تا(س) = (4س - 7)(3س - 1)$$

$$\begin{aligned}
 & \text{تا}(s) = (1 + s - 4)(1 - s - 7 + 3 - 4) = \\
 & \quad (2 - s - 3)(4 - s - 11) = \\
 & \quad (2 + s - 3)(4 - s - 11) = \\
 & \quad 1 + s^2 = \text{تا}(s) = s^4 + 2s^2 + 1 \\
 & \quad s^2(1 + s^2) = \\
 & \quad \text{تا}(s) = s^3 - 2s^2 + s \\
 & \quad s(s^2 - 2s + 1) = \\
 & \quad s(s - 1)^2 = \\
 & \quad 1 + s^2 + 6s^3 + 8s^5 = \text{تا}(s) = \\
 & \quad s^3(1 + s^2)^2 = \\
 & \quad 8 - s^3 = \text{تا}(s) \\
 & \quad (s - 2)(s^2 + 2s + 4) = \\
 & \quad 1 - s^4 = \text{تا}(s) \\
 & \quad (s^2 - 1)(s^2 + 1) = \\
 & \quad (s - 1)(s + 1)(s^2 + 1) =
 \end{aligned}$$

4 - جذور كثير حدود :

1.4 التعريف

يكون العدد الحقيقي α جذراً لكثير الحدود $\text{تا}(s)$ إذا وفقط إذا كان $\text{تا}(\alpha) = 0$

مثلاً :

- العدادان 2 و (-2) هما جذران لكثير الحدود $\text{تا}(s) = s^2 - 4$
لأن $\text{تا}(2) = 0$ و $\text{تا}(-2) = 0$
- الأعداد (-1)، 0، 1 ليست جذوراً لكثير الحدود
 $\text{تا}(s) = s^2 - 4$ لأن : $\text{تا}(1) \neq 0$ و $\text{تا}(0) \neq 0$ و $\text{تا}(1) \neq 0$

2.4 النظرية

إذا كان α جذراً لكثير حدود تا (س) . فإنه يوجد كثير حدود $k(s)$ يحقق ما يلي :

$$\text{تا}(s) = (s - \alpha) \cdot k(s)$$

ملاحظة :

إذا كانت درجة كثير الحدود تا (س) هي n فإن درجة كثير الحدود $k(s)$ هي $(n-1)$.

مثال : تا (س) = $s^3 - 5s^2 + 5s - 1$.
نلاحظ أن تا (1) = 0 . إذن العدد 1 هو جذر لكثير الحدود تا (س) .

حسب النظرية السابقة ، يوجد كثير حدود من الدرجة الثانية $(s^2 + bs + c)$ بحيث يكون :

$$\text{تا}(s) = (s - 1)(s^2 + bs + c)$$

أي تا (س) = $s^3 + (b-1)s^2 + (c-b)s - b$
وبتطبيق نظرية تساوي كثيري حدود نستنتج أن :

$$\left. \begin{array}{l} 1 = 1 \\ 1 = 1 \\ 4 = b \\ 1 = c \end{array} \right\} \text{أي} \quad \left. \begin{array}{l} 5 = 1 - b \\ 5 = b - c \\ 1 = c - b \end{array} \right\}$$

إذن : تا (س) = $(s - 1)(s^2 - 4s + 1)$

5 - الدوال الناطقة والكسور الناطقة :

1.5 التعريف

تا (س) و ها (س) كثيراً حدود .
الدالة التي ترافق بكل عدد حقيقي س العدد الحقيقي $\frac{\text{تا}(s)}{\text{ها}(s)}$
تسمى دالة ناطقة .

- العدد الحقيقي $\frac{\text{تا}(س)}{\text{ها}(س)}$ يسمى كسرًا ناطقاً
- يكون الكسر الناطق $\frac{\text{تا}(س)}{\text{ها}(س)}$ معرفاً إذا و فقط إذا كان مقامه $\text{ها}(س)$ يختلف عن الصفر.

أمثلة :

$$1) \text{ك}(س) = \frac{s - 1}{s^2 + 1} \text{ هو كسر ناطق معرف في مجموعة الأعداد}$$

الحقيقة لأن : $s \in \mathbb{R} : s^2 + 1 \neq 0$

$$2) \text{كا}(س) = \frac{3s^2 - 3}{s - 1} \text{ هو كسر ناطق معرف في المجموعة } \mathbb{R} - \{1\}$$

2.5 - اختزال الكسور الناطقة

توضيح الأمثلة التالية كيفية اختزال الكسور الناطقة :

$$\text{المثال 1 : } \text{ك}(س) = \frac{s^2 - 1}{s^2 + 2s - 1}$$

تكون الدالة الناطقة ك معرفة إذا و فقط إذا كان

$$s^2 - 2s + 1 \neq 0$$

$$\text{أي } (s - 1)^2 \neq 0 \text{ أي } s \neq 1$$

إذن مجموعة التعريف ف للدالة ك هي $\mathbb{R} - \{1\}$

$$\text{لنختزل ك}(س). \text{ لدينا : } s^2 - 1 = (s - 1)(s + 1)$$

$$s^2 - 1 = (s - 1)^2$$

$$\text{ومنه : } \text{ك}(s) = \frac{(s - 1)(s + 1)}{(s - 1)^2}$$

لما $s \in \mathbb{R}$ يكون : $s - 1 \neq 0$

يمكن، عندئذ ، قسمة حدّي الكسر $k(s)$ على $(s - 1)$

$$\text{فنحصل على : } k(s) = \frac{s + 1}{s - 1}$$

$$\text{إذن } \forall s \in F : k(s) = \frac{s + 1}{s - 1}$$

$$\text{المثال 2 : } l(s) = \frac{s^3 - 1}{s^2 - 1}$$

تكون الدالة الناطقة ل معرفة إذا وفقط إذا كان :

$$s^2 - 1 \neq 0$$

$$\text{أي } (s - 1)(s + 1) \neq 0 \quad \text{أي } s \neq 1 \text{ و } s \neq -1$$

إذن مجموعة التعريف F للدالة l هي $F = \{-1, 1\}$.
لنختزل $l(s)$.

$$\text{لدينا : } s^3 - 1 = (s - 1)(s^2 + s + 1)$$

$$s^2 - 1 = (s - 1)(s + 1)$$

$$\text{ومنه : } l(s) = \frac{(s - 1)(s^2 + s + 1)}{(s - 1)(s + 1)}$$

لما $s \in F$ يكون $s - 1 \neq 0$

يمكن ، عندئذ ، قسمة حدّي الكسر $l(s)$ على $(s - 1)$

$$\text{فنحصل على : } l(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s + 1}$$

$$\text{إذن } \forall s \in F : l(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s + 1}$$

ملاحظة : لتكن الدالة الناطقة h المعرفة كما يلي :

$$h(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s + 1} , \text{ الدالتان الناطقتان } l \text{ و } h \text{ غير متساويتين}$$

لأن مجموعتي تعريفهما مختلفتان .

مثال 3 بـ

$$ta(s) = \frac{s^3 + 1}{s + 1}$$

تكون الدالة الناطقة ta معرفة إذ و فقط إذا كان

$s + 1 \neq 0$ أي $s \neq -1$.

إن مجموعة التعريف F للدالة ta هي $F = \{s \in \mathbb{R} : s \neq -1\}$.
لنختزل $ta(s)$.

لدينا : $s^3 + 1 = (s + 1)(s^2 - s + 1)$

$$\text{ومنه : } ta(s) = \frac{(s + 1)(s^2 - s + 1)}{s + 1}$$

لما $s \in F$ يكون $s + 1 \neq 0$

يمكن ، عندئذ ، قسمة حدّي الكسر $ta(s)$ على $(s + 1)$

$$\text{فحصل على } ta(s) = s^2 - s + 1$$

$$\text{إذن } \forall s \in F : ta(s) = s^2 - s + 1$$

ملاحظة :

لتكون الدالة كثير الحدود h حيث $h(s) = s^2 - s + 1$
الدالتان ta و h غير متساويتين لأنّ مجموعتي تعريفهما مختلفتان.

1 - عموميات :

1.1 - مفهوم المعادلة

إذا كانت تا و ها دالتين لمجموعة κ في مجموعة L فإن حل المعادلة $ta(s) = ha(s)$ في المجموعة κ يعني تعين مجموعة العناصر s من κ التي لها نفس الصورة بواسطة الدالتين ta و ha .

هذه المجموعة تسمى **مجموعة حلول المعادلة** $ta(s) = ha(s)$ في κ .

مثال 1 :

تا و ها دالتان للمجموعة \mathbb{Q} في نفسها حيث :

$$ta(s) = 3s^2 - s - 5 ; ha(s) = 2s^2 - 2s + 1$$

العدنان 2 و (-3) حلان للمعادلة $ta(s) = ha(s)$

لأن : $ta(2) = ha(2)$ و $ta(-3) = ha(-3)$

بينما الأعداد $(-2, 0, \sqrt{2})$ ليست حلولاً لهذه المعادلة

لأن : $ta(-2) \neq ha(-2)$ ، $ta(0) \neq ha(0)$ ،

$$ta(\sqrt{2}) \neq ha(\sqrt{2}).$$

مثال 2 :

تا و ها دالتان للمجموعة \mathbb{Q} في نفسها حيث :

$$ta(s) = s^2 ; ha(s) = s$$

لبحث عن ي مجموعة حلول المعادلة $ta(s) = ha(s)$.

أولاً : إذا كان α عنصراً من \mathbb{Y} فإنه يتحقق المساواة
 $0 = \alpha - \alpha^2$ أي $\alpha = \alpha^2$
وَبالتالي : $0 = (\alpha - \alpha) \alpha$
وهذا يعني أن $0 = \alpha$ أو $\alpha = 1$
إذن $\alpha \in \{0, 1\}$ أي $\mathbb{Y} \subseteq \{0, 1\}$

ثانياً : من الواضح أن العددان 0 و 1 حلان للمعادلة المعطاة لأن
 $T_a(0) = 0$ و $T_a(1) = 1$.
إذن $\{0, 1\} \subseteq \mathbb{Y}$
من (1) و (2) نستنتج : $\mathbb{Y} = \{0, 1\}$

2.1 - مفهوم المتراجحة

إذا كانت T_a و H_a دالتين لمجموعة \mathbb{K} في مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{J} .

فإن حل المتراجحة $T_a(s) \geq H_a(s)$

أو $T_a(s) > H_a(s)$ في \mathbb{K} يعني تعين مجموعة

العناصر s من \mathbb{K} التي تتحقق المتباينة $T_a(s) \geq H_a(s)$

أو $T_a(s) < H_a(s)$

هذه المجموعة تسمى مجموعة حلول المتراجحة

$T_a(s) \geq H_a(s)$ أو $T_a(s) < H_a(s)$

مثال 1 :

T_a و H_a دالتان لمجموعة \mathbb{J} في \mathbb{J} حيث :

$$T_a(s) = s^2 ; H_a(s) = s$$

الأعداد $(-1, 0, 1)$ ليست حلولاً للمتراجحة $\text{تا}(s) < \text{ها}(s)$
لأن المطابقات التالية غير محققة :
 $\text{تا}(-1) > \text{ها}(-1)$ ؛ $\text{تا}(0) > \text{ها}(0)$ ؛ $\text{تا}(1) > \text{ها}(1)$.

بينما الأعداد $\frac{-2\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$ هي حلول لهذه المتراجحة لأن المطابقات التالية محققة .

$$\begin{aligned} \text{تا}\left(\frac{-1}{2}\right) &< \text{ها}\left(\frac{1}{2}\right) \\ \text{تا}\left(\frac{1}{4}\right) &< \text{ها}\left(\frac{1}{4}\right) \\ \text{تا}\left(\frac{-2\sqrt{2}}{2}\right) &< \text{ها}\left(\frac{-2\sqrt{2}}{2}\right) \end{aligned}$$

مثال 2 :

تا و ها دالتان للمجموعة \mathbb{Q} في نفسها حيث
 $\text{تا}(s) = -s + 2$ ؛ $\text{ها}(s) = s - 4$
 نبحث عن ي مجموعة حلول المتراجحة $\text{تا}(s) \leq \text{ها}(s)$.
 أولاً : إذا كان α عنصراً من ي فإنه يحقق المطابقة التالية :
 $\alpha - 4 \leq -2 + \alpha \leq 6$ أي $4 - \alpha \leq 2 + \alpha$ وهذا يعني أن $3 \leq \alpha$
 إذن $\alpha \in [3, \infty)$
 ومنه ي $\subseteq [-\infty, 3]$ (1)

ثانياً : إذا كان α عنصراً من المجال $[-\infty, 3]$ فإنه يتحقق المطابقة
 $\alpha - 4 \leq 6$ أي $\alpha \leq 10$
 من المطابقة السابقة نستنتج :

$$(4 + \alpha) - \alpha \cdot 2 \leq (4 + \alpha) - 6$$

أَيِّ : $4 - \alpha \leq 2 + \alpha$ -
 أَيِّ : $\text{تا}(\alpha) \leq \text{ها}(\alpha)$
 إذن إذا كان α عنصراً من المجال $[-\infty, 3]$ فإنه حل للمتراجحة
 $\text{تا}(s) \leq \text{ها}(s)$
 أَيِّ : $\alpha \in \mathbb{R}$
 وَمِنْهُ $[-\infty, 3] \supseteq \text{ي}(2)$
 مِنْ (1) وَ (2) نَسْتَتَجُ : $\text{ي} = [-\infty, 3]$
3.1 - المعادلات المتكافئة . المتراجحات المتكافئة :

التعريف

تكون معادلتان (أو متراجحتان) معرفتان على نفس المجموعة متكاففتين إذا وفقط إذا كانت لهما نفس مجموعة الحلول .

- إذا كانت (M_1) و (M_2) معادلتين (أو متراجحتين) متكاففتين نكتب :
 $(M_1) \Leftrightarrow (M_2)$
- مثلاً :

المعادلتان $s^2 = s$ و $s(s-1) = 0$ متكاففتان .
 إذا كانت (M_1) معادلة (أو متراجحة) فإنه يمكن إيجاد معادلة (أو متراجحة) (M_2) مكافئة لها سهلة الحل وذلك باستعمال القواعد التالية :

القواعد 1

- إذا كانت تا ، ها و عا ثلثاً دوالاً معرفة على نفس المجموعة فإن :
- $\text{تا}(s) = \text{ها}(s) \Leftrightarrow \text{تا}(s) + \text{عا}(s) = \text{ها}(s) + \text{عا}(s)$
- $\text{تا}(s) \geq \text{ها}(s) \Leftrightarrow \text{تا}(s) + \text{عا}(s) \geq \text{ها}(s) + \text{عا}(s)$

بالخصوص إذا كان عا (س) = - λ(س) فإن :

$$\bullet \text{تا}(س) = \text{ها}(س) \iff \text{تا}(س) - \text{ها}(س) = 0$$

$$\bullet \text{تا}(س) \geq \text{ها}(س) \iff \text{تا}(س) - \text{ها}(س) \geq 0$$

مثلاً :

$$\text{المعادلة } 2s^2 + 1 = s^2 - 2s + 1 \text{ مكافأة}$$

$$\text{للمعادلة } 2s^2 + 1 - s^2 + 2s - 1 = 0$$

$$\text{أي } s^2 + 2s = 0$$

$$\text{إذن } (s) \iff s^2 + 2s = 0$$

القاعدة 2

إذا كانت تا وها دالتين معرفتين على نفس المجموعة وكان λ عدداً حقيقياً غير معروف فإن :

$$\text{تا}(س) = \text{ها}(س) \iff \lambda \text{تا}(س) = \lambda \text{ها}(س)$$

مثلاً :

$$\text{المعادلة } 2s^2 - 4s + 2 = 0 \text{ في ح مكافأة}$$

$$0 = (2s^2 - 4s + 2) \quad \frac{1}{2}$$

$$\text{أي } s^2 - 2s + 1 = 0$$

$$\text{أي } (s - 1)^2 = 0$$

$$\text{إذن } 2s^2 - 4s + 2 = 0 \iff (s - 1)^2 = 0$$

القاعدة 3

إذا كانت تا وها دالتين معرفتين على نفس المجموعة وكان λ عدداً

حقيقياً غير معروف فإن :

$$\bullet \text{تا}(س) \geq \text{ها}(س) \iff \lambda \text{تا}(س) \geq \lambda \text{ها}(س) \text{ إذا كان }$$

λ موجباً

$$\bullet \text{تا}(س) \geq \text{ها}(س) \iff \lambda \text{تا}(س) \leq \lambda \text{ها}(س) \text{ إذا كان }$$

λ سالباً

$$\text{المترادفة} = \frac{3}{x} - 2 \text{ مم}$$

$$\text{المترادفة} = 2 + \frac{1}{x} \geq 18$$

(بضرب صيغة المترادفة في العدد 6)

$$\text{أي : } 0 \geq 15 + 10x$$

$$\text{بالقسمة على } (-5) \text{ نحصل على } 2x - 3 \leq 0$$

إذن :

$$0 \leq 3 - 2x \Leftrightarrow \frac{1}{2} + \frac{2}{x} \geq 3 \Leftrightarrow \frac{x}{3} - \frac{1}{2} \leq 0$$

2 - المعادلات من الشكل $as + b = 0$

1.2 - المعادلات من الدرجة الأولى :

التعريف :

نسمى معادلة من الدرجة الأولى ذات المجهول x كل معادلة من الشكل $ax + b = 0$ حيث a و b عددين حقيقيان معلومان و $a \neq 0$.

$$\text{بما أن } a \neq 0 \text{ فإن : } ax + b = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{a}$$

إذن :

كل معادلة من الدرجة الأولى $ax + b = 0$

تقبل ، في \mathbb{R} . حلًا وحيدًا هو $\left(-\frac{b}{a} \right)$

2.2 - المعادلات من الشكل $as + b = 0$

لقد رأينا فيما سبق أن كل معادلة من الشكل $as + b = 0$ تقبل حلًاً وحيداً إذا كان $a \neq 0$.

لندرس الآن الحالة التي يكون فيها $a = 0$.

لما $a = 0$ المعادلة $as + b = 0$ تكتب $0s + b = 0$

أي $0s = -b$

الطرف الأول لهذه المعادلة يساوي الصفر منها يمكن العدد الحقيقي s .

أما الطرف الثاني $(-b)$ فهو معطى :

- إذا كان $b = 0$ فإن كل عدد حقيقي s يتحقق المساواة

$0s = -b$ فهو إذًا حلًّاً للمعادلة $0s = -b$

- إذا كان $b \neq 0$ فإنه لا يوجد أي عدد حقيقي s يتحقق المساواة

$0s = -b$

وبالتالي المعادلة $0s = -b$ ليس لها حل في \mathbb{Q} .

الخلاصة :

لتكن ، في \mathbb{Q} ، المعادلة $as + b = 0$

ولتكن \mathbb{Y} مجموعة حلولها .

- إذا كان $a \neq 0$ فإن $\mathbb{Y} = \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$

- إذا كان $a = 0$ و $b = 0$ فإن $\mathbb{Y} = \mathbb{Q}$

- إذا كان $a = 0$ و $b \neq 0$ فإن $\mathbb{Y} = \emptyset$

مثال 1 :

$$(1) \quad \frac{1}{2}s + 3 = 2s - \frac{5}{3}$$

لدينا :

$$3 + \frac{1}{2}s = 18 + \frac{s}{3} \Leftrightarrow \frac{1}{2}s - \frac{s}{3} = 18 - 3$$

$$10 = 15 \Leftrightarrow$$

$$\frac{3}{2} = s \Leftrightarrow$$

إذن المعادلة (1) تقبل ، في \mathbb{Q} ، حالاً وحيداً هو $\frac{3}{2}$

ومجموعة حلولها هي $\left\{ \frac{3}{2} \right\}$

مثال 2 : نعتبر ، في \mathbb{Q} ، المعادلة :

$$(2) \quad (1 + 3s) - 2s = (1 - 4s) + 5s$$

$$2 + 9s = 5 - 12s \Leftrightarrow (2)$$

$$7s - 7 = 12 + 3s \Leftrightarrow$$

$$4s = 0 \Leftrightarrow$$

المعادلة (2) ليس لها حل

ومجموعة حلولها هي \emptyset .

مثال 3 : نعتبر ، في \mathbb{Q} ، المعادلة :

$$(3) \quad \frac{4}{3} - \frac{2s - 4}{6} = \frac{5s - 2}{3}$$

$$8 - 2s = 10 - 4s \Leftrightarrow (3)$$

$$2s = 2 \Leftrightarrow$$

$$s = 1 \Leftrightarrow$$

إذن كل عدد حقيقي هو حل للمعادلة (3)

ومجموعة حلولها هي \mathbb{Q} .

3 - المراجحات من الشكل $as + b \geq 0$

1.3 - المراجحات من الدرجة الأولى :

التعريف : نسمى مراجحة من الدرجة الأولى ذات الجھول س كل مراجحة من الشكل $as + b \geq 0$

(أو $as + b < 0$ أو $as + b \leq 0$ أو $as + b > 0$)

حيث $a \neq 0$ عددان حقيقيان معلومان و $a \neq 0$

حل المراجحة من الدرجة الأولى $as + b \geq 0$

لدينا : $as + b \geq 0 \iff as \geq -b$ (1)
بما أن $a \neq 0$ فإنه يمكن ضرب طرف المراجحة (1) في العدد $\frac{1}{a}$
فنجصل على :

$$s \geq -\frac{b}{a} \quad \text{إذا كان } a \text{ موجباً .}$$

$$\text{أو } s \leq -\frac{b}{a} \quad \text{إذا كان } a \text{ سالباً .}$$

إذن :

• إذا كان $a < 0$ فإن مجموعة حلول المراجحة $as + b \geq 0$

هي المجال $[-\infty, -\frac{b}{a}]$

• إذا كان $a > 0$ فإن مجموعة حلول المراجحة $as + b \geq 0$

$[\frac{b}{a}, +\infty)$ هي المجال

مثال 1 : نعتبر ، في \mathbb{R} ، المراجحة

$$4s + 7 \leq 5s + 2 - (3s + 5).$$

لدينا :

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & 4s + 7 \leq 5s - 2 \Leftrightarrow \\
 & 3s - 3 \leq 7 + 2 \Leftrightarrow \\
 & 10 - 2s \leq \Leftrightarrow \\
 & 5 - s \leq \Leftrightarrow
 \end{aligned}$$

إذن مجموعة حلول المراجحة (1) هي المجال $[5, +\infty)$.

مثال 2: نعتبر ، في \mathbb{R} ، المراجحة :

$$(2) \quad \frac{5+2s}{2} > \frac{1+s}{6} - \frac{1-2s}{3}$$

$$\begin{aligned}
 \text{لدينا : } & (2) \Leftrightarrow 2(5+2s) > 3(1-s) - (1+2s) \\
 & 10 + 4s > 3 - 3s - 1 - 2s \Leftrightarrow \\
 & 18 > 3s - 6 \Leftrightarrow \\
 & s < 6 \Leftrightarrow
 \end{aligned}$$

إذن مجموعة حلول المراجحة (2) هي المجال $(-\infty, 6)$.

2.3 - المراجحات من الشكل $as + b \geq 0$

لقد تعرّفنا فيما سبق على حلول المراجحة $as + b \geq 0$ لما $a \neq 0$.

لدرس الآن الحالة التي يكون فيها $a = 0$.

في هذه الحالة المراجحة $as + b \geq 0$ تكتب :

$$0s + b \geq 0 \quad \text{أي} \quad b \geq 0$$

الطرف الأول لهذه المراجحة يساوي الصفر مهما يكن العدد الحقيقي s .

أما الطرف الثاني ($-b$) فهو معطى :

• إذا كان $b > 0$ فإنه لا يوجد أي عدد حقيقي s يتحقق المتباينة

$$0s > -b \quad \text{و بال التالي}$$

- المتراجحة $s > -b$ ليس لها أي حل في \mathbb{Q} .
- إذا كان $b \geq 0$ فإن كل عدد حقيقي s يتحقق المتباعدة $s > -b$
 - إذاً حل للمتراجحة $s > -b$

الخلاصة :

لتكن ، في \mathbb{Q} ، المتراجحة $s + b > 0$
ولتكن y مجموعة حلولها .

- إذا كان $b < 0$ فإن $y = \mathbb{Q}$
- $$y = \left[\frac{-b}{1}, \infty \right)$$
 إذا كان $b > 0$
- $$y = \left(\frac{-b}{1}, \infty \right)$$
 إذا كان $b = 0$
- إذا كان $b = 0$ فإن $y = \emptyset$ إذا كان $b < 0$

5 - تمارين محلولة :

التمرين الأول :

حل ، في \mathbb{Q} ، المعادلة ذات المجهول s

$$(1) \quad \frac{5}{s+3} = \frac{3}{s-2}$$

$$(s-2)(s+3) = 15$$

تكون المعادلة (1) معرفة إذا وفقط إذا كان :

$s-2 \neq 0$ و $(s-3)(s+2) \neq 0$

أي $s \neq 2$ و $s \neq -3$

و بالتالي تكون مجموعة التعريف F لهذه المعادلة هي

$$F = \mathbb{Q} \setminus \{-3, 2\}$$

مهمها يكن س ∈ ف لدينا :

$$0 = \frac{5}{(2-s)(s-3)} - \frac{s+3}{2-s} \Leftrightarrow (1)$$

$$0 = \frac{(s-3)(s+3)}{(2-s)(s-3)} \Leftrightarrow$$

$$0 = 5 - (s+3)(s-3) \Leftrightarrow$$

$$0 = 4 - s^2 \Leftrightarrow$$

$$0 = (s+2)(s-2) \Leftrightarrow$$

$$s = -2 \text{ أو } s = 2 \Leftrightarrow$$

$$s = 2 \text{ لأن } 2 \notin F \Leftrightarrow$$

إذن :

مجموعة الحلول للمعادلة (1) هي $\{s = -2\}$

التمرين الثاني :

حل ، في ح ، المعادلة ذات المجهول بين :

$$(2) \quad 4 = |s+2| - |s+3|$$

لنضع $\kappa(s) = |s+3| - |s+2|$
ولنكتب $\kappa(s)$ بدون استعمال رمز القيمة المطلقة
لدينا :

$$\left. \begin{array}{l} s+2 = s+3 \\ \text{إذا كان } s \leq -2 \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} s+2 = -s-2 \\ \text{إذا كان } s \geq -2 \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} s+1 = s+3 \\ \text{إذا كان } s \leq -1 \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} s+1 = -s-3 \\ \text{إذا كان } s \geq -1 \end{array} \right\}$$

الجدول التالي يبيّن كتابة $k(s)$ حسب قيم s .

$x +$	$1 -$	$2 -$	$\infty -$	s
$6+s \geq 3$	$6+s \geq 3$	$6-s \leq 3$	$6-s \leq 3$	$ 2+s \geq 3$
$1+s$	$1-s$	$-s$	$-s$	$ s+1 $
$5+s \geq 2$	$7+s \geq 4$	$5-s \leq 2$	$5-s \leq 2$	$ s-5 \geq 2 \Leftrightarrow k(s)$

• في المجال $[2, \infty)$ لدينا :

$$4 = 5 - s \Leftrightarrow (2)$$

$$\frac{9}{2} = s \Leftrightarrow$$

$\left(\frac{9}{2} \right)$ هو حل للمعادلة (2) لأن العدد $\left(\frac{9}{2} \right)$

يتنبئ إلى المجال $[2, \infty)$.

• في المجال $[1, 2)$ لدينا :

$$4 = 7 + s \Leftrightarrow (2)$$

$$\frac{3}{4} = s \Leftrightarrow$$

$\left(\frac{3}{4} \right)$ ليس حلاً للمعادلة (2) لأن العدد $\left(\frac{3}{4} \right)$

لا يتنبئ إلى المجال $[1, 2)$.

• في المجال $[-1, \infty)$ لدينا :

$$4 = 5 + s \Leftrightarrow (2)$$

$$\frac{1}{2} = s \Leftrightarrow$$

العدد $\left(\frac{1}{2} - \right)$ ينتمي إلى حل للمعادلة (2) لأن $\left(\frac{1}{2} - \right)$ ينتمي إلى

المجال $[-1, +\infty]$

• إذن مجموعة حلول المعادلة (2) هي :

$$\left\{ \frac{1}{2} - , \frac{9}{2} - \right\}$$

التمرین الثالث :

حل ، في ح ، المعادلة ط $(ط س - 3) = س + 3$ (3)
حيث س هو المجهول وَ ط عدد حقيقي معلوم نسميه وسيطاً .

$$\begin{aligned} \text{لدينا : } (3) &\iff ط^2 س - 3 ط = س + 3 \\ &\iff ط^2 س - س = 3 ط + 3 \\ &\iff (ط^2 - 1) س = 3 (ط + 1) \end{aligned}$$

المناقشة :

• إذا كان $ط^2 - 1 = 0$ أي $ط = 1$ أو $ط = -1$ فإن المعادلة (3') ليست من الدرجة الأولى :

- إذا كان $ط = 1$ فإن (3') تكتب $0 س = 6$
وَ مجموعة حلولها هي \emptyset

- إذا كان $ط = -1$ فإن (3') تكتب $0 س = 0$
وَ مجموعة حلولها هي ح

• إذا كان $ط^2 - 1 \neq 0$ أي $ط \neq 1$ وَ $ط \neq -1$

فإن المعادلة (3') من الدرجة الأولى ولها حل وحيد هو :

$$\frac{3}{1 - ط} \quad \text{أي} \quad \frac{3 (ط + 1)}{1 - ط^2}$$

التمرین الرابع :

حل ، في ح ، الجملة :

$$(أ) \quad 3 - \frac{1}{2}s \geq 3 - 1 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad (ج)$$

$$(ب) \quad \frac{1}{2}s - 3 > 2s + 5 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

- لتکن y_1 و y_2 مجموعی حلول المتراجحتین (أ) و (ب) علی الترتیب .
- مجموعی حلول الجملة (ج) هي المجموعی $y_1 \cap y_2$.
- لنعین المجموعی y_1

لدينا : (أ) $\Leftrightarrow 3 + 1 \geq 3s - \frac{1}{2}s$

$$\frac{7}{2} \geq 4 \Leftrightarrow s \geq \frac{7}{2}$$

$$s \geq \frac{8}{7} \Leftrightarrow$$

ومنه y_1

- لنعین المجموعی y_2



لدينا : (ب) $\Leftrightarrow 2s + 5 - 3 > s - \frac{1}{2}s$

$$s > \frac{8}{3} \Leftrightarrow$$

$$s > \frac{16}{3} \Leftrightarrow$$

$$\left[\infty + , -\frac{16}{3} \right] = \text{ومنه ي}_2$$

$$\left[\infty + , -\frac{8}{7} \right] = \text{إذن ي}_1 \cap \text{ي}_2$$



التمرين الخامس :

حل ، في ع ، المتراجحة :

$$(2 - ط) س > 3(ط + 1) \quad (\text{م})$$

حيث س هو المجهول و ط وسيط حقيقي .

• إذا كان $2 - ط = 0$ أي $ط = 2$ فإن المتراجحة (م)

تكتب $0 < س < 9$ ومجموعة حلولها هي المجموعة ع

• إذا كان $2 - ط < 0$ أي $ط > 2$ فإن :

$$\frac{(1 + ط) 3}{ط - 2} > س \Leftrightarrow (2 - ط) س > 3(ط + 1)$$

$\left[\frac{(1 + ط) 3}{ط - 2} , \infty \right]$ ومجموعة حلول (م) هي المجال

• إذا كان $2 - ط > 0$ أي $ط < 2$ فإن :

$$\frac{(1 + ط) 3}{ط - 2} < س \Leftrightarrow (2 - ط) س > 3(ط + 1)$$

$\left[\infty , \frac{(1 + ط) 3}{ط - 2} \right]$ ومجموعة حلول (م) هي المجال :

1 - المعادلات من الدرجة الثانية

1.1 - التعريف

نسمى معادلة من الدرجة الثانية ذات المجهول الحقيقي س

كل معادلة من الشكل $A s^2 + B s + C = 0$

حيث A, B, C أعداد حقيقة معلومة و $A \neq 0$

2.1 - حل معادلات بسيطة من الدرجة الثانية

1) حل المعادلة : $3s^2 + 5s = 0$ في المجموعة \mathbb{Q}

$$\text{لدينا : } 3s^2 + 5s = 0 \Leftrightarrow s(3s + 5) = 0 \Leftrightarrow s = 0 \text{ أو } s = -\frac{5}{3}$$

إذن :

$$0 \text{ و } \left(-\frac{5}{3} \right) \text{ هما حللاً المعادلة } 3s^2 + 5s = 0$$

2) حل ، في \mathbb{Q} ، المعادلة : $(s - 2)^2 = 9$

$$\text{لدينا : } (s - 2)^2 = 9 \Leftrightarrow (s - 2)^2 = 3^2 \Leftrightarrow$$

$$0 = (3 + 2)(s - 2 - 3) \Leftrightarrow (s - 2 - 3)(s - 2 + 3) = 0$$

$$0 = (1 + 5)(s - 2) \Leftrightarrow$$

$$s = 5 \text{ أو } s = -1$$

إذن :

5 و -1 هما حللاً المعادلة $(s - 2)^2 = 9$

3) حل ، في \mathbb{Q} ، المعادلة : $s^2 + 6s - 7 = 0$

$$\text{لدينا : } s^2 + 6s = s^2 + 3 \cdot 2 + 3^2 - 3^2 = (s + 3)^2 - 9$$

$$(s + 3)^2 - 9 = 0$$

$$\begin{aligned}
 7 - 9 - 2(s + 3) &= 7 - s^2 \\
 16 - 2(s + 3) &= \\
 (4 + 3 + s)(4 - 3 + s) &= \\
 (s + 1)(s - 7) &=
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0 = (7 + s^2 - s - 1) &\Leftrightarrow 0 = 7 - s^2 + s - 1 \\
 7 - s &= 1 \Leftrightarrow s = 7 - 1 \\
 0 = 7 - s^2 + s - 1 &\Leftrightarrow \\
 (4) \text{ حل ، في } \mathbb{Q} , \text{ المعادلة } s^2 - s + 1 &=
 \end{aligned}$$

$$\left(\frac{1}{2} \right)^2 - \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \times 2 - s^2 = s^2 - s \quad \text{لدينا :}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4} - \left(\frac{1}{2} - s \right)^2 &= \\
 1 + \frac{1}{4} - \left(\frac{1}{2} - s \right)^2 &= 1 + s^2 - s \quad \text{ومنه}
 \end{aligned}$$

$$\frac{3}{4} + \left(\frac{1}{2} - s \right)^2 =$$

$$0 \leq \left(\frac{1}{2} - s \right)^2 \quad \text{nلاحظ أنه : } \forall s \in \mathbb{Q}$$

$$0 < \frac{3}{4} + \left(\frac{1}{2} - s \right)^2 \quad \text{وبالتالي : } \forall s \in \mathbb{Q}$$

إذن المعادلة $s^2 - s + 1 = 0$ لا تقبل أي حل.

(5) حل ، في \mathbb{C} ، المعادلة $2s^2 - 5s + 3 = 0$

$$0 = \left(\frac{3}{2} + s \frac{5}{2} \right)^2 \Leftrightarrow 0 = 3 + 5s^2 - 2s^2 \Leftrightarrow$$

$$0 = \frac{3}{2} + s \frac{5}{2} - s^2 \Leftrightarrow$$

بما أن :

$$s^2 \left(\frac{5}{4} \right) - s^2 \left(\frac{5}{4} \right) + s^2 \frac{5}{4} = s^2 \frac{5}{2}$$

$$\frac{25}{16} - s^2 \left(\frac{5}{4} \right) =$$

نحصل على :

$$0 = \frac{3}{2} + \frac{25}{16} - s^2 \left(\frac{5}{4} \right) \Leftrightarrow 0 = \frac{3}{2} + \frac{5}{2} s^2 -$$

$$0 = \frac{1}{16} - s^2 \left(\frac{5}{4} \right) \Leftrightarrow$$

$$0 = \left(1 - s^2 \right) \left(\frac{3}{2} + s^2 \right) \Leftrightarrow$$

إذن : $\frac{3}{2}$ و 1 هما حلاً المعادلة $2s^2 - 5s + 3 = 0$

3.1 - الشكل الموجي لكثير الحدود من الدرجة الثانية .

ليكن $As^2 + Bs + C$ كثير حدود من الدرجة الثانية .

بما أن $A \neq 0$ فإن :

$$\left[\frac{A}{1} + s \frac{B}{1} + s^2 \frac{C}{1} \right] = 0 \Leftrightarrow$$

$$\left[\frac{s}{1} + \left(\frac{s}{12} \right)^2 - \left(\frac{s}{12} \right)^2 + \frac{s}{12} \cdot 2 + s^2 \right] =$$

$$\left[\frac{s}{1} + \frac{s^2}{24} - \left(\frac{s}{12} + s \right)^2 \right] =$$

$$\left[\frac{s^2 - 2s}{24} - \left(\frac{s}{12} + s \right)^2 \right] =$$

إذن :

يمكن كتابة كثير الحدود من الدرجة الثانية $s^2 + bs + c$ على الشكل

الذي $\left[\frac{s^2 - 2s}{24} - \left(\frac{s}{12} + s \right)^2 \right]$

يسمى شكله التموجي .

4.1 حل معادلة من الدرجة الثانية

لتكون المعادلة من الدرجة الثانية $s^2 + bs + c = 0$

لدينا

$$0 = \left[\frac{s^2 - 2s}{24} - \left(\frac{s}{12} + s \right)^2 \right] \Leftrightarrow (1)$$

(باستعمال الشكل التموجي)

$$(0 \neq 0) \Leftrightarrow \frac{s^2 - 2s}{24} = \left(\frac{s}{12} + s \right)^2 \Leftrightarrow$$

$$(2) \quad \frac{s^2 - 2s}{24} = \left(\frac{s}{12} + s \right)^2 \Leftrightarrow$$

نلاحظ أن الطرف الأول لهذه المعادلة مربع فهو إذاً موجب .
 أما الطرف الثاني فهو كسر مقامه موجب تماماً وإشارته إذاً هي إشارة بسطه
 الذي يسمى **ميز المعادلة** ويرمز إليه بالرموز Δ

$$\boxed{\Delta = b^2 - 4ac}$$

إذن :

حل المعادلة (1) نميز ثلاثة حالات حسب إشارة Δ
الحالة الأولى $\Delta > 0$

(3) $\frac{\Delta}{4} = \left(\frac{b}{2} + \frac{s}{2} \right)^2$ المعادلة (2) تكتب :

$0 \leq \left(\frac{b}{2} + \frac{s}{2} \right)^2 \leq s^2$ بما أن $0 < \frac{\Delta}{4}$

فإنه لا يوجد أي عدد حقيقي س يتحقق المعادلة (3)
 إذن : في هذه الحالة ليس للالمعادلة (1) أي حل .

الحالة الثانية $\Delta = 0$

المعادلة (2) تكتب : $0 = \left(\frac{b}{2} + \frac{s}{2} \right)^2$

$0 = \left(\frac{b}{2} + \frac{s}{2} \right) \left(\frac{b}{2} + \frac{s}{2} \right)$ أي

$\left(\frac{b}{2} + \frac{s}{2} \right) = 0$ إذن المعادلة المعطاة لها حلان يساويان

العدد $\left(\frac{b}{2} + \frac{s}{2} \right)$ يدعى **حلّ مضاعفاً** لهذه المعادلة

الحالة الثالثة $\Delta < 0$

يمكن كتابة Δ على الشكل Δ^2 والمعادلة (2) تصبح مكافئة

للمعادلة التالية :

$$0 = \left(\frac{\Delta^2}{12} \right) - \left(\frac{s}{12} + \frac{b}{12} \right)^2$$

$$0 = \left(\frac{\Delta^2}{12} - \frac{s}{12} - \frac{b}{12} \right) \left(\frac{\Delta^2}{12} + \frac{s}{12} + \frac{b}{12} \right)$$

$$0 = \left(\frac{\Delta^2 + s - b}{12} \right) \left(\frac{\Delta^2 - s - b}{12} \right)$$

إذن : في هذه الحالة المعادلة المعطاة لها حلان متباينان هما :

$$\frac{\Delta^2 + s - b}{12} = 0 \quad \text{و} \quad \frac{\Delta^2 - s - b}{12} = 0$$

الخلاصة

لتكن ، في ح ، المعادلة من الدرجة الثانية :

$$as^2 + bs + c = 0 \quad (1)$$

ولتكن Δ مميزها ($\Delta = b^2 - 4ac$)

• إذا كان $\Delta > 0$ فإن المعادلة (1) لا تقبل أي حل .

• إذا كان $\Delta = 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلًا مضاعفًا هو $\left(\frac{-b}{a}\right)$

• إذا كان $\Delta < 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين متباينين هما :

$$\frac{\Delta^2 + s - b}{12} = 0 \quad \text{و} \quad \frac{\Delta^2 - s - b}{12} = 0$$

ملاحظات :

1) من الدراسة السابقة نستنتج أنه إذا كان للمعادلة من الدرجة الثانية

$$س^2 + بس + ح = 0$$

حلان س' ، س" فإنه يمكن كتابتها على الشكل :

$$(س - س')(س - س") = 0$$

2) إذا كان العددان الحقيقيان Δ ، \triangle من إشارتين مختلفتين فإنه يكون

$$\Delta < 0 \text{ ومنه } \Delta^2 - 4 > 0$$

وبالتالي المعادلة $س^2 + بس + ح = 0$ تقبل حلين متمايزين .

3) إذا كان $ب = 2\Delta$ فإنه يمكن أن نكتب :

$$(2\Delta)^2 - 4\Delta = 4[\Delta^2 - \Delta]$$

إشارة Δ هي إذاً نفس إشارة العدد $(\Delta^2 - \Delta)$ الذي يدعى المميز المختصر ويرمز إليه بالرمز Δ' .

إذا كان $ب = 2\Delta'$ وكان $\Delta' < 0$ فإن عبارتي الحلّين س' و س"

تصبحان :

$$\frac{\sqrt{\Delta'} + \Delta'}{2} \quad \text{و} \quad \frac{\sqrt{\Delta'} - \Delta'}{2}$$

5.1 - أمثلة :

مثال 1 : حل ، في \mathbb{Q} ، المعادلة : $-2س^2 + 3س + 5 = 0$ (1)

المعادلة (1) من الشكل $س^2 + بس + ح = 0$

$$5 = -2 ; \quad ب = 3 ; \quad ح = 5$$

لدينا : $\Delta = \Delta^2 - 4\Delta = 49$

$$49 = (2 - \Delta)^2 = 4 - 2\Delta$$

بما أن $\Delta > 0$ فالمعادلة (1) تقبل ، في \mathbb{Q} ، حلين متمايزين هما :

$$\frac{5}{2} = \frac{10 -}{4 -} = \frac{7 - 3 -}{(2 -) 2} = \text{أي } s' : \quad \frac{\Delta v - s -}{12} =$$

و

$$1 - = \frac{4}{4 -} = \frac{7 + 3 -}{(2 -) 2} = \text{أي } s'' : \quad \frac{\Delta v + s -}{12} =$$

مثال 2 : حل في \mathbb{Q} ، المعادلة : $s^2 - 3\sqrt{2}s + 3 = 0$

المعادلة (2) من الشكل $s^2 + bs + c = 0$

$$3 = c \quad ; \quad b = -3\sqrt{2} \quad ; \quad 1 = a$$

لدينا : $\Delta = b^2 - 4ac =$

$$0 = (3)(1)4 - 4(3\sqrt{2})^2 =$$

بما أن $\Delta < 0$ فالمعادلة (2) تقبل ، في \mathbb{Q} ، حلًا مضاعفًا

$$\text{هو } s' = s'' = \frac{-b}{2a} =$$

$$\frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{-b}{2a} = \text{أي } s' = s'' =$$

مثال 3 : حل في \mathbb{Q} ، المعادلة : $-2s^2 + 6s - 5 = 0$

المعادلة (3) من الشكل $as^2 + bs + c = 0$

$$5 = c \quad ; \quad b = 6 \quad ; \quad 2 = a$$

لدينا : $\Delta = b^2 - 4ac =$

$$(5)(2)4 - 26 =$$

$$4 =$$

بما أن $\Delta > 0$ فالمعادلة (3) لا تقبل حلًا .

مثال 4 : حل ، في ح ، المعادلة : $3s^2 + 26s + 16 = 0$

المعادلة (4) من الشكل $s^2 + bs + c = 0$

$$c = 16, b = 26, a = 3$$

لحسب المميز المختصر Δ'

$$\Delta' = b'^2 - 4a'$$

$$121 = (16)^2 - 4(13) = \Delta'$$

بما أن $\Delta' > 0$ فإن المعادلة (4) تقبل حلّين هما :

$$\frac{\sqrt{\Delta'} - b'}{a} \quad \text{و} \quad \frac{\sqrt{\Delta'} + b'}{a}$$

أي :

$$\frac{\sqrt{121} - 13}{3} \quad \text{و} \quad \frac{\sqrt{121} + 13}{3}$$

$$\text{أي : } s' = -\frac{2}{3} \quad \text{و} \quad s'' = -8$$

ملاحظة : حل المعادلة (4) يمكن استعمال المميز Δ

فنجد $\Delta = 484$ والحسابات تكون أكثر صعوبة

مثال 5 : حل ، في ح ، المعادلة :

$$(t-1)s^2 + 2(t+1)s + t = 0 \quad (5)$$

حيث س هو المجهول و ط وسيط حقيقي

• إذا كان $t-1=0$ أي $t=1$ فإن المعادلة (5)

تكتب $4s + 1 = 0$

فهي إذاً معادلة من الدرجة الأولى ولها حلّ وحيد هو $\left(-\frac{1}{4} \right)$

• إذا كان $t - 1 \neq 0$ أي $t \neq 1$ فإن المعادلة (5)

تصبح معادلة من الدرجة الثانية وهي من الشكل

$$as^2 + bs + c = 0$$

$$= t - 1, \quad b = 2(t + 1), \quad c = t$$

لحسب المميز المختصر Δ :

$$\Delta' = (t + 1)^2 - (t - 1)^2$$

$$= 4t$$

- إذا كان $t + 1 > 0$ أي $t > -1$ فإن

المعادلة (5) لا تقبل حللاً .

- إذا كان $t + 1 = 0$ أي $t = -1$ فإن

المعادلة (5) تقبل حللاً مضاعفاً

$\left(\frac{1}{2} \right)$ أي $\left(\frac{(t+1)^2 - (t-1)^2}{(t+1)(t-1)} \right)$ هو

- إذا كان $t + 1 < 0$ أي $t < -1$

$\left[\infty, -1 \right] \cup \left[1, \frac{1}{3} \right]$ أي $t \in \left[-1, \frac{1}{3} \right]$

فإن المعادلة (5) تقبل حللين متباينين هما :

$$\frac{\sqrt{1 + 4t^2} - (1 + t)}{1 - t} = s'$$

$$\frac{\sqrt{1 + 4t^2} + (1 + t)}{1 - t} = s''$$

2 - المتراجحات من الدرجة الثانية

1.2 - إشارة كثير الحدود من الدرجة الثانية

ليكن تا (س) كثير حدد من الدرجة الثانية

$$\text{تا}(s) = s^2 + bs + c \quad (b \neq 0)$$

لقد رأينا فيما سبق أن :

$$\left[\frac{c-14}{24} - \left(\frac{b}{12} + s \right)^2 \right] < s^2 + bs + c$$

$$\left[\frac{\Delta}{24} - \left(\frac{b}{12} + s \right)^2 \right] < 0 \quad \text{أي تا}(s) > 0$$

لدينا ثلاثة حالات حسب إشارة Δ .

الحالة الأولى $\Delta > 0$

$$0 < \frac{\Delta}{24} - \left(\frac{b}{12} + s \right)^2 \leq 0 \quad \text{و بما أن : } \forall s \in \mathbb{C}$$

$$0 < \frac{\Delta}{24} - \left(\frac{b}{12} + s \right)^2 \quad \text{فإنه } \forall s \in \mathbb{C}$$

وبالتالي تا (س) لا ينعدم وإشارته هي إشارة $+$ وهذا مهما يكن العدد الحقيقي s .

الحالة الثانية $\Delta = 0$

في هذه الحالة يكون تا (س) $= \left(\frac{b}{12} + s \right)^2$

ينعدم تا (س) من أجل $s = -\frac{b}{12}$

وإشارة تا (س) هي إشارة من أجل كل عدد حقيقي س يختلف عن $\frac{b}{12}$.

الحالة الثالثة $0 < \Delta v$

في هذه الحالة يكون

$$\left[\frac{\Delta v + b}{12} - s \right] \left[\frac{\Delta v - b}{12} - s \right] = 0$$

أي $T(s) = 0$ $(s - s')(s - s'')$

$$\frac{\Delta v + b}{12} - s' = \frac{\Delta v - b}{12} - s'' \quad \text{وبغضون } s'$$

ينعدم $T(s')$ من أجل $s = s'$ أو $s = s''$
وإشارة $T(s)$ هي إشارة الجداء 0 $(s - s')(s - s'')$
مهما يكن س يختلف عن s' و s'' .

يبين الجدول التالي إشارة $T(s)$ (بفرض $s' > s''$)

$\infty +$	s''	s'	$\infty -$	s
+	+	0	-	إشارة $(s - s')$
+	0	-	-	إشارة $(s - s'')$
				إشارة
+	0	-	0	$(s - s')(s - s'')$
				إشارة تا (س)
	إشارة *	إشارة (-)	إشارة *	إشارة تا (س)

الخلاصة

ليكن $\Delta(s)$ كثير الحدود من الدرجة الثانية :

$$\Delta(s) = s^2 + bs + c$$

وليكن Δ مميزه ($\Delta = b^2 - 4c$)

- إذا كان $\Delta > 0$ فإن $\Delta(s)$ لا ينعدم وإشارته هي إشارة $+$ وهذا منها يمكن العدد الحقيقي s .




• إذا كان $\Delta = 0$ فإن $\Delta(s)$ يقبل جذراً مضاعفاً

$\left(\frac{s}{12} - \right)^2$ وإشارته هي إشارة $+$ وهذا منها يمكن s مختلف عن

إذا كان $\Delta < 0$ فإن $\Delta(s)$ يقبل جذرین متمايزین

s' و s'' ($s' > s''$) وإشارة $\Delta(s)$ هي :

إشارة $+$ إذا وفقط إذا كان $s \in (-\infty, s']$ ، إشارة $-$ إذا وفقط إذا كان $s \in [s'', \infty)$ ،
إشارة $(-)$ إذا وفقط إذا كان $s \in (s', s'')$



2.2 - حل متراجحة من الدرجة الثانية

نسمى متراجحة من الدرجة الثانية كل متراجحة من الشكل

$$as^2 + bs + c \geq 0 \quad (\text{أو } as^2 + bs + c > 0)$$

أو $as^2 + bs + c \leq 0$ أو $as^2 + bs + c < 0$)

حيث a, b, c أعداد حقيقة و $a \neq 0$

يؤول حل المتراجحة من الدرجة الثانية $as^2 + bs + c \geq 0 \quad (1)$ إلى دراسة إشارة كثير الحدود $(as^2 + bs + c)$. وتعين مجموعة قيم s التي تتحقق (1)

مثال 1 : حل ، في \mathbb{R} ، المتراجحة :

$$(1) \quad 2s^2 - 3s + 1 > 0$$

المتراجحة (1) هي متراجحة من الدرجة الثانية .

لندرس إشارة كثير الحدود $(2s^2 - 3s + 1)$

$$\text{لدينا : } 1 = \Delta(2)(1)(3 - s)^2 = \Delta$$

إذن كثير الحدود $(2s^2 - 3s + 1)$ يقبل جذرین متمايزین هما :

$$1 = \frac{1+3+}{4} = \frac{s''}{s} \quad \text{و} \quad \frac{1}{2} = \frac{1-3+}{4} = \frac{s'}{s}$$

بما أن معامل s^2 موجب فإن كثير الحدود $(2s^2 - 3s + 1)$

يكون سالباً تماماً إذا وفقط إذا كان $s \in]-\frac{1}{2}, 1[$

إذن : مجموعة حلول المتراجحة (1) هي المجال $]-\frac{1}{2}, 1[$

مثال 2 : حل ، في ح ، المتراجحة :

$$2s^2 - s + 1 \leq 0 \quad (2)$$

المتراجحة (2) من الدرجة الثانية .

$$7 - = \Delta = (1 -) (2 +) (1 +) = 4 - ^2$$

بما أن Δ سالب تماماً ومعامل s^2 موجب فإن كثير الحدود .

$(2s^2 - s + 1)$ موجب تماماً منها يمكن العدد الحقيقي s .

إذن :

مجموعة حلول المتراجحة $2s^2 - s + 1 \leq 0$ هي الجموعة ح

مثال 3 : حل ، في ح ، المتراجحة :

$$-4s^2 + 2s + 1 \leq 0 \quad (3)$$

المتراجحة (3) من الدرجة الثانية

$$\text{لندرس إشارة كثير الحدود } (-4s^2 + 2s + 1) .$$

$$\text{لدينا : } \Delta' = (1 -) (4 -) - ^2 = 3 -$$

بما أن Δ' سالب ومعامل s^2 سالب فإن كثير الحدود

$(-4s^2 + 2s + 1)$ سالب تماماً منها يمكن العدد الحقيقي s .

إذن :

مجموعة حلول المتراجحة : $-4s^2 + 2s + 1 \leq 0$ هي الجموعة \emptyset

مثال 4 : حل ، في ح ، الجملة التالية :

$$\left. \begin{array}{l} 2s^2 - 3s + 1 \leq 0 \\ -s^2 + 2s + 1 < 0 \end{array} \right\} \quad (أ)$$

و

$$\left. \begin{array}{l} 2s^2 - 3s + 1 > 0 \\ -s^2 + 2s + 1 > 0 \end{array} \right\} \quad (ب)$$

لتكن y_1 و y_2 مجموعتي حلول المتراجحتين (أ) و (ب) على الترتيب .

مجموعة حلول الجملة (ج) هي الجموعة $y_1 \cap y_2$

تعين المجموعة ي_١

لندرس إشارة كثير الحدود $(2s^2 - 3s + 1)$

$$\text{لدينا } 1 = (1)(2)(3 - 4s^2) = \Delta$$

كثير الحدود $(2s^2 - 3s + 1)$ يقبل جذرین متمايزین هما :

$$1 = \frac{1+3}{4} \quad \text{و} \quad s' = \frac{1}{2} = \frac{1-3}{4}$$

بما أن معامل s^2 موجب فإن كثير الحدود $(2s^2 - 3s + 1)$ يكون موجباً إذا وفقط إذا كان

$\left[\infty, 1 \right] \cup \left[-\frac{1}{2}, \infty \right]$ س يتبع إلى أي :

$$\left[\infty, 1 \right] \cup \left[-\frac{1}{2}, \infty \right] = \text{ي}_1$$



تعين المجموعة ي_٢

لندرس إشارة كثير الحدود $(-s^2 + 2s + 2)$

$$\text{لدينا : } 3 = (2)(1 - s^2) = \Delta'$$

كثير الحدود $(-s^2 + 2s + 2)$ يقبل جذرین متمايزین هما :

$$\sqrt[3]{s-1} = \frac{\sqrt[3]{s+1} - 1}{1} = s'$$


$$\sqrt[3]{s+1} = \frac{\sqrt[3]{s-1} - 1}{1} = s''$$

بما أن معامل s^2 سالب فإن كثير الحدود $(-s^2 + 2s + 2)$

يكون موجباً تماماً إذا وفقط إذا كان

س يتبع إلى الحال $[\sqrt[3]{s+1}, \sqrt[3]{s-1}]$

$$y_2 = [\sqrt[3]{v} + 1, \sqrt[3]{v} - 1]$$



$$y_1 = [\sqrt[3]{v} + 1, 1] \cup [\frac{1}{2}, \sqrt[3]{v} - 1]$$

مثال 5 : لتكن المتراجحة :

$$(5) \quad (t-1)s^2 + 2(t+1)s + t > 0$$

حيث s هو المجهول و t وسيط حقيقي

ولتكن y مجموعة حلولها .

1) إذا كان $t-1=0$ أي $t=1$ فإن :

المتراجحة (5) تكتب : $4s+1>0$ وهي متراجحة من الدرجة الأولى

$$\text{ومنه } y = [\frac{1}{4}, \infty)$$

2) إذا كان $t-1 \neq 0$ أي $t \neq 1$ فإن المتراجحة (5)

تصبح متراجحة من الدرجة الثانية

لنضع $T(s) = (t-1)s^2 + 2(t+1)s + t$

- إشارة تميز $T(s)$

$$T'(s) = (t+1)^2 - t(t-1) = t^2 + 2t + 1 - t^2 + t = 3t + 1$$

$$\frac{1}{3} - t = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} - t < 0 \Leftrightarrow t > \frac{1}{3}$$

• إشارة معامل s^2

معامل s^2 هو $(t - 1)$ ينعدم عند $t = 1$

$$t - 1 < 0 \Leftrightarrow t < 1$$

• نحصل على الجدول التالي :

$\infty +$	1	$\frac{1}{3} -$	$\infty -$	t
$+$	\parallel	$+$	$-$	$'\Delta$
$+$	\circ	$-$	$-$	$1 - t$

النتائج :

• إذا كان $t \in [1, \infty)$ فإن $'\Delta > 0$ و $(t - 1) > 0$

إذن : $\forall s \in \mathbb{C} \quad T(s) > 0$

ومنه $y = \mathbb{C}$

• إذا كان $t \in (-\infty, 1)$ فإن $'\Delta < 0$ و $(t - 1) > 0$

إذن : $T(s)$ يقبل جذرين متمايزين s' و s'' ($s' > s''$)

$T(s) > 0 \Leftrightarrow s \in (-\infty, s') \cup (s'', \infty)$

ومنه $y = [-\infty, s') \cup (s'', \infty]$

• إذا كان $t \in (1, \infty)$ فإن $'\Delta < 0$ و $(t - 1) < 0$

إذن $T(s)$ يقبل جذرين متمايزين s' و s'' ($s' < s''$)

$T(s) > 0 \Leftrightarrow s \in (s', s'')$

ومنه $y = [s', s'']$

• إذا كان $t = -\frac{1}{3}$ فإن $'\Delta = 0$ و $(t - 1) = 0$

إذن تا (س) يقبل جذراً مضاعفاً هو $\left(\frac{1+\sqrt{1+4s}}{1-\sqrt{1+4s}} \right)$ أي

$$0 < s < \infty \quad : \quad \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

$$\left\{ \frac{1}{2} \right\} - \text{ ومنه } y =$$

• إذا كان $\sqrt{1+4s} = 1$ فإن $\sqrt{1+4s} = 0$

$$\left[\frac{1}{4} \right] \quad \text{رأينا أن } y =$$

3 - مجموع وتجاء حلّي معادلة من الدرجة الثانية :

1.3 - مجموع وتجاء حلّي معادلة من الدرجة الثانية :

لتكن المعادلة من الدرجة الثانية :

$$(1) \quad 0 = s^2 + bs + c$$

ولتكن Δ مميزها .

إذا كان $\Delta \leq 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلّين متمايزين أو متساوين هما :

$$\frac{\sqrt{\Delta} - b}{2} \quad \text{و} \quad \frac{-\sqrt{\Delta} - b}{2} = s' \quad \text{لدينا :}$$

$$\frac{\sqrt{\Delta} + b}{2} + \frac{-\sqrt{\Delta} - b}{2} = s' + s''$$

$$s' + s'' = \frac{b}{c}$$

$$\begin{aligned}
 & \left(\frac{\Delta + \omega -}{12} \right) \quad \left(\frac{\Delta - \omega -}{12} \right) = "س' \times س" \\
 & \frac{\Delta - \omega^2}{24} = \\
 & \frac{\omega^2 (\Delta - 4)}{24} = \\
 & \frac{\Delta - 4}{24} =
 \end{aligned}$$

$$س' . س" = \frac{\Delta}{24}$$

2.3 - حساب أحد الحلول بمعرفة الآخر :

لتكن المعادلة من الدرجة الثانية :

$$0 = \omega^2 + \omega س + س'$$

وليكن α حلّاً معلوّماً لهذه المعادلة .

يمكّن حساب الحل الثاني β باستعمال إحدى المساواتين :

$$\frac{\omega}{\alpha} = \beta \quad \text{أي} \quad \frac{\omega}{\alpha} - \beta = \beta + \alpha$$

مثلاً :

لتكن المعادلة $2 س^2 - 3 س + 1 = 0$

نلاحظ أن العدد 1 هو حل هذه المعادلة

إذن الحل الثاني هو العدد β حيث

$$\frac{1}{2} = \beta \quad \text{أي} \quad \frac{1}{2} = \beta \cdot 1$$

3.3 - إشارة حلّي معاوّلة من الدرجة الثانية

يمكن تعين إشارة حلّي معاوّلة من الدرجة الثانية بدون حسابها عملياً وذلك بدراسة إشارة جدائها و إشارة مجموعها .

بالفعل :

- تكون لعددين إشاراتان مختلفتان إذا و فقط إذا كان جدائهما سالباً تماماً .
 - تكون لعددين نفس الإشارة إذا و فقط إذا كان جدائهما موجباً تماماً .
- وتكون عندئذ إشارتها هي إشارة مجموعها .

يتبع من ذلك ما يلي :

إذا كانت $\Delta s^2 + \Delta s + \Delta = 0$ (1) معاوّلة من الدرجة الثانية
وكان Δ مميزها فإن :

$$\left(\begin{array}{l} \text{للالمعادلة (1) حلان} \\ \text{إشاراتها مختلفتان} \end{array} \right) \Leftrightarrow \frac{\Delta}{\Delta} > 0 \bullet$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{للالمعادلة (1) حلان} \\ \text{موجبان تماماً} \end{array} \right) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 0 < \frac{\Delta}{\Delta} \\ \text{و} \\ 0 < \frac{\Delta}{\Delta} \end{array} \right] \bullet$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{للالمعادلة (1) حلان} \\ \text{سالبان تماماً} \end{array} \right) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 0 < \frac{\Delta}{\Delta} \\ \text{و} \\ 0 > \frac{\Delta}{\Delta} \end{array} \right] \bullet$$

أمثلة :

1) المعادلة $3s^2 + 5s - 1 = 0$ هي معادلة من الشكل :

$$as^2 + bs + c = 0$$

$$1 - = \Delta ; \quad 5 + = \Delta ; \quad 3 + = \Delta$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1 - \Delta}{3 + \Delta} = \frac{\Delta}{\Delta}$$

لدينا :
بما أن $\Delta > 0$ فإن هذه المعادلة تقبل حلّيْن إشارتا هما مختلفتان .

2) المعادلة $2s^2 - 5s + 3 = 0$ هي معادلة من الشكل

$$as^2 + bs + c = 0$$

$$3 + = \Delta ; \quad 5 - = \Delta ; \quad 2 + = \Delta$$

لدينا :

$$\frac{3}{2} + = \frac{\Delta}{\Delta}$$

$$1 = (3)(2)4 - 2(5 - \Delta)$$

$$\frac{5}{2} + = \frac{5 - \Delta}{2} = \frac{\Delta}{\Delta}$$

بما أن $\Delta < 0$ فإن هذه المعادلة تقبل حلّيْن موجيْن تماماً

3) المعادلة $s^2 + 10s + 21 = 0$ هي معادلة من الشكل

$$as^2 + bs + c = 0$$

$$21 = \Delta , \quad 10 = \Delta , \quad 1 = \Delta$$

لدينا :

$$21 = \frac{\Delta}{\Delta}$$

$$4 = 21 - 25 = \Delta$$

$$10 = - \frac{\Delta}{\Delta}$$

بما أن $\frac{b}{a} < 0$ و $\Delta' < 0$ و $\Delta > 0$
فإن هذه المعادلة تقبل حلّين سالبين تماماً

4.3 - تمرين محلول

ناقش ، حسب قيم الوسيط الحقيقي ط ، وجود وإشارة حلول المعادلة :

$$(1) \quad 0 = \text{ط}^2 + 4\text{ط} + 2 - \text{س}$$

• إذا كان $\text{ط} + 2 = 0$ أي $\text{ط} = -2$ فإن المعادلة (1) تكتب : $-2 - \text{س} + 4 = 0$ وتقبل حلّاً واحداً موجباً هو 2.

• إذا كان $\text{ط} + 2 \neq 0$ أي $\text{ط} \neq -2$ فإن المعادلة (1) من الدرجة الثانية وهي من الشكل $\text{س}^2 + \text{ب}\text{س} + \frac{\text{ط}}{2} = 0$

$$\text{ط} + 2 = -(\text{ط} + 4) , \quad \frac{\text{ط}}{2} = -\text{س}$$

$$\text{لدينا : } \frac{\text{ط}}{2} = \frac{\text{ط} - 2}{\text{ط}}$$

إشارة $\frac{\text{ط}}{2}$ هي إشارة الجداء $(\text{ط} + 2)(\text{ط} - 2)$ الذي هو كثير حدود

من الدرجة الثانية جذراه $(-\text{ط})$ و $(+\text{ط})$

ومعامل ط^2 فيه هو (-1) .

$$\Delta = (\text{ط} + 4)^2 - 4(\text{ط} + 2)^2$$

$$= \text{ط}^2 + 8\text{ط} + 5$$

Δ هو كثير حدود من الدرجة الثانية جذراه $\left(-\frac{8}{5} \right)$ و 0 ومعامل

ط² فيه هو $(+5)$

$$\frac{\text{ب}}{\text{ط} + 2} = \frac{4 + \text{ط}}{\text{ط} - 1}$$

إشارات $\left(\frac{-}{+} - \frac{-}{+} \right)$ هي إشارة الجداء $(ط + 4)(ط + 2)$ الذي هو كثير حدود من الدرجة الثانية جذراه (-4) و (-2) ومعامل ط² فيه هو $(1 +)$

يبين الجدول التالي إشارة كل من $\frac{-}{+}$ و Δ و $\frac{+}{-}$ والنتائج الممكنة

	$\frac{-}{+}$	Δ	$\frac{+}{-}$	ط
يوجد حلان إشاراتهما مختلفتان	+	+	-	$\infty -$
حل واحد موجب يساوي 2	0	-	-	$4 -$
يوجد حلان موجبان	-	+	-	$2 -$
حل مضاعف موجب يساوي 3	0	+	+	$8 -$
لا توجد حلول	+	-	+	$5 -$
حل مضاعف موجب يساوي 1	0	-	-	0
يوجد حلان موجبان	+	+	+	
حلان أحدهما معدوم والآخر	0	-	-	2
$\frac{3}{2}$ موجب وهو				
يوجد حلان موجبان	+	+	+	$\infty +$

جمل معادلات

جمل متراجمات

1 - عموميات :

1.1 - الدوال العددية لمتغيرين حقيقيين :

تسمى كل دالة للمجموعة $\mathbb{X} \times \mathbb{X}$ في المجموعة \mathbb{X} دالة عددية لمتغيرين حقيقيين .

أمثلة :

1) الدالة تا للمجموعة $\mathbb{X} \times \mathbb{X}$ في المجموعة \mathbb{X} المعرفة كما يلي :

$$\text{تا}(s, u) = s^2 + u^2 - s + u + 1$$

هي دالة عددية لمتغيرين الحقيقيين s, u .

مجموعة تعريفها هي $\mathbb{X} \times \mathbb{X}$.

لدينا مثلا : $\text{تا}(1, 0) = 1 + 0 + 1 - 0 + 1 = 3$

$$\text{تا}(0, 1) = 1 + 1 + 0 - 1 + 0 = 1$$

2) الدالة ها للمجموعة $\mathbb{X} \times \mathbb{X}$ في المجموعة \mathbb{X} المعرفة كما يلي :

$$\text{ها}(s, u) = 3s - 2u + 5$$

هي دالة عددية لمتغيرين الحقيقيين s, u .

مجموعة تعريفها هي $\mathbb{X} \times \mathbb{X}$.

لدينا مثلا : $\text{ها}(2, 1) = 5 + 2 \times 2 - 1 \times 3 = 4$

$$\text{ها}(1, 2) = 5 + 4 \times 2 - 1 \times 3 = 1$$

3) الدالة لا للمجموعة $\mathbb{X} \times \mathbb{X}$ في المجموعة \mathbb{X} المعرفة كما يلي :

$$\text{لا}(s, u) = \frac{s}{u} + \frac{u}{s}$$

هي دالة عددية لمتغيرين الحقيقيين s, u .

مجموعة تعريفها هي $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$

لدينا مثلا : لا $(2, 1 -)$

$$3 = 1 + 1 + 1 = (1, 1)$$

2.1 - المعادلات ذات المجهولين حقيقيين :

نسمى معادلة ذات المجهولين الحقيقيين س ، ع كل معادلة من الشكل
تا (س ، ع) = 0 حيث تا هي دالة عدديه للمتغيرين الحقيقيين
س ، ع .

إذا كان تا (س ، ع) كثير حدود من الدرجة الأولى نسمى المعادلة
تا (س ، ع) = 0 معادلة من الدرجة الأولى ذات المجهولين س ، ع .

نسمى حلّاً للمعادلة تا (س ، ع) = 0 كل ثانية (س_٠ ، ع_٠) من
ع × ع تتحقق المساواة تا (س_٠ ، ع_٠) = 0 .

حل المعادلة تا (س ، ع) = 0 هو تعين مجموعة حلولها .

أمثلة :

1) في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ المعادلة $s^2 + u^2 - 2s + 4u = 0$

هي معادلة ذات المجهولين الحقيقيين س ، ع .

الثانية (-1 ، -1) هي حل هذه المعادلة

الثانية (1 ، 0) ليست حل هذه المعادلة

2) في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ المعادلة : $s + 2u - 3 = 0$ هي معادلة من الدرجة

الأولى ذات المجهولين الحقيقيين س ، ع .

الثانية (1 ، 1) هي حل هذه المعادلة

الثانية (-1 ، 3) ليست حل هذه المعادلة .

3) لتكن ، في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ، المعادلة من الدرجة الأولى ذات المجهولين

$$s + u : 3s - u = 0$$

يمكن كتابة (1) على الشكل $U = 3S + 4$
 مجموعة حلول المعادلة (1) هي المجموعة $\{U : S \in \mathbb{R} \text{ و } U = 3S + 4\}$

3.1 - المعادلات المتكافئة :

- تكون المعادلتان $T(S, U) = 0$ و $H(S, U) = 0$ متكافئتين إذا وفقط إذا كانت لهما نفس مجموعة الحلول .
 نكتب عندئذ : $T(S, U) = 0 \Leftrightarrow H(S, U) = 0$
- لتكن T و H دالتين عددديتين للمتغيرين الحقيقيين S ، U معرفتين على نفس المجموعة ولتكن k عدداً حقيقياً غير معدوم .
 لدينا :

$$T(S, U) = 0 \Leftrightarrow T(S, U) + H(S, U) = H(S, U)$$

$$T(S, U) = 0 \Leftrightarrow k \times T(S, U) = 0$$

4.1 - جمل معادلتين :

- لتكن $T(S, U) = 0$ و $H(S, U) = 0$ معادلتين للمجهولين S ، U .

كل ثنائية (S_0, U_0) تتحقق في آن واحد المساواتين
 $T(S_0, U_0) = 0$ و $H(S_0, U_0) = 0$ تدعى حلاً للجملة

$$\left. \begin{array}{l} T(S, U) = 0 \\ H(S, U) = 0 \end{array} \right\}$$

حل هذه الجملة هو إيجاد مجموعة حلولها .

تكون جملتان متكافئتين إذا وفقط إذا كانت لهما نفس مجموعة الحلول .
 من الواضح أنه إذا كانت لدينا جملة معادلتين وبدلنا إحدى المعادلتين بمعادلة مكافئة لها نحصل على جملة مكافئة للجملة الأولى .

مثلاً :

$$\left. \begin{array}{l} 0 = 1 + \text{ع} - 2\text{س} \\ 0 = 5 + \text{س} + \text{ع}^2 + \text{س}^2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} \text{ع} = 2\text{s} + 1 \\ \text{س}^2 + \text{ع}^2 + \text{س} + \text{ع} = 5 \end{array} \right\}$$

زيادة على ذلك توجد قواعد تسمح بتبديل جملة مفروضة بجملة مكافئة لها .

وننص فيما يلي على قاعدتين من هذه القواعد وهما قاعدة التعييض (أو طريقة التعييض) وقاعدة الجمع (أو طريقة الجمع) .

2 - حل جملة معادلتين بجهولين

1.2 - طريقة التعييض

قاعدة

في المجموعة $\mathcal{H} \times \mathcal{H}$

إذا كان تا (س ، ع) \Leftrightarrow 0 = ل (س) فإن :

$$\left. \begin{array}{l} \text{ع} = \text{l}(\text{s}) \\ \text{ها}(\text{s}, \text{l}(\text{s})) = 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} \text{تا}(\text{s}, \text{ع}) = 0 \\ \text{ها}(\text{s}, \text{ع}) = 0 \end{array} \right\}$$

مثال 1

$$\left. \begin{array}{l} 0 = 3 - س - ع \\ 0 = 1 + ع 5 + س 2 \end{array} \right\} \text{ حل ، في } \mathbb{C} \times \mathbb{C} \text{ ، الجملة التالية :}$$

$$\left. \begin{array}{l} 3 - س = ع \\ 0 = 1 + ع 5 + س 2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} 0 = 3 - س - ع \\ 0 = 1 + ع 5 + س 2 \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} 3 - س = ع \\ 0 = 1 + (3 - س) 5 + س 2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} 3 - س = ع \\ 0 = 14 - س 7 \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} 3 - س = ع \\ س = 2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} س = 2 \\ 1 - ع = س \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

إذن مجموعة حلول الجملة المعطاة هي : { (1 - ع, 2) }

مثال 2

$$\left. \begin{array}{l} 0 = 5 - ع^2 + س \\ 0 = 7 - ع 3 + س \end{array} \right\} \text{ حل ، في } \mathbb{C} \times \mathbb{C} \text{ ، الجملة :}$$

$$\left. \begin{array}{l} {}^2\text{ع} - 5 = \text{س} \\ 0 = 7 - \text{ع} 2 + \text{س} 3 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} 0 = 5 - {}^2\text{ع} + \text{س} \\ 0 = 7 - \text{ع} 2 + \text{س} 3 \end{array} \right\}$$

$$0 = 7 - \text{ع} 2 + ({}^2\text{ع} - 5) 3$$

$$\left. \begin{array}{l} {}^2\text{ع} - 5 = \text{س} \\ {}^2\text{ع} - 5 = \text{س} \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$0 = 8 + \text{ع} 2 + {}^2\text{ع} 3 -$$

المعادلة $(0 = 8 + {}^2\text{ع} 2 + {}^2\text{ع} 3 -)$ هي معادلة من الدرجة الثانية ذات المجهول ع .

$$25 = (8)(3-) - {}^2(1) = ' \Delta$$

إذن تقبل هذه المعادلة حلّين هما

$$2 = \frac{5 - 1 -}{3 -} = ' \text{ع}$$

$$\frac{4}{3} - = \frac{5 + 1 -}{3 -} = " \text{ع}$$

$$\frac{4}{3} - = \frac{\text{أو ع}}{\text{أو ع}} 2 = \text{ع} \Leftrightarrow 0 = 8 + \text{ع} 2 + {}^2\text{ع} 3 -$$

وبالتالي :

$$\left. \begin{array}{l} {}^2\text{ع} - 5 = \text{س} \\ \frac{4}{3} - = \text{ع} 2 + \text{أو ع} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} {}^2\text{ع} - 5 = \text{س} \\ 0 = 8 + \text{ع} 2 + {}^2\text{ع} 3 - \end{array} \right\}$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{أو } 2 = س + ع \\ \text{أو } \frac{4}{3} = س - ع \end{array} \right] \Leftrightarrow$$

$$\left[\begin{array}{l} س = 1 - ع \\ س = \frac{29}{9} - ع \end{array} \right] \Leftrightarrow$$

إذن مجموعة حلول الجملة المعطاة هي :

$$\left\{ \left(\frac{4}{3}, -\frac{29}{9} \right), (2, 1) \right\}$$

2.2 - طريقة الجمع :

قاعدة

إذا كان α و β عددين حقيقيين حيث $\alpha \neq 0$ فإن :

$$\left. \begin{array}{l} 0 = تا(س, ع) + \alpha تا(س, ع) + \beta ها(س, ع) \\ 0 = ها(س, ع) \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} 0 = تا(س, ع) \\ 0 = ها(س, ع) \end{array} \right\}$$

مثال 1

حل ، في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ، الجملة

$$0 = 1 - س^5 + ع^3 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad (1)$$

$$0 = 7 + ع^3 + س^2 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad (2)$$

$$0 = (7 + ع^3 + س^2) 3 \rightarrow (1 - س^5 + ع^3) 2 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \iff (1)$$

$$0 = 7 + ع^3 + س^2$$

$$0 = 21 - س^6 - ع^9 - س^2 - ع^10 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \iff (1)$$

$$0 = 7 + ع^3 + س^2 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \iff (1)$$

$$23 = ع \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \iff (1)$$

$$0 = 7 + ع^3 + س^2 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \iff (1)$$

$$23 = ع \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \iff (1)$$

$$38 - = س \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \iff (1)$$

إذن الجملة (1) تقبل حالاً واحداً هو الثنائيه (-23 ، 38)

مثال 2

حل ، في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ الجملة :

$$0 = 4 - سع + س^2 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad (1)$$

$$0 = 1 + س + سع \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad (1)$$

$$0 = (1 + س) + (4 - سع + س^2) \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \iff (1)$$

$$0 = 1 + س + سع \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 = 3 - s^2 + 2s \\ 0 = 1 + s + s^2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow (1)$$

المعادلة $(s^2 + 2s - 3 = 0)$ هي معادلة من الدرجة الثانية
تقبل حلّيْن s' ، s'' : $s' = 1$ و $s'' = -3$
يكون عندئذ :

$$\left. \begin{array}{l} s = 1 \text{ أو } s = -3 \\ s = 1 + s + s^2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} s = 1 + 1 + s \\ s = 1 + 3 - s \end{array} \right] \Leftrightarrow (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} 2 = s + s \\ 2 = 3 - s \end{array} \right] \Leftrightarrow (1)$$

$$\frac{2}{3} = s - 3 \quad \text{و} \quad s = \frac{2}{3} + 3$$

إذن مجموعة حلول الجملة (1) هي :

$$\left\{ \left(\frac{2}{3}, -3 \right) ; (2, 1) \right\}$$

3 - حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بجهولين

لتكن جملة المعادلتين من الدرجة الأولى للمجهولين الحقيقيين s ، u :

$$\left. \begin{array}{l} 0 = s + u + su \\ 0 = s' + u' + s'u' \end{array} \right\}$$

لماً هذه الجملة يمكن استعمال احدى الطرقتين (التعويض أو الجمع) اللتين تم عرضها في الفقرة السابقة ؛ ونقدم فيما يلي طريقة أخرى لدراسة هذه الجملة في حالة :

$$(a, b) \neq (0, 0) \text{ و } (a', b') \neq (0, 0)$$

في المستوى المنسوب إلى معلم $(m, 0, 0)$

المعادلة $a's + b'u - h = 0$ حيث $(a, b) \neq (0, 0)$.

هي معادلة لمستقيم (Δ) والمعادلة $a's' + b'u' - h' = 0$ حيث $(a', b') \neq (0, 0)$ هي معادلة لمستقيم (Δ') .

الشعاع \overleftrightarrow{s} هو شعاع توجيه لمستقيم (Δ)

والشعاع $\overleftrightarrow{s'}$ هو شعاع توجيه لمستقيم (Δ')

تكون الثنائية (s, u) حلًا للجملة ،

$$\left. \begin{array}{l} a's + b'u - h = 0 \\ a's' + b'u' - h' = 0 \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} a's + b'u - h = 0 \\ a's' + b'u' - h' = 0 \end{array} \right\}$$

إذا وفقط إذا كان (s, u) أحداًثي نقطة مشتركة لمستقيمين (Δ) و (Δ') .

نعلم أن المستقيمين (Δ) و (Δ') يتوازيان إذا وفقط

إذا كان المحدد $\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}$ معدوماً

ويتقاطعان ، إذا . إذا وفقط إذا كان هذا المحدد غير معدوم .

المناقشة :

1) إذا كان $\begin{vmatrix} 1 & b \\ a' & b' \end{vmatrix} \neq 0$ فإن المستقيمين (Δ) و (Δ') يتقاطعان في

نقطة واحدة إحداثياها (s, u) .

إن حساب s و u باستعمال إحدى الطريقتين (التعويض أو الجمع)

يعطى :

$$s = \frac{\begin{vmatrix} 1 & b \\ a' & b' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}} \quad \text{و} \quad u = \frac{\begin{vmatrix} b & 1 \\ b' & a' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}}$$

2) إذا كان $\begin{vmatrix} 1 & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = 0$ يكون المستقيمان (Δ) و (Δ') متوازيين :

يوجد عندئذ عدد حقيقي غير معدوم λ حيث :

$$\lambda = a' s + b' u \quad \text{أي} \quad \lambda = a' s + b' u$$

- إذا كان $a' = b$ فإن المعادلتين $as + bu + h = 0$ و $a's + b'u + h = 0$ هما معادلتان لنفس المستقيم .

وتكون عندئذ مجموعة حلول الجملة هي مجموعة حلول إحدى المعادلتين

- إذا كان $a' \neq b$ يكون المستقيمان المتوازيان (Δ) و (Δ') متساويان تقاطعهما هو المجموعة الخالية والجملة ، عندئذ ، ليس لها حال .

الخلاصة :

لتكن ، في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ، جملة المعادلتين من الدرجة الأولى للمجهولين s, u :

$$\left. \begin{array}{l} 0 = s + u \\ 0 = s' + u' \end{array} \right\} \quad (1)$$

- إذا كان : $s - s' \neq 0$ فإن الجملة (1) تقبل حلًا واحدًا
- إذا كان $s - s' = 0$ فإن الجملة (1) :
 - إما ليس لها حل . وإما لها عدد غير مته من الحلول .

مثال 1 :

لتكن ، في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ، الجملة

$$0 = 10 - 2u \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

$$0 = 15 - 3s \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

$$5 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{لدينا :}$$

بما أن محدد الجملة غير معدوم فهي ، إذاً ، تقبل حلًا واحدًا .

حساب s, u :

$$3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 10 \\ 3 & 15 \end{vmatrix}}{5} = u \quad ; \quad 4 = \frac{\begin{vmatrix} 10 & 2 \\ 15 & 1 \end{vmatrix}}{5} = s$$

الحل الوحيد للجملة هو الثنائيه (4, 3)

مثال 2 :

لتكن ، في $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ ، الجملة

$$\left. \begin{array}{l} 2 = 4 - s^4 \\ 1 = -2 - s^3 + s^2 \end{array} \right\}$$

لدينا :

$$\left. \begin{array}{l} (1) \quad 0 = 2 - 4 - s^6 \\ (2) \quad 0 = 1 + -2 - s^3 + s^2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} 2 = 4 - s^6 \\ 1 = -2 - s^3 + s^2 \end{array} \right\}$$

لنحسب محدد الجملة السابقة :

$$0 = \begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} : \text{لدينا}$$

فالجملة إذاً إما ليس لها حل و إما لها عدد غير منتهٍ من الحلول .

نلاحظ أن :

$$(1) \Leftrightarrow 0 = (1 + 2 - s^3 + s^2)$$

$$0 = 1 + 2 - s^3 + s^2 \Leftrightarrow$$

$$(2) \Leftrightarrow$$

إذن مجموعة حلول الجملة المعطاة هي مجموعة حلول المعادلة (2)

وهي :

$$\left\{ \frac{1 - s^2}{3} = u \in \mathbb{C} : (s, u) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C} \right\} = (x)$$

مثال 3

لتكن ، في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ، الجملة

$$\left. \begin{array}{l} 0 = 2 - س + ع^2 \\ 0 = 1 + ع - 3س \end{array} \right\}$$

لنسكب محدد هذه الجملة

$$0 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{ندينا :}$$

فاجملة ، إذاً ، إما ليس لها حل وإما لها عدد غير منته من الحلول

$$\begin{array}{ccc} \left. \begin{array}{l} 0 = 6 + ع - 3س \\ 0 = 1 + ع - 3س \end{array} \right\} & \Leftrightarrow & \left. \begin{array}{l} 0 = 2 - س + ع^2 \\ 0 = 1 + ع - 3س \end{array} \right\} \\ & & \left. \begin{array}{l} 6 = 3س - ع \\ 3 = س - ع \end{array} \right\} \\ & & \left. \begin{array}{l} 1 = 3س - ع \\ 3 = س - ع \end{array} \right\} \end{array} \quad \Leftarrow$$

من الواضح أنه لا يمكن أن يكون $(3س - ع)$ مساوياً في آن واحد (-1) و (-6) إذن الجملة المعطاة ليس لها حل .

4 - حل متراجحات من الدرجة الأولى ذات مجهولين

1.4 - المتراجحات من الدرجة الأولى ذات المجهولين

• نسمى متراجحة من الدرجة الأولى ذات المجهولين الحقيقيين


$س < ع$ كل متراجحة من الشكل تا $(س ، ع) < 0$

$$\left(أو تا (س ، ع) \leq 0 \text{ أو } تا (س ، ع) > 0 \text{ أو } تا (س ، ع) \geq 0 \right)$$

- حيث تا (s, u) هو كثير حدود من الدرجة الأولى للمتغيرين الحقيقيين s, u .
- نسمى حال المتراجحة تا (s, u) < 0 كل ثنائية (s_0, u_0) من $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ تتحقق المتباينة تا (s_0, u_0) < 0 .
 - حل المتراجحة تا (s, u) < 0 هو تعين مجموعة حلولها.
- مثال :
- في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ، المتراجحة $3s + u - 4 < 0$ هي متراجحة من الدرجة الأولى ذات الجهولين s, u .
- الثنائية $(0, 1)$ هي حل لهذه المتراجحة .
- الثنائية $(2, 1)$ ليست حل لهذه المتراجحة .
- يمكن كتابة المتراجحة $(3s + u - 4 < 0)$ على الشكل :
- $$u < 4 - 3s$$
- مجموعة حلول هذه المتراجحة هي المجموعة \mathcal{H} حيث
- $$\left\{ (s, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : s \in \mathbb{R} \text{ و } u < 4 - 3s \right\} = \mathcal{H}$$
- 2.4 - إشارة ($s + bu + c$)**
- المستوي منسوب إلى معلم (m, o, i).
- ، b, c ثلاثة أعداد حقيقة حيث $(1, b) \neq (0, 0)$.
- لتكون الدالة تا للمستوي في \mathbb{R} التي ترافق بكل نقطة \mathfrak{P} (s, u) العدد الحقيقي تا (\mathfrak{P}) $= as + bu + c$
- لندرس إشارة تا (\mathfrak{P}) حسب وضعية النقطة \mathfrak{P} في المستوي .
 - مجموعه النقط \mathfrak{P} حيث تا (\mathfrak{P}) $= 0$ هي المستقيم (Δ) الذي معادله : $as + bu + c = 0$

الشعاع \overleftrightarrow{sh} هو شعاع توجيه للمستقيم (Δ)

لتكن \vec{h} نقطة من المستقيم (Δ) و
 \vec{h}' نقطة من المستوى لا تنتمي إلى (Δ) . (الشكل 1)



ولتكن $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ مركبتي \vec{sh} . لدينا : أي $\alpha + \beta \neq 0$ لأن \vec{h}' لا يوازي \vec{sh} (الشكل 1)

من أجل كل نقطة \vec{h} من المستوى ، المستقيم الذي يشمل \vec{h} ويوازي \vec{h}' يقطع (Δ) في نقطة \vec{h}'' (s' ، u') .

$$\text{من تا } (\vec{h}'') = \alpha s' + \beta u' \Rightarrow 0 = \alpha s' + \beta u'$$

و $\vec{h}'' = \lambda \vec{h}'$ نستنتج :

$$\left. \begin{array}{l} \alpha \lambda + s' = s' \\ \beta \lambda + u' = u' \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha \lambda = s' - s' \\ \beta \lambda = u' - u' \end{array} \right\}$$

إذن :

$$\begin{aligned} \text{تا } (\vec{h}'') &= (\alpha s' + \beta u') + \lambda (\alpha \lambda + \beta \lambda) \\ &= (\alpha s' + \beta u') + (\alpha + \beta) \lambda = \\ &= (\alpha + \beta) \lambda = \end{aligned}$$

بما أن $(\alpha + \beta) \lambda$ عدد حقيقي ثابت غير معروف فإن إشارة λ هي التي تحدد إشارة تا (\vec{h}'') .

إذا كان Π_1 نصف المستوي المفتوح الذي يشمل \mathcal{C}_0 والمحدد بالمستقيم (Δ) و Π_2 نصف المستوي المفتوح الآخر المحدد بالمستقيم (Δ) فإن العلاقة $\mathcal{C} = \lambda \mathcal{C}_0$ تبيّن ما يلي :

$$\mathcal{C} = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0 \bullet$$

$$\mathcal{C} < 0 \Leftrightarrow \lambda > 1 \bullet$$

$$\mathcal{C} > 0 \Leftrightarrow \lambda < 1 \bullet$$

ومنه النتيجة التالية \bullet

لا تتغير إشارة العدد λ لما تتغير النقطة \mathcal{C} في أحد نصفي المستوي المفتوحين المحددين بالمستقيم (Δ)


مثال : إشارة $(2s + 3u + 1)$ من أجل المبدأ m للمعلم الذي احداثياته $(0, 0)$ لدينا $t_a(m) < 0$ إذن $t_a(m) = 1$ وبالتالي يكون $(2s + 3u + 1)$ موجباً تماماً من أجل كل نقطة تنتهي إلى نصف المستوي المفتوح الذي يشمل m والمحدد بالمستقيم (Δ) الذي معادلته $2s + 3u + 1 = 0$. ويكون $(2s + 3u + 1)$ سالباً تماماً من أجل كل نقطة تنتهي إلى نصف المستوي المفتوح الآخر المحدد بالمستقيم (Δ) .

3.4 - الحل البياني لمتراجحات من الدرجة الأولى ذات مجهولين

حسب ما سبق فإن التثيل البياني لمجموعه حلول متراجحة من الدرجة الأولى ذات مجهولين هو نصف مستوٍ .

مثال :

التثيل البياني لمجموعه حلول



$$\text{المراجحة : } 0 < 5 + \frac{1}{s} - u$$

ليكن (Δ) المستقيم الذي معادلته : $2s - u = 5$
 ولتكن Π_1 نصف المستوى المفتوح الذي يشمل المبدأ 0 والمحدد بالمستقيم (Δ) و Π_2 نصف المستوى المفتوح الآخر المحدد بالمستقيم (Δ) (الشكل 2).

لنضع $T_a(\Delta) = 2s - u + 5$
 لدينا : $T_a(\Delta) = 5 + 0 - 0.2 = 5 + 0$ إذن $T_a(\Delta) > 0$
 تمثل مجموعة حلول المراجحة المقترحة بنصف المستوى Π_1 غير المشطوب في
 الشكل 2

4.4 - الحل البياني لجملة مراجحات من الدرجة الأولى بجهولين

لتكون الجملة : $\left\{ \begin{array}{l} s + u + 2 \leq 0 \\ s + u + 2 > 0 \end{array} \right. \quad (1)$

$\left\{ \begin{array}{l} s + u + 2 > 0 \\ s + u + 2 < 0 \end{array} \right. \quad (2)$

مجموعة حلول الجملة هي مجموعة الثنائيات (s, u) التي تتحقق ، في آن واحد . (1) و (2) .

نعلم أن :

مجموعة حلول المراجحة (1) ممثلة بنصف مستوى مغلق \mathbb{H}_1 و مجموعة حلول المراجحة (2) ممثلة بنصف مستوى مفتوح \mathbb{H}_2 .


وبالتالي :

تكون مجموعة حلول الجملة المقترحة ممثلة بالمجموعة $\mathbb{H}_1 \cap \mathbb{H}_2$.

مثال : $\left\{ \begin{array}{l} s + u - 3 \leq 0 \\ s + u - 3 > 0 \end{array} \right. \quad (1)$

$\left\{ \begin{array}{l} 2s - u > 0 \\ 2s - u < 0 \end{array} \right. \quad (2)$

الحل البياني للجملة



(الشكل ٣)

المستوي منسوب إلى المعلم ($m = 0, n = 1$)

• مجموعة حلول المتراجحة (1)

مثلة بنصف مستو مغلق خدّه المستقيم (Δ_1) الذي معادلته

$$x + y = 3$$

(الشكل ٣)

الثانية ($0 < 0$) ليست حللا

للمتراجحة (1).

لنشطب إذاً نصف المستوي

المفتوح المحدد بالمستقيم (Δ_1),

الذي يشمل المبدأ

هذا نصف المستوي المشطوب يمثل مجموعة الثنائيات التي ليست حولا

للمتراجحة (1).

• مجموعة حلول المتراجحة (2) مثلة بنصف مستوٍ مفتوح خدّه المستقيم

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4$$

الثانية ($0 < 1$) حل للمتراجحة (2).

لنشطب إذاً نصف المستوي المغلق المحدد بالمستقيم (Δ_2) والذي لا

يشمل النقطة $(1, 0)$.

هذا نصف المستوي المشطوب يمثل مجموعة الثنائيات التي ليست حولا

للمتراجحة (2).

• مجموعة حلول الجملة مثلة بتقاطع نصفي المستوي اللذين يمثلان حلول

المتراجحتين على الترتيب وهو الجزء غير المشطوب في الشكل.

تمارين

كثيرات الحدود :

1. أُنجز العمليات التالية على وحيدات الحد للمتغير s ثم عين ، في كل حالة . درجة وحيد الحد الناتج :

$$\left(s^2 - \frac{3\sqrt{5}}{2} \right)^2 \left(s^3 - \frac{3\sqrt{3}}{2} \right) \left(s^2 + \frac{3\sqrt{2}}{5} \right) .$$

$$= s^7 - s^2 + \frac{2}{5}s^2 + \frac{1}{3}s^2 - 50\sqrt{3} .$$

2. 1) بسط ورتب كثيرات الحدود $T(s)$ ، $H(s)$ ، $U(s)$ التالية

$$T(s) = \frac{1}{2} s^4 + 2s^3 + s^2 - 2s$$

$$H(s) = s - 5 + s^2 - s^2 (s - 5)$$

$$U(s) = s^2 - s - (s^2 - s + \sqrt{3})$$

2) احسب ورتب المجاميع التالية :

$$T(s) + H(s) + U(s)$$

$$T(s) - H(s) + U(s)$$

$$- T(s) + H(s) - U(s)$$

3. $T(s)$ ، $H(s)$ ، $U(s)$ كثيرات حدود حيث :

$$T(s) = s^3 + 3s^2 - 7s + 5$$

$$H(s) = 2s^3 - 3s^2 + 2s - 1$$

$$U(s) = 3s^3 + 5s - 2$$

أحسب ورتب كثيرات الحدود التالية :

$$K(s) = 2T(s) + 2H(s) - U(s)$$

$$L(s) = 2H(s) + 2U(s) - T(s)$$

$$T(s) = 2U(s) + 2T(s) - H(s)$$

$$M(s) = T(s) + H(s) + U(s)$$

$$N(s) = K(s) + L(s) + T(s)$$

4. تا (س) ، ها (س) ، عا (س) كثيرات حدود حيث :

$$\text{تا (س)} = -s^2 + s^3 + 5$$

$$\text{ها (س)} = \frac{1}{2} s^2 + s^3 - 3\sqrt{2}$$

$$\text{عا (س)} = \frac{5}{2} s^3 + s^5 - 3\sqrt{2}$$

$$\left(\frac{2}{\sqrt[3]{3}} \right) \text{ أحسب تا (-1)} ; \text{ ها (-2)} ; \text{ عا}$$

5. أحسب الجداءات التالية :

$$(s^4 + 8s^2)(7 - s^2)(s - 1)$$

$$(s^3 + 2s^2 + s - 1)(s^3 - 2s^2 + s + 1)$$

$$(s^2 + s + 1)(s^2 - s + 1)(s^2 + s - 1)$$

6. حل كل من كثيرات الحدود التالية :

$$(1) (s - 7)(s - 1)(3s + 2)$$

$$(2) (s - 4)(s - 3)(2s - 1)(3s + 2)(3s - 4)$$

$$(3) (2s^2 + 4s + 3)(s + 2)$$

$$(4) (s^2 - 9)(s + 5)(s - 3)$$

$$(5) (s^2 - 4s - 2)(s^2 - 4s - 4)$$

$$(6) (s^2 - 10s - 3)(s - 3)(s - 5)$$

$$(7) (s^2 - 16)(s + 4)(s^2 - 4)$$

$$(8) (s^3 - 16s^2 - 3s + 4)(s - 12)$$

$$(9) (s^2 - 18s + 24)(s + 3)(s^2 + 8s + 2)$$

$$(10) (s^2 - 12s + 9)(s - 4)(s + 6)(s - 4)$$

$$(11) (s^2 - 2s - 1)(s + 1)(s - 1)(s^2 - 2s - 1)$$

$$(12) (s^2 + 2s + 9)(s^2 - 6s + 9)(s^2 - 1)$$

$$(13) (s^2 - 4s - 4)(s^2 - 4s - 4)(s^2 - 1)$$

$$(14) (s^2 + 4s + 4)(s^2 - 4s + 4)(s^2 + 4s + 4)$$

$$1 - 2s^2 - 3s^3 + 4s^4 \quad (15)$$

$$(s^2 - 8) + (s^3 - 4) \quad (16)$$

$$(2s - 1) + s^3 - 8s^2 \quad (17)$$

$$2s^2 - 6s^6 + 6s^4 \quad (18)$$

7. تا (س) و ها (س) كثيرا حدود حيث :

$$ta(s) = s^4 - 6s^3 + 13s^2 - 12s + 4$$

$$ha(s) = s^4 + s^2 + 1$$

عِين الأعداد الحقيقة ١، ٢، ٣، ٤، ٥ بحسب يكون :

$$\forall s \in \mathbb{R} : (s^2 + 1)s + 5 = ta(s)$$

$$\forall s \in \mathbb{R} : (s^2 + s + 1)(s^2 + 1)s + 5 = ha(s).$$

8. تا (س) كثير حدود حيث :

$$ta(s) = s^5 - 4s^3 + 5s + 10$$

عِين كثير الحذو ها (س) بحسب يكون :

$$\forall s \in \mathbb{R} : ta(s) = (s+2)ha(s)$$

9. تا (س) و ها (س) كثيرا حدود حيث :

$$ta(s) = s^3 - 13s^2 + 5s + 34$$

$$ha(s) = s^4 - s^2 + 2s - 1$$

هل توجد أعداد حقيقة ١، ٢، ٣، ٤، ٥ بحسب يكون :

$$\exists s \in \mathbb{R} : (s-2)(s^2 + 1)s + 5 = ta(s)$$

$$\forall s \in \mathbb{R} : (s^2 + s - 1)(s^2 + 1)s + 5 = ha(s)$$

10. تا (س) كثير حدود حيث :

$$ta(s) = s^4 - s^3 + 2s^2 - 2$$

أحسب تا (١) واستنتج تحليلًا لكثير الحذو تا (س).

11. تا (س) كثير حدود حيث :

$$ta(s) = s^3 - 5s^2 + 18$$

أوجد كثير حذو ها (س) بحسب يكون :

$$\forall s \in \mathbb{R} : ta(s) = (s-3)ha(s).$$

$$12. \frac{1 - s^2}{3 - 2s} = \frac{2}{s^2 - 3s + 1}$$

1) عين مجموعة التعريف للدالة الناطقة بـ

2) عين الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث يكون :

$$\forall s \in \mathbb{R} : T(s) = as^2 + bs + c$$

$$1. \text{ نفس المرين السابق من أجل } T(s) = \frac{s^5 + s^2 - 3}{2s - 2}$$

14. عين مجموعة التعريف لـ كل كسر من الكسور الناطقة التالية . ثم اخترل كل منها :

$$\frac{s^4 + s^3 + s^2 + s}{s^8 + s^2} \quad (2) \quad \frac{15s^2 + 8s^8}{s^2 + s^3} \quad (1)$$

$$\frac{s^3 + s^2 + 10s}{(s^2 - 1)(s^2 - 2)} \quad (3)$$

$$\frac{6}{1 + s} - \frac{s - 3}{s^2 - 1} + \frac{s^2}{s^2 - 1} \quad (4)$$

$$\frac{12 + s}{s^2 - 2s} - \frac{54 - s^2}{s^3 - 2s^2} - \frac{s^3 + s^2 + s^3}{s^3 - 2s^2} \quad (5)$$

$$\frac{8 - s^2 - 8s}{4 - s^2} + \frac{s^2 - 2 - 18}{s^3 - 2s^2} + \frac{6 + 7s}{s^2 + 3s} \quad (6)$$

$$\frac{s + 1}{s^3 - 1} + 1 \quad (7)$$

$$\frac{s + 1}{s^3 - 1}$$

العادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى

15. هل المعادلتان التاليتان ، في ح . متكافئتان ؟

$$س^2 + \frac{3}{س} = س^2$$

$$\frac{3}{س - 1} = س^2 - س$$

16. نفس الترين من أجل :

$$س^3 - 3س^2 + 2س = س(س - 1)$$

$$س^2 - 3س + 2 = س$$

17. نفس الترين من أجل :

$$س^3 + \frac{س}{5} = س^2$$

$$(1 - س^2)5 = س^3$$

18. نفس الترين من أجل :

$$س^2 - 3س = س$$

$$\frac{1}{س^2 - 3س} + \frac{1}{س} = \frac{1}{س}$$

19. نفس الترين من أجل :

$$\sqrt[3]{س - 1} = 1 + س$$

$$س^2 - 1 = 1 + س^3$$

20. هل المتراجحتان التاليتان في ح متكافئتان ؟

$$س^2 - 2س > 2س^3 + 4س$$

$$2س^2 + س > س^3 - 2س$$

21. نفس الترين من أجل :

$$س^2 - 2س \geq 2س^3 + 4س$$

$$2 + س^2 \geq 1 - س^2$$

22. نفس الترين من أجل :

$$س^3 + 4 \leq \sqrt{4 - س} ; (3س + 1)^2 \leq 4$$

23. حل ، في ح ، المعادلات التالية ذات المجهول س .

$$\frac{س(2 - 3)}{4} = \frac{(1 - س)3}{2} + \frac{(3 - س)5}{7} \quad (1)$$

$$\frac{19 + 27}{20} = \frac{1 + س3}{2} + \frac{1 - س2}{5} - \frac{1 + س}{4} \quad (2)$$

$$\frac{(1 + س3)}{5} - \frac{(3 - س2)}{3} = \frac{1 - س3}{5} - \frac{س2}{3} \quad (3)$$

$$36 = \left(\frac{2 - س}{7} - س \right) - \frac{7 + س9}{2} \quad (4)$$

$$س(2 - س) = 2\sqrt{2} - (1 + 2\sqrt{2}) \quad (5)$$

$$2,3 + (3 - س0,5)1,4 = (1 + س3,8)0,2 \quad (6)$$

24. حل ، في ح ، المعادلات التالية ذات المجهول س .

$$0 = 9 + (س - 2)3 + س2 \quad (1)$$

$$1 - س^2 = 5 + (3 + س)2 \quad (2)$$

$$5س^2 = س3 \quad (3)$$

$$4 - س^2 = (س - 2)3 \quad (4)$$

$$0 = (1 - س^2)(1 - س) + (س^2 - 1)2 \quad (5)$$

$$0 = س^4 + س^2 - 2 \quad (6)$$

25. حل ، في ح ، المعادلات التالية ذات المجهول س :

$$\frac{3 + س4}{5 + س2} = \frac{1 + س2}{3 + س} \quad (1)$$

$$1 - \frac{1}{1 + س} = س2 - \frac{س^2}{1 + س} \quad (2)$$

$$\frac{3}{1+s} = \frac{1}{s^2 - 1} + \frac{2}{s - 1} \quad (3)$$

$$\frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} + \frac{1+s}{s(s+2)} \quad (4)$$

26. حل . في ح ، المتراجحات التالية ذات المجهول س .

$$(1) s+2 \leq 4s-5 \quad (2) 4s-2 > 5(s+3)$$

$$(3) s-4 \geq 12s-3+7s \quad (4) s-3 < 2(s+1)$$

$$(5) 5s < 3(s-1) \quad (6) 2s+3 \leq 4s-9$$

$$3 + \frac{s}{2} < \frac{s}{10} - \frac{4}{5} \quad (7)$$

$$2 - \frac{1+2s}{3} > 1 - \frac{2+s}{2} \quad (8)$$

27. حل ، في ح ، المتراجحات التالية ذات المجهول س .

$$(1) (s-2)(s+3) \leq 0 \quad (2) s^2 - 5s \leq 0$$

$$(3) s^2 - 4 < 0 \quad (4) s(s-9) < 0$$

$$3 > \frac{2+s}{s} \quad (6) 0 < \frac{3-s}{s+1} \quad (5)$$

$$2 < \frac{1-s}{3+s} \quad (8) 0 \geq \frac{2+s}{3-2s} \quad (7)$$

$$5 + \frac{3}{s} + \frac{4}{s} > s \quad (10) \quad 4 \leq \left| s - 2 + \frac{5}{s} \right| \quad (9)$$

28. حل . في ح ، جمل المتراجحات التالية ذات المجهول س .

$$\left. \begin{array}{l} 2 > 3 + s \\ s > 4 - s \end{array} \right\} \quad (2) \quad \left. \begin{array}{l} 2s < 3 + s \\ s < 5 - 4 \end{array} \right\} \quad (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} 3 < 1 + \frac{s}{t} \\ 5 > \frac{s}{t} \end{array} \right\} \quad (4) \qquad \left. \begin{array}{l} 0 \leq s - 3 \\ 5 - 2s > 3 \end{array} \right\} \quad (3)$$

29. حل ، في ح ، المعادلات التالية ذات المجهول س

والوسيط الحقيقي ط

$$1 + \frac{s}{t} = \text{ط} \quad (1)$$

$$\sqrt{2} \cdot \frac{s}{t} = 1 - s \quad (2)$$

$$2 \cdot \frac{s}{t} + 3 = 6 - \frac{s}{t} \quad (3)$$

$$4 - \frac{s^2}{t^2} = (t - 2)s \quad (4)$$

$$s - \frac{s^2}{t^2} - \frac{s}{t} = 0 \quad (5)$$

$$\frac{s}{t} + \frac{s}{s-t} = \frac{1}{t} \quad (6)$$

$$1 = \frac{2}{s-t} - \frac{1}{t} \quad (7)$$

$$\frac{\frac{s}{t} + \frac{s}{s-t}}{s-t} = \frac{\frac{s}{t}}{1 - \frac{s^2}{t^2}} \quad (8)$$

$$\frac{\frac{s^2}{t^2}}{s-t + \frac{s^2}{t^2} - \frac{s^2}{t^2}} = \frac{s}{s-t} + \frac{s}{s+t} \quad (9)$$

30. حل ، في ح ، المتراجحات التالية ذات المجهول س

والوسيط الحقيقي ط

$$1 \geq \frac{1 - \frac{s}{t}^3}{3} - \frac{1 + \frac{s}{t}}{t} \quad (5) \qquad \left. \begin{array}{l} 2 < s + t \\ 3 > 2 + s^2 \end{array} \right\} \quad (1)$$

$$2 + \frac{s^2}{t^2} < s + t \quad (2)$$

$$\frac{1 + \frac{s}{t}}{\frac{t}{s} + 1} \geq \frac{\frac{s^2}{t^2}}{(1 + \frac{s}{t})^2} \quad (6) \qquad \left. \begin{array}{l} 2 \cdot \frac{s}{t} + 3 > s + 6 \\ 2 \cdot s + 3 \leq t \cdot s + 6 \end{array} \right\} \quad (3)$$

$$2 \cdot s + 3 \leq t \cdot s + 6 \quad (4)$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1 + \frac{s}{t}}{\frac{t}{s} + 2} \geq \frac{3 - \frac{s^2}{t^2}}{\frac{s}{t}} \quad (7)$$

المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية :

31. حل ، في ح . كلا من المعادلات التالية ذات المجهول س :

$$0 = 2 - 8s^2 \quad (1) \quad 7 = 9s^2$$

$$70 + 4s^2 - 5 = s^2 \quad (2) \quad s^2 = \frac{9}{25}$$

$$16 = (s - 3)(s + 3) \quad (3) \quad 4 = (s + 2\sqrt{s})^2 \quad (3)$$

$$0 = 5s^2 - 3s \quad (4) \quad 16 = (3s - 4)^2 \quad (4)$$

$$2s^2 - 4 = s^2 \quad (5) \quad 7 = (2s + 1)^2 \quad (5)$$

$$3 = (s - 2\sqrt{s})^2 \quad (6) \quad 3 = (s - 2\sqrt{s})^2 \quad (6)$$

$$0 = 6 + (2s + 3)^2 \quad (7) \quad 0 = 6 + (2s + 3)^2 \quad (7)$$

$$9 - 3s = (s - 3)(s + 3) \quad (8) \quad 9 - 3s = (s - 3)(s + 3) \quad (8)$$

32. اكتب كلاً من كثيرات الحدود التالية على شكلها التموجي . ثم عين مجموعة جذور كل من هذه كثيرات الحدود

$$1 + 6s^2 - 9s^4 \quad (1) \quad 24 - 6s^2 + s^4 \quad (1)$$

$$5 - 9s^2 + s^4 \quad (2) \quad 4 + s^2 - 12s^4 \quad (3)$$

$$10 - 5s^2 + \sqrt{10 + s^2} \quad (4) \quad 4 - s^2 + 3s^4 \quad (5)$$

$$20 - 3s^2 + 2s^4 \quad (6) \quad 5 + s^2 - 3s^4 \quad (7)$$

33. حل ، في ح . باستعمال القوانين . كلا من المعادلات التالية ذات المجهول س .

$$0 = \frac{5}{2} + \frac{s^2}{3} - \frac{s^5}{2} \quad (1)$$

$$0 = \left(3 + \frac{s}{2} - \frac{s^3}{2} \right) + 9 + \frac{s^5}{5} \quad (2)$$

$$1 - 4s^2 + s^4 = 4 - s^2 \quad (3)$$

$$21 = s^4 + 4s^2 \quad (4)$$

$$0 = 5 + s^2 \quad (5)$$

$$9 - 12s^2 = 4s^4 \quad (6)$$

$$0 = 34 - 5 - 7 \sqrt{s} \quad (7)$$

$$4 = \sqrt{2s} + s^2 \quad (8)$$

$$0 = 1 + \sqrt{2s} + s^2 \quad (9)$$

$$0 = 5 + \sqrt{4s} - 4 - s^2 \quad (10)$$

$$\sqrt{2s} - 6 = \sqrt{2s} + 1 \quad (11)$$

$$0 = 1 + \sqrt{2s} + 1 + s^2 \quad (12)$$

34. حل ، في ع ، المعادلات التالية ذات المجهول s

$$0 = 14 + (3s + 2) (5 - 3s) \quad (1)$$

$$0 = s^2(1 - 3s) + s^2(3 + 2s) \quad (2)$$

$$0 = \left(s^2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + s^2(2s - 1) \quad (3)$$

$$2 - s^3 = 8 - s^2 \quad (4)$$

$$(s - 1)(s^2 + 2s + 3) = s^3 - s \quad (5)$$

$$22 + 33s = (s + 4)(s + 5)(s - 2) \quad (6)$$

35. عُين مجموعة تعريف كل كسر من الكسور الناطقة التالية . ثم اخترل كل منها :

$$\frac{s^3 - 3s}{6 + 5s - s^2} \quad (2)$$

$$\frac{6s^2 + 5s - 6}{9 - s^2} \quad (1)$$

$$\frac{5 - s^2}{25 + 20s - 4s^2} \quad (4)$$

$$\frac{2s - s^2}{2s^2 + 5s} \quad (3)$$

$$\frac{8 - s^3}{2 - 5s - s^2} \quad (6)$$

$$\frac{6s^2 + 4s - 6}{2s^2 + 4s} \quad (5)$$

$$\frac{2 - 2\sqrt{s}}{s^2 + 2s} \quad (8)$$

$$\frac{1 - s^2}{1 + 2\sqrt{s}} \quad (7)$$

36. حل ، في ع ، المعادلات التالية ذات المجهول s

$$(s^2 - 5s + 1)(s + 2)(3s + 1) = (s^2 + 1)(s + 2) \quad (1)$$

$$0 = 2 - s^4 - s^3 \quad (2)$$

$$3) (3 - s^2)(2 + s^3) = (3 - s^2)(1 - s^3)$$

$$4) (s^3(1 - s^3) + s^3(2 + s^3)) = (s^3(1 + s^3) + s^3(2 - s^3))$$

$$5) (s^2 - s^2)(4 + s^2) = (s^2 - s^2)(9 - s^2)$$

$$6) s^3 - s^3 = (s^3 + 1)(1 - s^3)$$

$$7) s^3 - s^3 = s^2 - s^2$$

37. حل : في ح ، المعادلات التالية ذات المجهول s .

$$0 = \frac{15 - s^2 - 2}{s^2 + 5} \quad (2) \quad 0 = \frac{s^2 - 5 + 2}{s^2 - 2} \quad (1)$$

$$0 = \frac{4 + s^2 - s^2 - s^3 - 2}{s^3 - s^2 + s^2 - 1} \quad (4) \quad 0 = \frac{2 - 2\sqrt{s^2 - 2}}{2\sqrt{s^2 - 2} - (1 - 2\sqrt{s^2 - 2})} \quad (3)$$

$$8 = \frac{1}{s^2 - 2} + \frac{1}{1 - s^2} \quad (6) \quad \frac{1 - s^3}{s^3 - s^2} = \frac{2 - s^2}{s^2 - 1} \quad (5)$$

$$\frac{1}{8} = \frac{1}{(1 + s^4)(s^4 - 1)} - \frac{3}{(s^2 - 1)^2} \quad (7)$$

$$\frac{1}{s^2 - s^2} = \frac{1}{2 + s^2} + \frac{3}{2 - s^2} \quad (8)$$

$$\frac{12}{8 - s^3} = \frac{8 + s^7}{4 + s^2 + s^2} + \frac{1}{s^2 - 2} \quad (9)$$

$$1 = \frac{1 - s^4}{s^2 - 2} - \frac{2}{\left(\frac{1 - s^2}{s^2 - 2} \right)} \quad (10)$$

38. حل ، في ح ، المعادلات التالية ذات المجهول س

$$0 = |s^2 + s - 3| \quad (2) \quad 0 = 1 - s^2 \quad (1)$$

$$0 = |25 - s^2| \quad (4) \quad 0 = |1 - s^2| + |s - 5| \quad (3)$$

$$0 = |25 - s^2| - |s^2 - 5| \quad (5)$$

39. حل ، في ح ، المعادلات التالية ذات المجهول س .

$$2 + s = \sqrt{1 - s^2} \quad (2) \quad 3 - s = \sqrt{1 + s^2} \quad (1)$$

$$s = \sqrt{4 + s^2 - 4s^2} \quad (4) \quad 1 - \frac{s}{2} = \sqrt{4 - s^2} \quad (3)$$

$$|s| = \sqrt{4 + s^2 - 4s^2} \quad (5)$$

40. ادرس إشارة كل من كثيارات الحدود التالية :

$$2 - s^2 + 7s \quad (1) \quad 6 - 3s^2 \quad (2)$$

$$4 - s^2 + 6s \quad (3) \quad (s - 2)(s + 5) \quad (4)$$

$$1 - s^2 + 2s \quad (5) \quad 4 - s^2 + 3s \quad (6)$$

$$8 - s^2 + 3s \quad (7) \quad 15 + s^2 - 2s \quad (8)$$

$$9 - s^2 + 2s \quad (9)$$

41. ادرس إشارة كل من الجداءات التالية :

$$(1) s(s^2 + s - 2)$$

$$(2) (2 - s)(s^2 + 5s - 6)$$

$$(3) (2 - 3s)(s^2 - s - 2)(s^2 - s + 1)$$

$$(4) (s - 5)(s^2 - 2s + 1)(2s - s^2)$$

42. ادرس إشارة كل من الكسور الناطقة التالية :

$$\frac{3 - s^2 + 2s}{s^2 - s - 2} \quad (2) \quad \frac{1 - s}{3 - 2s - s^2} \quad (1)$$

$$\frac{s^2 - 2s + s}{1 + s} \quad (3)$$

43. حل ، في ح ، المتراجحات التالية ذات المجهول س

$$1) -s^2 + s < 0 \quad 2) s^2 < 0$$

$$3) s^2 - 6s \leq 1 \quad 4) s^2 - 6s \leq 1$$

$$5) s^2 - 2s > 7 \quad 6) (s-2)^2 < (s-3)^2$$

$$7) (s+1)^2 > (1-s)^2 \quad 8) 5s^2 \geq 4s - 2$$

$$9) (s-2)^2 > (s-6)^2 \quad 10) 3(s-1) < \frac{(1-s)^2}{2}$$

$$11) \frac{2}{5} \geq \frac{1}{s^2} \quad 5s^2 \geq 2$$

44. حل ، في ح ، المتراجحات التالية ذات المجهول س .

$$1) (s-1)(s^2+2) < 0 \quad 2) (s^2-2s+1) \geq 0$$

$$3) (s^2-6s+1) \geq 0 \quad 4) (s^2-5s+4) < 0$$

$$5) (s^2-5s+6) > 3s+2 \quad 6) (s^2-5s+6) < 0$$

45. حل ، في ح ، المتراجحات التالية ذات المجهول س .

$$1) \frac{s^2+1}{s-3} \geq 0 \quad 2) \frac{s}{s+4} < 0$$

$$3) \frac{3}{2s-2} < s \quad 4) \frac{3s^2+2}{s-1} < 4$$

$$5) \frac{1}{2+s^2} > \frac{1}{s-1} \quad 6) \frac{s^2-2s}{1+s} > 0$$

$$7) \frac{s^2-5s+4}{49-s^2} < 0 \quad 8) \frac{1-s}{1+s} \geq \frac{s}{s-1}$$

$$9) \frac{5}{3+s^2} < \frac{5}{s-3} \quad 10) \frac{3-s^2}{4-s^2} < 1$$

46. حل ، في ح ، كلا من الجمل التالية :

$$1) 4 > s^2 + 3s + 5 \quad 2) 2 > \frac{1}{s-1} > 4 -$$

$$3) \frac{s}{s-1} > 3 > \frac{2+s}{s}$$

$$4) s \geq 2 -$$

$$5) 0 > 4 + s \quad 6) 0 \geq \frac{s-1}{s} - \frac{3+s}{s-1}$$

$$0 < 9 + s^2 - 7s \quad 7) \frac{s^2-3}{s^2-15} < 0$$

47. حل ، في ح ، المتراجمات التالية ذات المجهول س

$$1) |s-5| < 3-1 \quad 2) |s-5| > 3+1$$

$$3) |s+3| < |3-s| \quad 4) |s-1| < |s-1|$$

$$5) |s-1| > \frac{1}{s+2}$$

48. حل ، في ح ، المتراجمات التالية ذات المجهول س

$$1) \sqrt[2]{s+2} > \sqrt[2]{s-4} \quad 2) \sqrt[2]{s+1} \geq \sqrt[2]{s+4}$$

$$3) \sqrt[2]{s-4} \geq \sqrt[2]{s+1}$$

49. ط عدد حقيقي و تأط (س) كثير حدود حيث :

$$\text{تأط}(s) = (\text{ط}^2 - 4) s^2 - (\text{ط} + 2) s + 1 - \text{ط}^2$$

1) عين قيم ط بحيث يكون تأط (س) كثير حدود من الدرجة الثانية .

2) عين قيم ط بحيث يكون :

3) تأط (س) كثير حدود من الدرجة الأولى

$$4) \text{تأط}(1) = 0$$

$$5) \text{تأط}(0) = 0$$

$$6) \text{تأط}(2) = 0$$

حل المعادلة تأ (س) = 0 في كل من الحالات الثلاث ١) م) ٢)

50. ط عدد حقيقي و تاط (س) كثير حدود حيث :

$$\text{تاط (س)} = (\text{ط} - 1) \text{س}^2 + 2(\text{ط} + 3) \text{س} + \text{ط}$$

1) عين مجموعة قيم العدد الحقيقي ط بحيث يكون :

$$\text{تاط (س)} \text{ موجبا من أجل س} = 2 \text{ و سالبا من أجل س} = -5$$

2) عين مجموعة قيم العدد الحقيقي س بحيث يكون

$$\text{تاط}_1 (\text{س}) \text{ موجبا و تاط}_2 (\text{س}) \text{ سالبا}$$

51. حل ، في ح ، المعادلات التالية ذات المجهول س

والوسيط الحقيقي ط .

$$(1) 3 \text{س}^2 - 27 = (\text{س} - 3)(\text{طس} + 1)$$

$$(2) \text{س}^2 - 1 = \text{ط}(\text{س}^2 + 1)$$

$$(3) \text{س}^2 - 2 = 1 - \text{ط}(\text{س}^2 + 1)$$

$$(4) (\text{س} - 1)^2 = \text{ط}(\text{س}^2 - 1)$$

$$(5) \text{س}^2 - 4\text{س} + 4 - 2\text{ط}(\text{س} - 2) + \text{ط}^2 = 0$$

52. حل ، في ح ، المتراجحات التالية ذات المجهول س .

والوسيط الحقيقي ط

$$(1) \text{طس}^2 + 2\text{س} - \text{ط} < 0$$

$$(2) \text{طس}^2 - 2\text{س} + 1 > 0$$

$$(3) 2\text{س}^2 + \text{طس} - \text{ط} > 0$$

$$(4) (\text{طس} - 1)(\text{س} - 2) < 0$$

53. عين مجموعة قيم العدد الحقيقي ط بحيث يكون :

$$0 > \text{س} \in \mathbb{R} : (5 - \text{ط}) \text{س}^2 - 2(1 - \text{ط}) \text{س} + 2(1 - \text{ط}) > 0 . \quad (1)$$

$$0 < \text{س} \in \mathbb{R} : (2\text{ط} + 5) \text{س}^2 + 4(\text{ط} + 3) \text{س} + 3\text{ط} < 0 \quad (2)$$

54. عين مجموعة قيم العدد الحقيقي ط حتى لا يكون للمتراجحة :

$$(\text{ط} - 5) \text{س}^2 - (3\text{ط} + 4) \text{س} + \text{ط} + 5 < 0 \text{ حل}$$

55. ط عدد حقيقي و تأط (س) كثير حدود حيث :

$$\text{تأط}(س) = (\text{ط} + 2)س^2 - 2(\text{ط} - 1)س + \text{ط} - 2$$

عَيْن مجموعه قيم الوسيط ط بحيث تكون إشارة تأط (س) ثابتة منها كان العدد س .

ما هي عندئذ إشارة تأط (س) ؟

56. نفس الأسئلة بالنسبة إلى كثير الحدود :

$$\text{تأط}(س) = (\text{ط} + 2)س^2 + \text{ط}(س) + \text{ط} - 1$$

57. تتحقق أن لكل معادلة من المعادلات التالية حالا هو أحد الأعداد : - 1 ، 2 + ، 2 - ، 1 +

ثم احسب حلها الثاني :

$$0 = 6 - س^2 + س + 2 \quad (1) س^2 + 7 س - 8 = 0$$

$$0 = 10 - س^2 - س - 4 \quad (2) 2 س^2 + 3 س - 5 = 0$$

$$0 = 4 - س^2 + 3 س - 6 \quad (3) 4 س^2 + س - 3 = 0$$

$$0 = 4 + س^2 - 3 س + 8 \quad (4) س^2 + 4 س - 3 = 0$$

$$0 = 4 + س^2 + 3 س - 8 \quad (5) 4 س^2 - س + 4 = 0$$

$$0 = 4 + س^2 - 3 س + 8 \quad (6) س^2 + 4 س - 3 = 0$$

$$0 = 4 + س^2 + 3 س - 8 \quad (7) س^2 - 4 س + 3 = 0$$

58. لتكن المعادلة من الدرجة الثانية

$$س^2 - 7 س - 4 = 0 \quad \text{و } س' ، س'' \text{ حلاتها}$$

• أحسب ما يلي :

$$(1) س' + س'' \quad (2) س' . س'' \quad (3) س'^2 + س''^2$$

$$(4) \frac{1}{س'} + \frac{1}{س''} \quad (5) \frac{س'}{س''} + \frac{س''}{س'} \quad \frac{1}{س'} \cdot \frac{1}{س''}$$

• عَيْن معادلة من الدرجة الثانية تقبل حلين هما : $\frac{1}{س'} ، \frac{1}{س''}$

59. ادرس ، حسب قيم العدد الحقيقي ط ، إشارة حلول كل من المعادلات التالية

$$(1) س^2 - (\text{ط} + 3)س + \text{ط} - 0 = 4$$

$$(2) (\text{ط} - 3)س^2 - 2\text{ط}س + \text{ط} + 2 = 0$$

$$(3) \text{ط}^2س^2 + 5س - \text{ط}^2 = 0$$

$$0 = (t - 1 - s^2) + 2s - (t + 3)s \quad (4)$$

$$0 = (1 + s^2) - 2s - (t + 5) \quad (5)$$

$$0 = 5 + t^2 + ts - 2s^2 \quad (6)$$

$$0 = 5 + (t^2 - s^2) + (t + 1)s \quad (7)$$

$$0 = 2s^2 + 2ts - 7t - 3s \quad (8)$$

جمل معادلات . جمل متراجمات :

60. عِين مجموعه حلول كل معادلة من المعادلات التالية ذات المجهولين الحقيقيين

$$s, u.$$

$$0 = 1 - u^2 + 3s \quad (1)$$

$$0 = s^3 + 3s - u^2 \quad (2)$$

واذكر ثلاثة حلول لكل منها

61. حل ، في $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ الجمل التالية :

$$\left. \begin{array}{l} 5 = s - u^3 \\ 1 = u^2 + 6s \end{array} \right\} (2)$$

$$\left. \begin{array}{l} 5 = s + u \\ 7 = u - s \end{array} \right\} (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 = u^3 + \frac{s}{2} \\ 4 = u^2 - s^2 - 12 \end{array} \right\} (4)$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 = u^3 - s \\ 5 = u^2 - s^2 - 6 \end{array} \right\} (3)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 = 3 - u^2 + 2s \\ 0 = 1 + u^3 - s^3 \end{array} \right\} (6)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 = 4 + u^2 - s^2 \\ 0 = 2 - u^3 + s^3 \end{array} \right\} (5)$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 = u^3 + \frac{s^2 - 1}{4} \\ 0 = \frac{1}{3} - s - \frac{u^4 + s^4}{2} \end{array} \right\} (7)$$

$$0 = 1 - \frac{3 + \underline{x}}{4} - \frac{1 + \underline{s}}{2} \quad \left. \right\} \quad (8)$$

$$0 = 1 - \frac{1 - \underline{x}}{4} - \frac{1 - \underline{s}}{2} \quad \left. \right\}$$

$$\begin{aligned} 5 &= {}^2\underline{x} + \underline{s} \\ 5 &= {}^2\underline{x} - \underline{s} \end{aligned} \quad \left. \right\} \quad (9)$$

$$0 = \overline{3}\sqrt{v + 1} + \underline{x}(\overline{3}\sqrt{v - 1} + \underline{s}) \quad \left. \right\} \quad (10)$$

$$0 = \overline{3}\sqrt{v} 2 + 4 + \underline{x} 2 - \underline{s} \overline{3}\sqrt{v + 1} \quad \left. \right\} \quad (10)$$

62.) حل ، في ع \times ع ، الجملة التالية :

$$\begin{aligned} 0 &= 70 - \underline{s} 5 + \underline{x} 2 \\ 0 &= 55 - \underline{s} 5 - \underline{x} 3 \end{aligned} \quad \left. \right\} \quad (1)$$

ب) استعمل نتيجة السؤال السابق حل الجملة التالية :

$$\begin{aligned} 70 &= {}^2\underline{x} 2 + {}^2\underline{s} 5 \\ 55 &= {}^2\underline{x} 3 - {}^2\underline{s} 5 \end{aligned} \quad \left. \right\} \quad (2)$$

63. نفس المترin بالنسبة إلى الجملتين :

$$0 = 8 - \underline{x} + \underline{s} \quad \left. \right\} \quad (1)$$

$$0 = 32 - \underline{x} 3 + \underline{s} 5 \quad \left. \right\} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} 8 &= {}^2(2 - \underline{x}) + {}^2(3 - \underline{s}) \\ 32 &= {}^2(2 - \underline{x}) 5 + {}^2(3 - \underline{s}) 3 \end{aligned} \quad \left. \right\}$$

64. نفس المتررين بالنسبة إلى الجملتين

$$\left. \begin{aligned} 4 &= ع^{12} + س^{15} \\ \frac{1}{6} &= ع^4 - س^4 \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} 0 &= 4 - \frac{12}{ع} + \frac{15}{س} \\ 0 &= \frac{1}{6} - \frac{4}{ع} - \frac{4}{س} \end{aligned} \right\}$$

65. حل ، في $ع \times ع$ ، الجمل التالية :

$$\left. \begin{aligned} 15 &= ع + س \\ 7 &= ع - س \end{aligned} \right\} (1)$$

$$\left. \begin{aligned} 0 &= 5 - \frac{1}{1-ع} + \frac{4}{2-س} \\ 0 &= 2 - \frac{1}{1-ع} + \frac{4}{2-س} \end{aligned} \right\} (2)$$

$$\left. \begin{aligned} 0 &= 5 + ع^2 - \frac{4}{س} \end{aligned} \right\} (3)$$

$$\left. \begin{aligned} 0 &= 5 - ع^2 + \frac{1}{س} \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} 7 &= |ع| + |س| \end{aligned} \right\} (4)$$

$$11 = |ع|^2 + |س|^2$$

١

66. حل ، في $\text{ج} \times \text{ج} \times \text{ج}$ ، الجمل التالية :

$$\left. \begin{array}{l} 15 = س + ع \\ 14 = س \cdot ع \end{array} \right\} (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 = س + ع \\ 4 = س \cdot ع \end{array} \right\} (2)$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{6}{5} = \frac{س}{ع} \\ 3 = ع - 4 \end{array} \right\} (3)$$

$$\left. \begin{array}{l} 5 = س^2 + ع^2 \\ 1 = س \cdot ع \end{array} \right\} (4)$$

$$\left. \begin{array}{l} 3 = \frac{1}{س^2} + \frac{1}{ع^2} \\ 1 = س \cdot ع \end{array} \right\} (5)$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{40}{9} = س^2 + ع^2 \\ \frac{8}{3} = س + ع \end{array} \right\} (6)$$

67. حل ، في $\text{ج} \times \text{ج} \times \text{ج}$ ، الجمل التالية حيث $س$ و $ع$ هما المجهولان و ط و سطح حقيقي .

$$\left. \begin{array}{l} ع = ط س - 1 \\ س = ع - 2 \end{array} \right\} (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} 12 = \epsilon + s \\ s \cdot \epsilon = 2 \end{array} \right\} (2)$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 - \epsilon = \epsilon + s \\ 4 = \epsilon - s \end{array} \right\} (3)$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 - \epsilon = \epsilon + s \\ 4 = s \cdot \epsilon \end{array} \right\} (4)$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 - \epsilon = \epsilon + s \\ 4 = \epsilon + s \end{array} \right\} (5)$$

$$\left. \begin{array}{l} 4 = \frac{s}{\epsilon} \\ 1 - \epsilon = \epsilon + s \end{array} \right\} (6)$$

$$\left. \begin{array}{l} 4 = {}^2\epsilon + {}^2s \\ 1 = \epsilon(1 - \epsilon) + s \end{array} \right\} (7)$$

$$\left. \begin{array}{l} 3 = \epsilon + {}^2s \\ \epsilon = \epsilon^3 + {}^2s \end{array} \right\} (8)$$

$$\left. \begin{array}{l} 4 = \epsilon^2 + s^2 \\ 5 = \epsilon^2 + (1 - \epsilon)s \end{array} \right\} (9)$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 = \epsilon(1 - \epsilon) + s^2 \\ 1 = \epsilon^2 + (1 - \epsilon)s \end{array} \right\} (10)$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 = \epsilon \cdot \epsilon + (1 - \epsilon)\epsilon \end{array} \right\} (10)$$

$$3 = \frac{2}{\mu} - s(4 - \frac{4}{\mu}) \quad \left. \right\} (11)$$

$$2 - \frac{4}{\mu} = \frac{3}{\mu} - (\frac{4}{\mu} - s) \quad \left. \right\}$$

$$1 - \frac{3}{\mu} = \frac{1 - \frac{2}{\mu}}{\mu} + s(1 - \frac{4}{\mu}) \quad \left. \right\} (12)$$

$$5 = \frac{3}{\mu} + s^2 \quad \left. \right\}$$

$$1 - \frac{4}{\mu} = \frac{2}{\mu} + s(1 - \frac{3}{\mu}) \quad \left. \right\} (13)$$

$$1 + \frac{3}{\mu} = \frac{4 - \frac{2}{\mu}}{\mu} + s(1 - \frac{2}{\mu}) \quad \left. \right\}$$

$$0 = \frac{4}{\mu} + s^2 \quad \left. \right\} (14)$$

$$0 = \frac{2}{\mu} + s^2 \quad \left. \right\}$$

$$0 = \frac{1}{\mu} + s(1 + \frac{3}{\mu}) \quad \left. \right\} (15)$$

$$0 = \frac{5}{\mu} + s^2 \quad \left. \right\}$$

$$0 = \frac{2}{\mu} + s(1 - \frac{4}{\mu}) \quad \left. \right\} (16)$$

$$0 = \frac{6}{\mu} + s(1 - \frac{4}{\mu}) \quad \left. \right\}$$

68. حل ، في مع \times الجملتين

$$1 = \frac{\frac{4}{\mu}}{s} + \frac{\frac{4}{\mu}}{\mu} \quad \left. \right\} (1)$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{\mu} + \frac{\frac{4}{\mu}}{\mu} \quad \left. \right\}$$

$$0 = \frac{\frac{4}{\mu}}{2 - \frac{4}{\mu}} + \frac{1}{1 + s} \quad \left. \right\} (2)$$

$$5 = - \frac{4}{2 - \frac{4}{\mu}} + \frac{\frac{4}{\mu}}{1 + s} \quad \left. \right\}$$

69. حل بيانيا المتراجحات التالية :

$$0 > 1 - 3 + ع \quad (2) \quad 0 \leq 1 + 5 - ع \quad (1)$$

$$3 + ع - \frac{1}{3} > \frac{2}{3} - \frac{7}{6} + ع \quad 2,5 - \quad (3)$$

70. حل بيانيا جمل المتراجحات التالية :

$$\left. \begin{array}{l} 0 \leq 3 + ع \\ 5 - س \end{array} \right\} \quad (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 < 1 - ع \\ 3 + 2 س \end{array} \right\} \quad (2)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 < 2 + ع \\ 6 + 5 س \end{array} \right\} \quad (2)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 < ع + س \\ - س \end{array} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 > 5 + ع \\ 3 س \end{array} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 < 1 - ع \\ 3 + 2 س \end{array} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 > 5 + ع \\ 3 س \end{array} \right\} \quad (4)$$

$$3,5 > ع > 1 \quad (4)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 \leq 2 - س \\ س \end{array} \right\} \quad (5)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 < 5 + ع \\ 3 س \end{array} \right\} \quad (5)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 > 1 + ع \\ 6 - 4 س \end{array} \right\} \quad (5)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 > 3 + ع \\ - س \end{array} \right\} \quad (6)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 \geq 5 - ع \\ - س 2 \end{array} \right\} \quad (6)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 < 3 - ع \\ 4 س \end{array} \right\} \quad (6)$$

$$0 \geq 60 - 4s + 15u \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} (7)$$

$$8 \geq 2s + u \geq 5$$

$$5 \geq s - u \geq 3 - \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} (8)$$

$$12 \geq |s| + |u| \geq 4$$

71. حل بيانياً المترابعات التالية :

$$(s - 2)(u + 3) < 0 \quad (1)$$

$$0 \geq (s - 3 - u)(s + u - 4) \quad (2)$$

$$s^2 - 9 \leq u^2 \quad (3)$$

$$3 \geq |s| + |u| \quad (4)$$

تمارين متنوعة

72. نعتبر المعادلة التالية ذات المجهول الحقيقي s والوسيط الحقيقي t :

$$(t+3)^2 + 3(t+1)s + t = 0$$

عُيّن t حتى تقبل هذه المعادلة حلًا مضاعفاً .

أحسب هذا الحل المضاعف .

73. نعتبر المعادلة التالية ذات المجهول الحقيقي s والوسيط الحقيقي t :

$$2s^2 - (t+4)s + t = 0$$

عُيّن t حتى يكون (3) حلًّا لهذه المعادلة .

أحسب الحل الآخر .

74. نعتبر المعادلة التالية ذات المجهول الحقيقي s والوسيط الحقيقي t :

$$t^2s - 2(t-2)s + t - 3 = 0 \quad (1)$$

أ) عُيّن مجموعة قيم t حتى تقبل المعادلة (1) حلولاً .

ب) عُيّن t حتى تقبل المعادلة (1) حلين s' ، s''

يتحققان المساواة : $4(s' + s'') = 7s' \cdot s''$

75. نعتبر المعادلة التالية ذات المجهول الحقيقي s والوسيط الحقيقي t :

$$ts^2 + (t-4)s + 2t = 0$$

عُيّن t حتى تقبل هذه المعادلة حلين s' ، s''

بحيث يكون : $2(s'^2 + s''^2) = 5s' \cdot s''$

76. نعتبر المعادلة التالية ذات المجهول الحقيقي s والوسيط الحقيقي t :

$$s^2 - (2t+1)s + \frac{1}{4}(3t-1)(2t-1) = 0$$

أ) أدرس ، حسب قيم الوسيط t ، وجود إشارة الحللين s' ، s'' لهذه

المعادلة

ب) أحسب t و s'' إذا كان $s' = \frac{11}{2}$

$$\frac{2}{3} = \frac{1}{3-s} + \frac{1}{3-s-2}$$

3) عين ط حتى يكون : $s' - 2$
 أحسب ، عندئذ ، s' و s'' .

77. ليكن العدد الحقيقي ط والتطبيق تأط للمجموعة ح في نفسها المعرف كما يلي :

$$Taاط(s) = (2 - ط) s^2 + (ط - 3) s + 2 ط - 5$$

1) عين المجموعة مع المعرفة كما يلي :
 $\{s \in \mathbb{R} : Taاط(s) \leq 0\}$

2) عين ط حتى يكون العدد $(+1)$ حلل للمعادلة $Taاط(s) = 0$.
 حل ، عندئذ ، هذه المعادلة

3) بيّن أن (-1) حل للمعادلة $Taاط(s) = 0$ مهما كان العدد الحقيقي ط .
 استنتج أنه ، مهما كان العدد الحقيقي ط مختلف عن 2 ، يمكن وضع $Taاط(s)$ على شكل جداء كثيري حدود من الدرجة الأولى .

4) ناقش ، حسب قيم ط ، عدد حلول المعادلة $Taاط(s) = 0$
 أحسب هذه الحلول بدلاله ط .

5) هل يمكن تعين ط حتى تقبل المعادلة $Taاط(s) = 0$
 حللين لها نفس الإشارة ؟

6) ليكن الدالة هاط للمجموعة ح في نفسها المعرفة كما يلي :

$$هاط(s) = \frac{-s^2 + s + 2}{Taاط(s)}$$

1) عين ، حسب قيم ط ، مجموعة التعريف فـ للدالة هاط
 2) اخترل هاط(s) . ثم حل المعادلة هاط(s) = -1

78. ليكن كثير الحدود $Taاط(s)$ حيث :

$$Taاط(s) = (ط^2 - 3 ط + 2) s^2 + (ط - 2) s + 3$$

عين مجموعة قيم العدد الحقيقي ط حتى :

- 1) تقبل المعادلة $Taاط(s) = 0$ حللاً وحيداً
 2) تقبل المعادلة $Taاط(s) = 0$ حللين متساوين

(3) لا تقبل المراجحة $T_a(s) < 0$ حالاً

(4) يكون العددان $T_a(1)$ و $T_a(-2)$ موجبين

(5) يكون 3 حالاً للمعادلة $T_a(s) = 0$

أحسب ، عندئذ ، الحل الثاني .

79. $T_a(s)$ كثير حدود حيث :

$$T_a(s) = (s - 1)^2 - (s + 3)s + 2(s - 3)$$

عُين مجموعة قيم العدد الحقيقي s حتى يقبل كثير الحدود $T_a(s)$:

(1) جذران جداً هما يساوي 1

(2) جذران متنااظرين

(3) جذران من إشارتين مختلفتين .

(4) جذران موجبين

80. أ ، ب عدادان حقيقيان و تا تطبيق للمجموعة \mathcal{G} في نفسها معرف كما يلي :

$$Ta(s) = s^2 + s$$

(1) عُين أ ، ب بحيث يكون : $Ta(1) = 5$ و $Ta(-3) = 4$

(2) نفس السؤال من أجل :

$$3 = \left(\frac{2}{3} \right) \cdot Ta(0) = 1 \quad \text{و} \quad Ta$$

$$\frac{3}{4} = \left(\frac{1}{2} \right) \cdot Ta(-1) \quad \text{و} \quad Ta(-4) =$$

81. أ ، ب ، ح أعداد حقيقة و تا تطبيق للمجموعة \mathcal{G} في نفسها معرف كما يلي :

$$Ta(s) = s^2 + s + 2$$

(1) عُين أ ، ب ، ح حتى يكون :

$$Ta(0) = 3 \quad \text{و} \quad Ta(-1) = 0 \quad \text{و} \quad Ta(4) = 1$$

(2) نفس السؤال من أجل : $Ta(1) = 0$ و $Ta(2) = 0$ و $Ta(3) = 0$

82. المستوي منسوب إلى معلم (m , w , \vec{y})
 أ، ب، ح ثلث نقط إحداثياتها ($3, 4, 3$), ($3, 3, 3$),
 ($-1, -2, 2$) على الترتيب .
- 1) عين معادلات ديكارتية للمستقيمات (1ب)؛ (1ح)؛ (1م)
- 2) عين جملة متراجحة من الدرجة الأولى للمجهولين s , u مجموعة حلوها هي مجموعة الثنائيات (s, u) التي تكون من أجلها النقطة m (s, u) داخلاً المثلث $1\text{ب} \text{ ح}$.

83. ط عدد حقيقي ، ($\Delta^{\text{ط}}$) و ($\Delta^{\text{ط}}$) مستقيمان معادلتاهما على الترتيب :

$$(ط - 1) s - u - ط = 0$$

$$2 ط s + 2 u + 1 = 0$$

1) يبين أنه من أجل $ط = \frac{1}{2}$ يكون المستقيمان ($\Delta^{\text{ط}}$) و ($\Delta^{\text{ط}}$) متوازيين تماماً

$$2) \text{فرض : } ط \neq \frac{1}{2}.$$

عين ، بدلالة ط ، إحداثي نقطة تقاطع المستقيمين ($\Delta^{\text{ط}}$) و ($\Delta^{\text{ط}}$)

84. المستوي منسوب إلى معلم (m , w , \vec{y})
 ط عدد حقيقي و ($\Delta^{\text{ط}}$) ، ($\Delta^{\text{ط}}$) مستقيمان معادلتاهما على الترتيب :

$$2 s - ط u + 3 = 0$$

$$ط s - 2 u + 3 = 0$$

1) يبين أنه من أجل $ط = -2$ يكون المستقيمان ($\Delta^{\text{ط}}$) و ($\Delta^{\text{ط}}$) متوازيين تماماً .

2) يبين أنه من أجل $ط = 2$ يكون المستقيمان ($\Delta^{\text{ط}}$) و ($\Delta^{\text{ط}}$) منطبقين .

3) فرض $ط \neq -2$ و $ط \neq 2$

عين ، بدلالة ط ، إحداثي نقطة تقاطع المستقيمين ($\Delta^{\text{ط}}$) و ($\Delta^{\text{ط}}$) وبين أن هذه النقطة تنتمي إلى المستقيم الذي معادله : $s + u = 0$

85. المستوي منسوب إلى معلم (m ، w ، e)

(1) حل ، في $\mathbb{H} \times \mathbb{H}$ ، الجملة :

$$(1) \quad \left. \begin{array}{l} (t - 1)s + u = t \\ (t - 1)s + u = 1 \end{array} \right\}$$

$$(2) \quad tu + 2su = t + 4$$

حيث t وسيط حقيقي .

(2) عين قيم الوسيط t حتى تكون المعادلتان (1) و (2) معادلي مستقيمين

(Δ_1) و (Δ_2) على الترتيب .

أنشئ المستقيمين (Δ_1) و (Δ_2)

بين أن جميع المستقيمات (Δ_1) تشمل نقطة ثابتة يطلب تعين إحداثياتها .

(3) عين العدد t حتى يكون المستقيمان (Δ_1) و (Δ_2) متوازيين وأنشهما .

86. ★ عملية داخلية في مجموعة الأعداد الحقيقة \mathbb{H} معرفة كما يلي :

$$s★u = su - 2(s + u) + 6$$

(1) أثبت أنه يوجد ، في \mathbb{H} ، عنصر حيادي للعملية ★

(2) عين مجموعة العناصر المتناظرة بالنسبة إلى العملية ★

(3) أثبت أنه يوجد ، في \mathbb{H} ، عنصر ماض للعملية ★

87. تعتبر المعادلة التالية :

$$(1) \quad (t + 2)s^2 + (t - 3)s - 5t = 0$$

حيث s هو المجهول و t وسيط حقيقي .

(1) عين ، حسب قيم t ، عدد حلول هذه المعادلة .

(2) في حالة وجود حلين s' و s'' للمعادلة (1) ، تعتبر النقطتين $\overset{\leftarrow}{P}$ و \vec{P} اللتين

فاصيلتهما s' و s'' على الترتيب ، في معلم (m ، w)

(3) عين t حتى تكون النقطتان $\overset{\leftarrow}{P}$ و \vec{P} متناظرتين بالنسبة إلى النقطة A ذات الفاصلة $(3 -)$.

حدد ، عندئذ ، النقطتين $\overset{\leftarrow}{P}$ و \vec{P} .

(4) عين t حتى تكون النقطتان $\overset{\leftarrow}{P}$ و \vec{P} مترافقتين توافقياً بالنسبة إلى النقطتين A

و B اللتين فاصلتهما (-3) و (-1) على الترتيب .

ح) بين أنه توجد ، بين حلّي المعادلة (1) ، علاقة مستقلة عن الوسيط ط .
استعمل هذه العلاقة لايجاد نقطتين ثابتتين ح ، د يطلب تعين فاصلتيهما بحيث يكون (ح ، د ، ب ، ج) تقسيماً توافقياً .

84. مستطيل محيطه 250 م . إذا أضفنا 20 م إلى طوله و أنقصنا 5 م من عرضه ، لا تتغير مساحته .
عين طول وعرض هذا المستطيل .

85. رتب 42 كتاباً على صفين طوله 1,50 م . سمك بعض الكتب 3 سم وسمك البعض الآخر 5 سم .
ما هو عدد كتب كل نوع ؟

86. عيّن عددين طبيعيين الفرق بينهما 90 ونسبتها $\frac{23}{5}$

87. عيّن عددين حقيقيين غير معادمين بمجموع مقلوبيهما $\frac{5}{36}$ والفرق بين مقلوبيهما $\frac{1}{36}$

88. عدد تلاميذ ثانوية مختلطة 1000 .
بعد أن غادر الثانوية 25 تلميذا و 30 تلميذة ، أصبح عدد البنين ضعف عدد البنات . ما هو عدد البنين وعدد البنات في هذه الثانوية ؟

89. عيّن عددين طبيعيين الفرق بينهما 6 و الفرق بين مربعيهما 216

90. عيّن مثلثاً قائماً طول وتره ب و الفرق بين طولي ضلعيه القائمين ط .
نفرض أن ب ثابت . عيّن قيم ط حتى يكون للمسألة حل .

91. عيّن ثلاثة أعداد طبيعية فردية متتابعة بمجموعها 99 .
نفس السؤال إذا كان المجموع هو 101 .

92. ما هو العدد الطبيعي الذي ينبغي إضافته إلى كل من حدّي كسر للحصول على كسر يساوي ضعف الكسر الأول .

الباب السابع

حساب المثلثات

- 24 - الأقواس الموجهة
- 25 - الزوايا الموجهة
- 26 - حساب المثلثات
- 27 - المعادلات المثلثية الأساسية

إن معظم المفاهيم الواردة في هذا الباب (مثل الرadian ، القوس الموجة ، الزاوية الموجة) تعتبر جديدة بالنسبة للתלמיד و تستحق إهتماماً و عناية أكثر لتزويدهم بالعناصر الأساسية في حساب المثلثات . فيما يختص الأقواس الموجة والزوايا الموجة ، - في شعبة العلوم - يكتفي الأستاذ بإعطاء المفاهيم الأساسية دون التوسيع في دراستها .


الأقواس الموجهة

24


1. الأقواس الهندسية :

1.1 - القوس الهندسي :


- تعيّن نقطتان A ، B من الدائرة (\odot) ذات المركز M ونصف القطر r قوسين هندسيين وهما تقاطع الدائرة (\odot) مع نصفي المستويين المغلقين اللذين حدّاهما المستقيم (AB)



- إذا كانت النقطتان A ، B متناظرتين بالنسبة إلى المركز M يكون لهاتين القوسين نفس الطول πr (الشكل)



- إذا كانت النقطتان A ، B غير متناظرتين بالنسبة إلى المركز M تكون إحدى القوسين ذات طول أصغر من πr به ، ترمز إليها بالرمز $\overset{\frown}{AB}$ وتكون الأخرى ذات طول أكبر من πr به ، ترمز إليها بالرمز $\overset{\smile}{AB}$.
مجموع طولي هاتين القوسين يساوي $2\pi r$ وهو طول الدائرة (\odot)



2.1 - قياس الأقواس الهندسية :

لقياس قوس دائرة تستخدم الوحدات التالية :
الدرجة ، الغراد ، الرadian .

• الدرجة :

الدرجة هي قيس قوس دائرة طولها يساوي $\frac{1}{360}$ من طول هذه الدائرة :

ترميز: ١°

• الغراد :

الغراد هو قيس قوس دائرة طولها يساوي $\frac{1}{400}$ من طول هذه الدائرة :

ترميز: ١ غر

• الرadian :

الراديان هو قيس قوس دائرة طولها يساوي نصف قطر هذه الدائرة :

ترميز: ١ رد

• قيس نصف دائرة حسب الوحدات السابقة هو :

180° ، 200 غر ، π رد

• إذا كان قيس قوس حسب الوحدات السابقة هو α درجة ، β غراد ،

γ رadian

يكون :

$$\frac{\gamma}{\pi} = \frac{\beta}{200} = \frac{\alpha}{180}$$

يبين الجدول التالي التقابل بين أقياس بعض الأقواس

الدرجة	30	45	60	90
الغراد	$\frac{100}{3}$	50	$\frac{200}{3}$	100
الراديان	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$

• طول قوس دائرة :


إذا كان ط طول قوس دائرة نصف قطرها r وكان α قيسها بالراديان
فإن :

$$\text{ط} = \alpha r$$

2. الزوايا الهندسية :

1.2 - الزاوية الهندسية :

يحدد نصفا المستقيمين [م س) و [مع) قطاعين زاويين :
القطاع الزاوي الناتيء (الجزء غير المظلل في الشكل)
والقطاع الزاوي المعكوس (الجزء المظلل في الشكل)



الترميز :

الرمز [م س ، مع] يُرمز به إلى القطاع الزاوي الناتيء (أو الزاوية الناتئة) الذي رأسه م وضلعاه [م س) و [مع).

• إذا تطابق نصفا المستقيمين [م س) و [مع) فإن الزاوية [م س ، مع] تسمى الزاوية المعدومة.


• إذا كان نصفا المستقيمين [م س) و [مع) متعاكسين فإن الزاوية [م س ، مع] تسمى الزاوية المستقيمة.

2.2 - الزاوية المركزية :

(د) دائرة مركزها م .


أ و ب نقطتان من هذه الدائرة .

الزاوية [م أ ، م ب] ذات الرأس م والضلعين [م أ) ، [م ب) تسمى زاوية مركزية تحصر القوس \widehat{AB} .



3.2 - قياس زاوية هندسية :

(د) دائرة ذات المركز M . [ي s ، ي u] زاوية .
توجد نقطتان A ، B من هذه الدائرة بحيث تكون الزاويتان
[ي s ، ي u] و [م A ، م B] متقابستان .




(هذا فإنه يمكن أخذ [م A] و [م B] موازيين ، على الترتيب ، لتصفي المستقيمين [ي s] و [ي u] ومن نفس الجهة)
إن قيس الزاوية [ي s ، ي u] هو قيس القوس الهندسية AB .
إذا اختربنا وحدة للقياس فإن الرمز س ي u يرمز به إلى قيس الزاوية
[ي s . ي u] .

3. الدائرة الموجهة ، المستوى الموجه :

1.3 - الدائرة الموجهة :


(د) دائرة معطاة .

ج) نقطة متحركة على الدائرة (د) ؛ يمكن لهذه النقطة أن تتحرك في إتجاهين ممكنين .



إن توجيه الدائرة (د) يعني اختيار اتجاه للحركة من بين الاتجاهين الممكниين .

إذا كانت (د) و (د') دائرتين موجهتين فإنه يمكن معرفة إن كانت موجهتين في نفس الاتجاه أو في اتجاهين متعاكسين .



(د) و (د') موجهتان
في اتجاهين متعاكسين

2.3 - المستوى الموجه :


إن توجيه المستوى يعني اختيار اتجاه واحد للحركة على جميع دوائر هذا المستوى .

يسمى هذا الاتجاه الاتجاه المباشر أو الموجب
والاتجاه الآخر يسمى الاتجاه غير المباشر أو السالب

إن الاتجاه المباشر الذي نختاره عادة هو الاتجاه المخالف لدوران عقارب الساعة .

3.3 - الدائرة المثلثية :

نسمى دائرة مثلثية كل دائرة موجهة نصف قطرها يساوي واحدة الأطوال .



4 - الأقواس الموجهة :

1.4 - تعريف :

إذا كانت a و b نقطتين من دائرة موجهة فإن الشائبة (a, b) تعين قوساً موجهاً .

نرمز إليها بالرمز $\overset{\curvearrowleft}{ab}$.

النقطة a تسمى مبدأ القوس $\overset{\curvearrowleft}{ab}$

والنقطة b تسمى نهاية القوس $\overset{\curvearrowleft}{ab}$

2.4 - القيس الرئيسي لقوس موجهة :

نسمى قياساً رئيسيأً ، مقدراً بالراديانات لقوس موجهة $\overset{\curvearrowleft}{ab}$ العدد الحقيقي θ المعروف كما يلي :

- إذا تطابقت النقطتان a ، b تكون القوس $\overset{\curvearrowleft}{ab}$ معدومة و $\theta = 0$

- إذا كانت النقطتان a ، b متناظرتين بالنسبة إلى مركز الدائرة يكون

$$\pi = \theta$$

- إذا كانت النقطتان a ، b متماثلتين وغير متناظرتين بالنسبة إلى مركز الدائرة فإن :



1) القيمة المطلقة للعدد θ هي قيس القوس الهندسية $\overset{\curvearrowleft}{ab}$ مقدراً بالراديانات

2) للحصول على إشارة θ نتصور نقطة c تتحرك على القوس $\overset{\curvearrowleft}{ab}$ ،

منطلقة من النقطة a ومستقرة عند b :

إذا تحركت هذه النقطة في الاتجاه المباشر يكون العدد θ موجباً

وإذا تحركت c في الاتجاه غير المباشر يكون العدد θ سالباً .



مثال : القيس الرئيسي لربع دائرة موجهة يساوي :

$$\text{إما } \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \text{ رadians و إما } \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) \text{ radians .}$$

ملاحظة :

القيس الرئيسي لقوس موجهة ، مقدراً بالراديانات هو عدد حقيقي يتبع إلى المجال $[-\pi, \pi]$.

3.4 - أقياس قوس موجهة :

(د) دائرة في المستوى الموجي و $\overset{\curvearrowleft}{\text{أب}}$ قوس موجهة من هذه الدائرة قيسها الرئيسي θ بالراديان .

لتتصور أن نقطة P تتحرك على الدائرة (د) دوماً في الاتجاه نفسه ، منطلقة من أ و مستقرة عند ب .

يمكن ، بطبيعة الحال ، للنقطة P أن تمر بالنقطة ب عدة مرات . لنجيز حالتين : $\theta \leq 0$ و $\theta \geq 0$.

• الحالة الأولى : $\theta \leq 0$

- إذا تحركت P في الاتجاه الموجب وعملت ك دورة ($K \in \mathbb{Z}$) ثم استقرت في النقطة ب ، نقول إنها قطعت $(\theta + 2\pi K)$ radians في الاتجاه الموجب ونكتب :

$$\text{قيس } \overset{\curvearrowleft}{\text{أب}} = \theta + 2\pi K , \quad K \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

.. إذا تحركت P في الاتجاه السالب وعملت ك' دورة ($K' \in \mathbb{Z}$) ثم استقرت في النقطة ب ، نقول إنها قطعت

$$\text{قيس } \overset{\curvearrowleft}{\text{أب}} = (\theta - \pi 2) + 2\pi K' \quad \text{رادياناً في الاتجاه السالب ونكتب :} \quad \left(\theta - \pi 2 + 2\pi K' \right)$$

$$\text{قيس } \overset{\curvearrowleft}{\text{أب}} = -(\pi 2 + \theta - \pi 2) = -\pi 2 + \theta =$$

$$-\pi 2 + \theta =$$

$$-\pi 2 + \theta =$$

(بوضع $\kappa = -\kappa'$)
أي قيس $\overset{\curvearrowleft}{\theta} = 2 + \pi \kappa$ ، $\kappa \in \mathbb{C}$ (2)
من (1) و (2) نستنتج أن
قيس $\overset{\curvearrowleft}{\theta} = 2 + \theta$ $\pi \kappa$ ، $(\kappa \in \mathbb{C})$
• الحالـةـ الـثـانـيـةـ : $0 \geq \theta$

باتـابـاعـ الطـرـيقـةـ السـابـقـةـ نـحـصـلـ عـلـىـ نفسـ التـيـجـةـ السـابـقـةـ
قيـسـ $\overset{\curvearrowleft}{\theta} = 2 + \theta$ $\pi \kappa$ ، $\kappa \in \mathbb{C}$

الخلاصة :

إذا كانت واحدة القياس هي الرadian وكان θ القيس الرئيسي للقوس
الموجهة $\overset{\curvearrowleft}{\theta}$ وكان θ' قيساً آخر للقوس $\overset{\curvearrowleft}{\theta}$
فإن :

$$\overset{\curvearrowleft}{\theta} = \theta' + 2\pi \kappa \quad (\kappa \in \mathbb{C})$$

4.4 - خواص أقياس أقواس موجهة :

انطلاقاً من النتائج السابقة يمكن التأكد من الخواص التالية
الخاصة 1 :

لكل قوس موجهة $\overset{\curvearrowleft}{\theta}$ ما لا نهاية من الأقياس .
ليكن θ_1 قيساً للقوس $\overset{\curvearrowleft}{\theta}$.
يكون θ_2 قيساً للقوس $\overset{\curvearrowleft}{\theta}$ إذا وفقط إذا كان
 $\overset{\curvearrowleft}{\theta} = \theta_1 - \theta_2 = 2\pi \kappa \quad (\kappa \in \mathbb{C})$

مثلاً :

$$\text{قيسان لنفس القوس الموجهة لأن : } \left(\frac{\pi}{2} - \frac{3}{2} \right) \cdot \pi$$

$$\pi 8 = \left(\frac{\pi}{2} - \frac{3}{2} \right) \cdot \frac{\pi}{2}$$

و $\pi 8$ من الشكل $2\pi k$ (كذلك صـ)

(2) $\pi 4$ قيسان لقوسين مختلفتين لأن :

$$\pi 3 = \pi - \pi 4$$

و $\pi 3$ ليس من الشكل $2\pi k$ (كذلك صـ)

الخاصة 2 (علاقة شال)

إذا كانت a, b, c ثلث نقط من دائرة موجهة (د)

فإن :

$$\text{قيسان } \widehat{ab} + \text{قيسان } \widehat{bc} = \text{قيسان } \widehat{ac} + 2\pi k \quad (\text{كذلك صـ})$$

من هذه الخاصية نستنتج أن :

$$\text{قيسان } \widehat{ab} = -\text{قيسان } \widehat{ba} + 2\pi k \quad (\text{كذلك صـ})$$

مثلاً : إذا كان $\frac{\pi}{3}$ قيساً للقوس \widehat{ab} يكون $\left(\frac{\pi}{3} - \frac{5}{3} \right)$ قيساً

للقوس \widehat{ba}

ليست القيسان الوحيدة للقوس \widehat{ba} .

مثلاً $\frac{\pi}{3}$ قيس آخر للقوس \widehat{ba} لأن $\frac{\pi}{5}$ لأن

дан العدد الحقيقي α ، ومهما كانت النقطة A من الدائرة الموجبة (\odot) فإنه توجد نقطة وحيدة B بحيث يكون α قياساً ، بالراديانات للقوس $\overset{\curvearrowleft}{AB}$ الموجهة A

تمرين محلول :

نقطة من دائرة موجهة (\odot) .

أوجد القيس الرئيسي لكل قوس من الأقواس التالية :

$$\overset{\curvearrowright}{AB}, \overset{\curvearrowleft}{AB}, \overset{\curvearrowleft}{AB} \text{ على أن :}$$

$$\text{قيس } \overset{\curvearrowleft}{AB} = \frac{\pi}{4} - \pi 75^{\circ} ; \text{ قيس } \overset{\curvearrowright}{AB} = \frac{\pi}{3} + \pi 65^{\circ}$$

ثم ارسم النقط B ، B' ، B'' على هذه الدائرة

الحل :

$$\text{لدينا } (\pi 38 -) 2 + \pi = \pi 75 - (1)$$

القيس الرئيسي للقوس $\overset{\curvearrowleft}{AB}$ هو π

(2) القسمة الإقليدية للعدد 123 على 4 تعطي :

$$3 + 30 \times 4 = 123$$

$$\frac{\pi (3 + 30 \times 4)}{4} = \frac{\pi 123}{4} \text{ ومنه}$$

$$\frac{\pi 3}{4} + \pi 30 = \frac{\pi 123}{4} \text{ أي :}$$

$$\pi (15) 2 + \frac{\pi 3}{4} =$$

$$\frac{\pi 3}{4} \text{ القيس الرئيسي للقوس } \overset{\curvearrowleft}{AB} \text{ هو}$$

3) القسمة الإقليدية للعدد 65 على 3 تعطي

$$2 + 21 \times 3 = 65$$

$$\frac{\pi(2 + 21 \times 3)}{3} = \frac{\pi 65}{3} : \text{ومنه}$$

$$\frac{\pi 2}{3} + \pi 21 = \frac{\pi 65}{3} : \text{أي}$$

ليس من الشكل $\left(\frac{\pi^2}{3} + \pi 21\right)$

$\pi - [\pi + , \pi -]$ و π ص

لنكتبه على هذا الشكل :


$$\frac{\pi^2}{3} + \pi - \pi 22 = \frac{\pi^2}{3} + \pi 21$$

$$\frac{\pi}{3} - \pi 22 =$$

$$\pi (11) 2 + \frac{\pi}{3} - =$$

القيس الرئيسي للقوس $\overset{\curvearrowleft}{AB}$ هو $\left(\frac{\pi}{3} - \right)$

الأقياس الرئيسية السابقة تسمح لنا برسم النقط
 B, B', B'' (الشكل)



1 - الزاوية الموجة لنصف مستقيمين :


1.1 - تعريف

إذا كان $[اس]$ و $[بع]$ نصف مستقيمين لل المستوى الموجة فإن


(الثنائية) $([اس], [بع])$


تعيّن زاوية موجة نرمز إليها بالرمز $(اس، بع)$

- نصف المستقيم $[اس]$ يسمى الضلع المبدأ للزاوية $(اس، بع)$
ونصف المستقيم $[بع]$ يسمى الضلع النهاية لها .
- إذا كان $[اس]$ و $[بع]$ متوازيين وكان لهما نفس الاتجاه تسمى
الزاوية $(اس، بع)$ الزاوية المعدومة



- إذا كان $[اس]$ و $[بع]$ متوازيين ومتعاكسين الاتجاه تسمى الزاوية
 $(اس، بع)$ الزاوية المستقيمة .





2.1 - أقياس زاوية موجهة :

(د) دائرة موجهة مركزها م و $(\text{أ} \text{س} , \text{ب} \text{ع})$ زاوية موجهة لنصف المستقيمين $(\text{أ} \text{س})$ و $(\text{ب} \text{ع})$


$(\text{م} \text{س}')$ و $(\text{م} \text{ع}')$ نصفا

مستقيمين معرفان كما يلي :

$(\text{أ} \text{س})$ و $(\text{م} \text{س}')$ متوازيان ولهم نفس الاتجاه

$(\text{ب} \text{ع})$ و $(\text{م} \text{ع}')$ متوازيان ولهم نفس الاتجاه

نضع : $(\text{م} \text{س}') \cap (\text{د}) = \{\alpha'\}$
 $(\text{م} \text{ع}') \cap (\text{د}) = \{\beta'\}$



نسمى قياساً ، بالراديان ، للزاوية الموجهة

$(\text{أ} \text{س} , \text{ب} \text{ع})$ كل قيس ، بالراديان ، للقوس الموجه $\overset{\curvearrowleft}{\text{أ ب}}$

نكتب : قيس $(\text{أ} \text{س} , \text{ب} \text{ع}) = (\text{أ} \text{س} , \text{ب} \text{ع})$

- القيس الرئيسي للزاوية الموجهة $(\text{أ} \text{س} , \text{ب} \text{ع})$ هو القيس الرئيسي للقوس $\overset{\curvearrowleft}{\text{أ ب}}$ وهو عدد حقيقي يتمي إلى الحال $[-\pi, \pi]$

3.1 - خواص أقياس الزوايا الموجهة :

من التعريف السابق ومن خواص أقياس الأقواس المواجهة نستنتج ما يلي :

الخاصة 1 :

لكل زاوية موجهة (α_s , β_u) ما لا نهاية من الأقياس .

ليكن θ_1 قياسا للزاوية (α_s , β_u)
 يكون θ_2 قياسا آخر للزاوية الموجهة (α_s , β_u) إذا وفقط إذا
 كان : $\theta_2 = \theta_1 + 2\pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$)

الخاصة 2 : (علاقة شال لأقياس الزوايا الموجهة) منها كانت أنصاف المستقيمات [α_s], [β_u] [حص] لدينا :

$$(\overline{\alpha_s}, \overline{\beta_u}) + (\overline{\beta_u}, \overline{\text{حص}}) = (\overline{\alpha_s}, \overline{\text{حص}}) + 2\pi k, \\ (\overline{k} \in \mathbb{Z})$$

من هذه الخاصة نستنتج أن :

$$(\overline{\alpha_s}, \overline{\beta_u}) = -(\overline{\beta_u}, \overline{\alpha_s}) + 2\pi k, (\overline{k} \in \mathbb{Z})$$

الخاصة 3 :

إذا كان [α'_s] و [β'_u] نصف المستقيمين المعاكسين على الترتيب
 لنصف المستقيمين [α_s] و [β_u] يكون :

$$(\overline{\alpha_s}, \overline{\beta_u}) = (\overline{\alpha'_s}, \overline{\beta'_u}) + 2\pi k, (\overline{k} \in \mathbb{Z}) \\ (\overline{\alpha_s}, \overline{\beta_u}) = (\overline{\alpha'_s}, \overline{\beta_u}) + 2\pi k, (\overline{k} \in \mathbb{Z}) \\ (\overline{\alpha_s}, \overline{\beta_u}) = (\overline{\alpha'_s}, \overline{\beta'_u}) + 2\pi k, (\overline{k} \in \mathbb{Z})$$

الخاصة 4 :

إذا كانت [α_s], [β_u], [حص], [دق] أنصاف مستقيمات
 فإن :

$$(\overline{\alpha_s}, \overline{\beta_u}) = (\overline{\text{حص}}, \overline{\text{دق}}) + 2\pi k \\ (\overline{\alpha_s}, \overline{\text{حص}}) = (\overline{\beta_u}, \overline{\text{دق}}) + 2\pi k$$

(تبادل نصفي المستقيمين $[م ع]$ و $[ح ص]$)

$$\begin{aligned} \overline{(أ س ، م ع)} &= \overline{(ح ص ، د ق)} + 2\pi ك \\ \overline{(د ق ، م ع)} &= \overline{(ح ص ، أ س)} + 2\pi ك \end{aligned}$$

(تبادل نصفي المستقيمين $[أ س]$ و $[د ق]$)


4.1 - الزاوية القطبية لنصف مستقيم :

• تعريف :

$[م ي]$ نصف مستقيم ثابت للمستوى الموجه .

نسمى زاوية قطبية لنصف المستقيم $[أ س]$ بالنسبة إلى نصف المستقيم $[م ي]$ الزاوية الموجهة $(م ي ، أ س)$

يسمى نصف المستقيم $[م ي]$ محوراً قطبياً للمستوى الموجه



• قيس الزاوية الموجهة لنصفي مستقيمين معينين بزاويتيها القطبيتين .
 $[م ي)$ محور قطبي للمستوى الموجه .

α و β قيساً الزاويتين القطبيتين على الترتيب لنصفي المستقيمين $[أ س)$ و $[م ع)$ بالنسبة إلى نصف المستقيم $[م ي)$.

لنبحث عن قيس الزاوية $(أ س ، م ع)$ بدلالة α و β .

لدينا :

$$\begin{aligned} (\text{أس ، مع}) &= (\text{أس ، مي}) + (\text{مي ، مع}) + \pi 2 \text{ ك} \\ - (\text{مي ،أس}) &+ (\text{مي ، مع}) + \pi 2 \text{ ك} = \\ \pi 2 \text{ ك} + \beta + \alpha &= \end{aligned}$$


ومنه :

$$(\text{أس ، مع}) = \boxed{\pi 2 + \alpha - \beta , \text{ك} \in \text{ص}}$$

2 - الزاوية الموجهة لشعاعين :

1.2 - تعريف :

ش و ش' شعاعان غير معدومين من المستوى الموجه مثلاهما على الترتيب م $\overset{\leftarrow}{\text{أ}}$ و م $\overset{\leftarrow}{\text{أ'}}$



الزاوية الموجهة (ش ، ش')
للشعاعين ش و ش' هي
بالتعريف ، الزاوية الموجهة
(م $\overset{\leftarrow}{\text{أ}}$ ، م $\overset{\leftarrow}{\text{أ'}}$) لنصف المستقيمين
(م $\overset{\leftarrow}{\text{أ}})$ و (م $\overset{\leftarrow}{\text{أ'}}$)

إذا كان الشعاعان ش و ش' متوازيين و كان لهما نفس الاتجاه فإن الزاوية
(ش ، ش') هي الزاوية المعدومة .

إذا كان الشعاعان ش و ش' متوازيين و متعاكسي الاتجاه فإن الزاوية
(ش ، ش') هي الزاوية المستقيمة .

2.2 - أقياس زاوية موجهة لشعاعين :

ش و ش' شعاعان غير معدومين من المستوى الموجه مثلاهما على الترتيب
م $\overset{\leftarrow}{\text{أ}}$ ، م $\overset{\leftarrow}{\text{أ'}}$

نسمى قيسا للزاوية الموجهة ($\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش'}}$) كل قيس للزاوية الموجهة ($\overset{\leftarrow}{\text{م}}, \overset{\leftarrow}{\text{م'}}$).
إذا رمزنا بالرمز ($\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش'}}$) لقيس الزاوية الموجهة ($\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش'}}$) نكتب

$$(\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش'}}) = (\overset{\leftarrow}{\text{م}}, \overset{\leftarrow}{\text{م'}} + \pi^2) \quad (\text{ك} \in \mathbb{C})$$

حالات خاصة :

$$(\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش}}) = \pi^2 \text{ك}, \quad (\text{ك} \in \mathbb{C})$$

$$(\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{-\text{ش}}) = \pi^2 + \pi \text{ك}, \quad (\text{ك} \in \mathbb{C})$$

$$(-\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش}}) = \pi^2 + \pi \text{ك}, \quad (\text{ك} \in \mathbb{C})$$

3.2 - خواص :

من خواص أقياس الزوايا الموجهة لنصفي مستقيمين نستنتج الخواص التالية :

- منها كانت الأشعة غير المعدومة $\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش}}$ لدينا

$$(\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش}}) = -(\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش}}) + \pi^2 \text{ك}, \quad (\text{ك} \in \mathbb{C})$$

$$(\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش}}) = (\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{-\text{ش}}) + \pi^2 + \pi \text{ك}, \quad (\text{ك} \in \mathbb{C})$$

$$(\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش}}) = (-\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش}}) + \pi^2 + \pi \text{ك}, \quad (\text{ك} \in \mathbb{C})$$

$$(\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش}}) = (-\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{-\text{ش}}) + \pi^2 + \pi \text{ك}, \quad (\text{ك} \in \mathbb{C})$$

- منها كانت الأشعة غير المعدومة $\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ق}}, \overset{\leftarrow}{\text{ق'}}$ لدينا

$$(\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ش}}) = (\overset{\leftarrow}{\text{ق}}, \overset{\leftarrow}{\text{ق'}}) + \pi^2 \text{ك}$$

$$(\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ق}}) = (\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{ق'}}) + \pi^2 \text{ك}$$

(تبادل الشعاعين $\overset{\leftarrow}{\text{ش}}, \overset{\leftarrow}{\text{و}} \overset{\leftarrow}{\text{ق}}$)

$$\begin{array}{c} \text{ك}(\overleftarrow{\text{ش}}, \overleftarrow{\text{ش}}) = \text{ك}(\overleftarrow{\text{ق}}, \overleftarrow{\text{ق}}) \\ \Updownarrow \\ \text{ك}(\overleftarrow{\text{ش}}, \overleftarrow{\text{ش}}) = \text{ك}(\overleftarrow{\text{ق}}, \overleftarrow{\text{ش}}) \end{array}$$

(تبادل الشعاعين ش و ق)

4.2 - تمرين محلول :

أ ب ح مثلث قائم ومتتساوي الساقين
ي نقطة من القطعة [ب ح]

نعلم أن $\frac{\pi}{2}$ قيس للزاوية (أ ب ، أ ح) و α قيس
للزاوية (أ ي ، أ ب)

أحسب أقياس الزوايا التالية
(أ ي ، أ ح) ؛ (أ ب ، ب ح) ؛ (أ ي ، ب ح)

لدينا

$$\begin{aligned} 0. \quad & \text{ك}(\overleftarrow{\text{ش}}, \overleftarrow{\text{ش}}) + \text{ك}(\overleftarrow{\text{ب}}, \overleftarrow{\text{ب}}) = \text{ك}(\overleftarrow{\text{أ}}, \overleftarrow{\text{أ}}) \\ & \text{ك}(\overleftarrow{\text{ش}}, \overleftarrow{\text{ش}}) = \text{ك}(\overleftarrow{\text{أ}}, \overleftarrow{\text{أ}}) + \alpha = \text{ك}(\overleftarrow{\text{أ}}, \overleftarrow{\text{أ}}) + \frac{\pi}{2} + \alpha = \\ 0. \quad & \text{ك}(\overleftarrow{\text{ش}}, \overleftarrow{\text{ش}}) = \text{ك}(\overleftarrow{\text{أ}}, \overleftarrow{\text{ب}}) + \text{ك}(\overleftarrow{\text{ب}}, \overleftarrow{\text{ش}}) + \pi = \\ & \text{ك}(\overleftarrow{\text{ش}}, \overleftarrow{\text{ش}}) = \text{ك}(\overleftarrow{\text{أ}}, \overleftarrow{\text{ب}}) + \pi + \frac{\pi}{4} = \end{aligned}$$

$\frac{\pi}{4}$ قيس للزاوية (ب ح ، ب أ) لأن المثلث أ ب ح قائم ومتتساوي الساقين

$$\begin{aligned}
 & \text{إذن : } (\alpha, \beta) \leftarrow (\kappa \oplus \gamma) = \frac{\pi^3}{4} \\
 & \bullet (\alpha, \beta) = (\alpha \wedge \beta) + (\alpha \wedge \beta) \leftarrow (\kappa \oplus \gamma) \\
 & (\alpha \wedge \beta) + (\alpha \wedge \beta) = \frac{\pi^3}{4} \\
 & \kappa \oplus \gamma = \frac{\pi}{4} + \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) = \\
 & \kappa \oplus \gamma = \frac{\pi^3}{4} + \alpha
 \end{aligned}$$

3 - الزاوية الموجهة لمستقيمين :


1.3 - تعريف :

كل زاوية موجهة ضلعها المبدأ نصف مستقيم من مستقيم (Δ) وضلعها النهاية نصف مستقيم من مستقيم (Δ') تعيّن زاوية موجهة لمستقيمين (Δ) و (Δ')

نرمز إليها بالرمز (Δ, Δ')

2.3 - قيس زاوية موجهة لمستقيمين :

(Δ) و (Δ') مستقيمان من المستوى الموجهان نقطة من (Δ) و α' نقطة من



النقطة α تحدد على (Δ) نصفي مستقيمين $[أس)$ و $[أع)$
النقطة α' تحدد على (Δ') نصفي مستقيمين $[أ'S')$ و $[أ'ع')$.
ليكن θ قياساً للزاوية $(أس, أ'S')$

لدينا

$$\pi_1 \overset{\text{ك}}{=} 2 + \overline{(أ، ع)} + \overline{(أ، س)} + \overline{(أ، س)} = (أ، س) + \overline{(أ، ع)} + 2 \overset{\text{ك}}{=} \pi_1$$

كذلك

$$\pi_2 \overset{\text{ك}}{=} 2 + \overline{(أ، س)} + \overline{(أ، ع)} + \overline{(أ، س)} = (أ، ع) + \overline{(أ، س)} + 2 \overset{\text{ك}}{=} \pi_2$$

$$2 + \theta + \pi =$$

$$\pi_3 \overset{\text{ك}}{=} 2 + \overline{(أ، ع)} + \overline{(أ، س)} + \overline{(أ، س)} = (أ، ع) + \overline{(أ، س)} + 2 \overset{\text{ك}}{=} \pi_3$$

$$2 + \pi + (\theta + \pi) =$$

$$(\overset{\text{ك}}{=} 1 + \pi) 2 + \theta =$$

نلاحظ ان كل قيس للزوايا الاربع المذكورة آنفا التي ضلعلها المبدأ هو نصف مستقيم من (Δ) وضلعها النهاية هو نصف مستقيم من (Δ') هو من الشكل $\overset{\text{ك}}{=} 2 + \theta + \pi$ أو من الشكل $\overset{\text{ك}}{=} 1 + (\overset{\text{ك}}{=} 2 + \theta)$ فهو ، إدأً من .الشكل $\overset{\text{ك}}{=} 1 + \theta + \overset{\text{ك}}{=} \pi$ ، ($\overset{\text{ك}}{=} \text{ص}$) يسمى العدد $\overset{\text{ك}}{=} 1 + \pi$ قيسا للزاوية الموجهة (Δ ، Δ') ونكتب :

$$(\overset{\text{ك}}{=} \Delta, \Delta') = \overset{\text{ك}}{=} \theta + \overset{\text{ك}}{=} \pi$$

3.3 - خواص :

خواص أقياس الزوايا الموجهة لمستقيمين تستنتج من خواص أقياس الزوايا الموجهة لنطفي مستقيمين فيكون لدينا :

$$\pi + \overset{\text{ك}}{=} (\overset{\text{ك}}{=} \Delta, \Delta) = (\overset{\text{ك}}{=} \Delta, \Delta') + (\overset{\text{ك}}{=} \Delta', \Delta) \bullet$$

$$\pi + \overset{\text{ك}}{=} (\overset{\text{ك}}{=} \Delta, \Delta') = (\overset{\text{ك}}{=} \Delta', \Delta) \bullet$$

$$(\overset{\text{ك}}{=} \Delta, \Delta') \Leftrightarrow \pi + \overset{\text{ك}}{=} (\overset{\text{ك}}{=} \Delta, \Delta') \Leftrightarrow (\overset{\text{ك}}{=} \Delta, \Delta') + \overset{\text{ك}}{=} (\overset{\text{ك}}{=} \Delta, \Delta) \bullet$$

$$(\overset{\text{ك}}{=} \Delta, \Delta') \Leftrightarrow \pi + \overset{\text{ك}}{=} (\overset{\text{ك}}{=} \Delta, \Delta') \Leftrightarrow (\overset{\text{ك}}{=} \Delta, \Delta') + \overset{\text{ك}}{=} (\overset{\text{ك}}{=} \Delta, \Delta) \bullet$$

$$\overset{\text{ك}}{=} (\overset{\text{ك}}{=} \Delta, \Delta') \Leftrightarrow (\overset{\text{ك}}{=} \Delta) // (\overset{\text{ك}}{=} \Delta) \bullet$$

$$\overset{\text{ك}}{=} \pi + \frac{\pi}{2} = (\overset{\text{ك}}{=} \Delta, \Delta) \Leftrightarrow (\overset{\text{ك}}{=} \Delta) \perp (\overset{\text{ك}}{=} \Delta) \bullet$$

4.3 - تطبيقات : منصفا زاوية مستقيمين :

(ق) و (ق') مستقيمان و α قيس للزاوية الموجهة (ق ، ق') لنبحث عن مجموعة المستقيمات (Δ) بحيث يكون $(\overline{q}, \overline{q'}) + \kappa \pi = (\overline{\Delta}, \overline{\Delta})$ (1)

لدينا :

$$\begin{aligned} 0 & \circ (\overline{q}, \overline{q'}) + (\overline{\Delta}, \overline{q'}) + (\overline{q}, \overline{\Delta}) + \kappa \pi \quad (\text{علاقة شال}) \\ & \pi + (\overline{q}, \overline{q'}) - (\overline{\Delta}, \overline{q'}) = \\ & (\overline{q}, \overline{q'}) - (\overline{q}, \overline{\Delta}) + \kappa \pi \quad (\text{حسب (1)}) \end{aligned}$$

ومنه :

$$(\overline{q}, \overline{\Delta}) + (\overline{q}, \overline{q'}) = (\overline{q}, \overline{q'}) + \kappa \pi$$

باضافة $(\overline{q}, \overline{\Delta})$ إلى طرفي المساواة السابقة

إذن :

$$\pi + \alpha = (\overline{\Delta}, \overline{q})$$

$$(\overline{q}, \overline{\Delta}) + \kappa \frac{\pi}{2} + \alpha - \frac{1}{2} = (\overline{\Delta}, \overline{q}) \quad (2)$$

في المساواة (2) العدد κ يأخذ جميع القيم الصحيحة : فعندما يأخذ القيم الزوجية فإن المساواة (2) تكتب :

$$(\overline{q}, \overline{\Delta}) + \kappa' \pi + \frac{1}{2} = 2 \kappa' \quad \text{بوضع } \kappa = 2 \kappa'$$

وعندما يأخذ القيم الفردية فإن المساواة (2) تكتب :

$$(\overline{q}, \overline{\Delta}) + \kappa' \pi + \frac{\pi}{2} + \alpha - \frac{1}{2} = 2 \kappa' + 1 \quad \text{بوضع } \kappa = 2 \kappa'$$

وبالتالي يوجد مستقيمان (Δ_1) و (Δ_2) يتحققان المساواة (1) وهما معرفان كما يلي :

$$(\underline{\underline{q}}, \underline{\underline{\kappa}} + \alpha \frac{1}{2}) = (\underline{\underline{\Delta_1}}, \underline{\underline{\kappa}} \oplus \underline{\underline{\alpha}})$$

$$(\underline{\underline{q}}, \underline{\underline{\kappa}} + \frac{\pi}{2} + \alpha \frac{1}{2}) = (\underline{\underline{\Delta_2}}, \underline{\underline{\kappa}} \oplus \underline{\underline{\alpha}})$$

يسُمِّي المستقيمان (Δ_1) و (Δ_2) منصفي الزاوية الموجهة (q, q') وهما متعامدان لأن

$$\pi \underline{\underline{\kappa}} + (\underline{\underline{\Delta_2}}, \underline{\underline{q}}) + (\underline{\underline{q}}, \underline{\underline{\Delta_1}}) = (\underline{\underline{\Delta_2}}, \underline{\underline{\Delta_1}})$$

$$\pi \underline{\underline{\kappa}} + \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \frac{1}{2} \right) + \alpha \frac{1}{2} =$$

$$\pi \underline{\underline{\kappa}} + \frac{\pi}{2} =$$

حساب المثلثات

26

1 - مراجعة المفاهيم المدرosa في حساب المثلثات :

1.1 - النسب المثلثية لزاوية حادة :

المستوي منسوب إلى معلم متعمد متجانس (m^1, m^2, m^3)

(m^1) دائرة مرکزها m^1 و نصف قطرها 1 .

m^2 ، m^3 نقطتان حيث $m^1 = m^2 + m^3 = m^3$.

m^2 نقطة من القوس $m^1 m^3$ و α قيس للزاوية $[m^1, m^2]$.


• المسقط العمودي للنقطة m^2 على (m^1)

ل المسقط العمودي للنقطة m^2 على (m^3)

نعلم أن :

• فاصلة النقطة m^2 هي جيب تمام الزاوية $[m^1, m^2]$ التي قيسها α

$$\text{تبجب } \overline{m^2} = m^1$$



• ترتيب النقطة m^2 هو جيب الزاوية $[m^1, m^2]$ التي قيسها α

$$\text{جب } \alpha = \overline{m^2}$$

• إذا كانت m^2 تختلف عن كل من m^1 و m^3 فإن النسبة $\frac{\text{جب } \alpha}{\text{تبجب } \alpha}$ هي ظل الزاوية $[m^1, m^2]$ التي قيسها α

$$\frac{\text{جب } \alpha}{\text{تبجب } \alpha} = \text{ظل } \alpha$$


• إذا كانت النقطة \textcircled{D} تختلف عن كل من \textcircled{M} و \textcircled{K} فإن النسبة $\frac{\text{تبعد } \alpha}{\text{جب } \alpha}$ هي ظل تمام الزاوية $[\textcircled{M}^1, \textcircled{M}^2]$ التي قيسها α .

$$\boxed{\frac{\text{تبعد } \alpha}{\text{جب } \alpha} = \text{ظل } \alpha}$$

ملاحظة :

عندما تتسمى النقطة \textcircled{D} إلى \textcircled{A} فإن إحداثياتها موجبة ويمكننا أن نكتب :
 $\text{تبعد } \alpha = \textcircled{M}^1 ; \quad \text{جب } \alpha = \textcircled{M}^2$

2.1 - النسب المثلثية لزاوية حادة من مثلث قائم :
 $\text{م } \textcircled{Q} \text{ ك مثلث قائم في } \textcircled{C} ; \quad \text{و } \alpha \text{ قيس لزاوية } [\textcircled{M} \textcircled{Q}, \textcircled{M} \textcircled{K}] . \text{ الدائرة } (\textcircled{D})$
 التي مرکزها \textcircled{M} ونصف قطرها 1 تقطع $[\textcircled{M} \textcircled{Q}]$ في \textcircled{A} وتقطع $[\textcircled{M} \textcircled{K}]$ في \textcircled{B} .



$$\frac{\text{م } \textcircled{Q}}{\text{م } \textcircled{K}} = \frac{\text{م } \textcircled{Q}}{\text{م } \textcircled{B}} \quad (\text{نظرية طاليس})$$

$$\text{ومنه : } \frac{\text{م } \textcircled{Q}}{\text{م } \textcircled{B}} = \frac{\text{م } \textcircled{Q}}{\text{م } \textcircled{K}}$$

$$\text{أي } \frac{\text{م } \textcircled{Q}}{\text{م } \textcircled{K}} = \frac{\text{م } \textcircled{Q}}{\text{م } \textcircled{B}} \quad (\text{لأن } \textcircled{B} = 1)$$

$$\text{أي } \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \text{تبعد } \alpha \text{ (بالتعریف)} \dots \dots \dots (1)$$

كذلك : من المساواة $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{\sin \gamma}{\sin \delta}$

$$\text{نستنتج : } \frac{\sin \gamma}{\sin \delta} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

$$\text{ومنه : } \frac{\sin \gamma}{\sin \delta} = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha} = 1$$

$$(2) \quad \frac{\sin \gamma}{\sin \delta} = \text{تبعد } \alpha \dots \dots \dots$$

من المساواتين (1) و (2) نستنتج :

$$\frac{\sin \gamma}{\sin \delta} = \text{ظل } \alpha \text{ و } \frac{\sin \alpha}{\sin \delta} = \text{ظل } \gamma$$

إذا كان $\sin \gamma$ مثلاً قائماً في \sin وكان γ قياساً للزاوية $[\sin \gamma, \sin \delta]$

$$\text{فإن : } \frac{\sin \gamma}{\sin \delta} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \quad \text{تبعد } \alpha \quad ?$$

$$\frac{\sin \gamma}{\sin \delta} = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} \quad \text{تبعد } \beta \quad ?$$

$$\frac{\sin \gamma}{\sin \delta} = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} \quad \text{ظل } \alpha = \frac{\sin \gamma}{\sin \delta} \quad \text{ظل } \gamma = \frac{\sin \delta}{\sin \gamma}$$

3.1 - نتائج أساسية :

- إذا كان α و α' قياسين لزوايتين متتامتين فإن

$$\text{تبعد } \alpha = \text{تبعد } \alpha' \quad \text{و } \text{تبعد } \alpha = \text{تبعد } \alpha'$$

• إذا كان α قياساً لزاوية حادة فإن :

$$\text{تبعد}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

• إذا كان α قياساً لزاوية حادة وجب $\alpha \neq 0$ وتبعد α

فإن :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\operatorname{ظل} \alpha} &= \operatorname{ظل} \alpha \\ \frac{1}{\operatorname{ظل}^2 \alpha} + 1 &= \operatorname{ظل}^2 \alpha \end{aligned}$$

• يبيّن الجدول التالي قيم النسب المثلثية لبعض الزوايا

قيس الزاوية	الجيب	جيب تمام	الظل	ظل تمام
${}^{\circ}30$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{3}{\sqrt{3}}$
${}^{\circ}45$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
${}^{\circ}60$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{3}{\sqrt{3}}$

2 - جيب تمام وجيب عدد حقيقي :

1.2 - الدائرة المثلثية :


المستوى الموجه منسوب إلى معلم متعمد متجانس (m, w, i)

الدائرة الموجهة (d) التي مركزها m ونصف قطرها 1 تسمى الدائرة

المثلثية المرفقة بالمعلم (m, w, i)


نسمى فيها يلي α ، β ، γ ، δ
النقط من الدائرة (\odot) المعرفة كما
يلي :

$$\begin{aligned} \alpha &= (0, 1) ; \quad \beta = (1, 0) ; \\ \gamma &= (0, -1) ; \quad \delta = (-1, 0) \end{aligned}$$



2.2 - جيب تمام وجيب عدد حقيقي :
إذا كان α عدداً حقيقياً فإنه توجد نقطة وحيدة \odot تتنبئ إلى الدائرة المثلثية
 (\odot) بحيث يكون α قيساً ، بالراديان ، للقوس \odot

نسمى جيب تمام العدد الحقيقي α فاصلة النقطة \odot ونرمز إليه بالرمز
تجب α



نسمى جيب العدد الحقيقي α
ترتيب النقطة \odot ونرمز إليه بالرمز
جب α

إذن :

إذا كان H المسقط العمودي للنقطة \odot على (M)
وكان L المسقط العمودي للنقطة \odot على (M)

فإن :

$$\text{تجب } \alpha = \overline{H} ; \quad \text{جب } \alpha = \overline{ML}$$

• يسمى محور الفواصل محور جيوب تمام ويسمى محور التراتيب محور الجيوب .

- نلاحظ أنه عندما تنتهي النقطة \hat{c} إلى الدائرة المثلثية (ω) فإن نقطتين \hat{h} و \hat{l} تنتهيان ، على الترتيب ، إلى القطعتين $[A^1]$ و $[B^1]$.
ومنه :

$$1 \geqslant \operatorname{جب} \alpha \geqslant -1$$

- نعلم أنه إذا كان α قياساً للقوس $\hat{A}\hat{C}$ فإن كل عدد من الشكل $\alpha + 2\pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$) هو قيس للقوس $\hat{A}\hat{C}$.
وبالتالي :

$$\begin{aligned} \operatorname{تبعب}(\alpha + 2\pi k) &= \operatorname{تبعب} \alpha \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ \operatorname{جب}(\alpha + 2\pi k) &= \operatorname{جب} \alpha \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

- من المساواة $m^2 \hat{h}^2 + m^2 \hat{c}^2 = m^2$

$$\operatorname{تبعب}^2 \alpha + \operatorname{جب}^2 \alpha = 1$$

3 - ظل وظل تمام عدد حقيقي :

1.3 - ظل عدد حقيقي :

تعريف :

α عدد حقيقي بحيث $\operatorname{تبعب} \alpha \neq 0$.


نسمى ظل العدد α النسبة $\frac{\operatorname{جب} \alpha}{\operatorname{تبعب} \alpha}$ ونرمز إليه بالرمز ظل α

• التفسير الهندسي

نعلم أنه :

إذا كان α عدداً حقيقياً فإنه توجد نقطة وحيدة \hat{c} من الدائرة المثلثية (ω) بحيث يكون α قياساً للقوس $\hat{A}\hat{C}$.

نسمى : هـ المسقط العمودي للنقطة دـ على (مـ^ا)
ول المسقط العمودي للنقطة دـ على (مـ بـ) و (مـ دـ) الماس للدائرة (دـ)
في النقطة اـ .



إذا كان تجـب $\alpha \neq 0$ فإن النقطة دـ
تختلف عن النقطتين بـ و دـ
والمستقيم (مـ دـ) يقطع (دـ) في
النقطة طـ .

نسمـي لـ كـ نقطة تقاطـع المستقيـمين
(لـ دـ) و (دـ).

من توازـي المستقيـمين (أـ طـ) و (هـ دـ) وبـتطبيق نـظرـية طـالـيس يـكون

$$\text{لـديـنا : } \frac{\overline{مـ}}{\overline{هـ}} = \frac{\overline{أـ}}{\overline{طـ}} \dots\dots\dots (1)$$

كـذـلـكـ من توازـي المستقيـمين (مـ^ا) و (كـ دـ) وـتـطـيـقـاً لـنـظـرـيـة طـالـيس
يـكون لـديـنا :

$$(2) \dots\dots\dots \frac{\overline{أـ}}{\overline{طـ}} = \frac{\overline{مـ}}{\overline{هـ}}$$

$$\frac{\overline{أـ}}{\overline{هـ}} = \frac{\overline{مـ}}{\overline{كـ}}$$

$$\text{أـيـ : } \frac{\overline{أـ}}{\overline{هـ}} \times \frac{\overline{مـ}}{\overline{كـ}} = \frac{\overline{مـ}}{\overline{هـ}}$$

$$\text{أـيـ : } \frac{\text{تجـبـ} \alpha}{\overline{أـ}} = \frac{\text{تجـبـ} \alpha}{\overline{هـ}}$$

$$\text{لـأنـ : } \overline{مـ} = \overline{هـ} ; \text{تجـبـ} \alpha ; \overline{أـ} = \overline{كـ} = \overline{مـ} \overline{لـ} = \text{تجـبـ} \alpha$$

$$\text{إذن : } \alpha = \overline{\text{ظل}}^{\alpha}$$

يسمى المحوّر (\triangle ، \circlearrowleft) محوّر الظلّاً

• خاصية :

من المساواة تجحب $\alpha^2 + \text{جب}^2 = 1$

$$\frac{1}{\text{تجب}^2 \alpha} = \frac{\text{تجب}^2 + \alpha^2}{\text{تجب}^2 \alpha} \quad \text{نستنتج :}$$

$$\frac{1}{\text{تجب}^2 \alpha} = \alpha^2 + 1 \quad \text{أي :}$$

2.3 - ظل تمام عدد حقيقي :

α عدد حقيقي بحيث $\text{جب} \alpha \neq 0$

نسمى ظل تمام العدد α النسبة $\frac{\text{تجب}^{\alpha}}{\text{جب}^{\alpha}}$ ونرمز إليه بالرمز ظل α .

نلاحظ أنه إذا كان $\text{تجب} \alpha \neq 0$ و $\text{جب} \alpha \neq 0$ فإن :

$$\frac{1}{\text{ظل} \alpha} = \frac{\text{تجب}^{\alpha}}{\text{ظل}^{\alpha}}$$

3.3 - قيم تجحب ، جب ، ظل ، تظل بعض الأعداد :
يبين الجدول التالي قيم جيب تمام ، جيب ، ظل ، وتظل الأعداد التالية

$$\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}$$

$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	0	العدد
1	$\frac{3\sqrt{}}{2}$	$\frac{2\sqrt{}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	جيب α
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{2\sqrt{}}{2}$	$\frac{3\sqrt{}}{2}$	1	تجلب α
غير معرف	$\frac{3\sqrt{}}{3}$	1	$\frac{3\sqrt{}}{3}$	0	ظل α
0	$\frac{3\sqrt{}}{3}$	1	$\frac{3\sqrt{}}{3}$	غير معرف	تظل α

4 - العلاقات بين جيوب . جيوب تمام وظلال عددين α و $\bar{\alpha}$ مجموعها


أو فرقها : 0 أو π أو $\frac{\pi}{2}$

$$0 = \bar{\alpha} - \alpha \quad 1.4$$

لدينا $\bar{\alpha} = \pi - \alpha$

لتكون D و D' النقطتين من الدائرة المثلثية (د) بحيث يكون α قياساً للقوس \widehat{AD} ويكون $(-\alpha)$ قياساً للقوس $\widehat{A'D'}$ تسمى القوسان \widehat{AD} و $\widehat{A'D'}$ قوسين متعاكستين والزاويايتان ($M^{\circ} A$ و $M^{\circ} D$) و ($M^{\circ} A$ ، $M^{\circ} D'$) زاويتين متعاكستين .

بما أن النقطتين D و D' مت対اظرتان بالنسبة إلى (د) فلهما نفس الفاصلة وترتباها متعاكسان .



ومنه :

$$\begin{aligned} \text{تبعد } (\alpha - \pi) &= \text{تبعد } \alpha \\ \text{جب } (\alpha - \pi) &= \text{جب } \alpha \\ \text{ظل } (\alpha - \pi) &= \text{ظل } \alpha \end{aligned}$$

$$: \boxed{\pi = \alpha + \pi} - 2.4$$

لدينا : $\alpha - \pi = \pi'$

لتكن P و Q نقطتين من الدائرة المثلثية (\odot) بحيث يكون α قياساً للقوس $\overset{\curvearrowleft}{PQ}$ ويكون $(\alpha - \pi)$ قياساً للقوس $\overset{\curvearrowleft}{Q'P}$. تسمى القوسان $\overset{\curvearrowleft}{PQ}$ و $\overset{\curvearrowleft}{Q'P}$ قوسين متكمالتين والزوايا α و $(\alpha - \pi)$ زوايتين متكمالتين. النقطتان P و Q متناظرتان بالنسبة إلى (π, π') .

فلهما فاصلتان متعاكستان ولهم نفس الترتيب.


ومنه :

$$\begin{aligned} \text{تبعد } (\alpha - \pi) &= \text{تبعد } \alpha \\ \text{جب } (\alpha - \pi) &= \text{جب } \alpha \\ \text{ظل } (\alpha - \pi) &= \text{ظل } \alpha \end{aligned}$$


$$: \boxed{\pi = \alpha - \pi} - 3.4$$

لدينا $\pi - \alpha = \alpha'$

لتكن P و Q نقطتين من الدائرة المثلثية (\odot) بحيث يكون α قياساً للقوس $\overset{\curvearrowleft}{PQ}$ ويكون $(\pi + \alpha)$ قياساً للقوس $\overset{\curvearrowleft}{Q'P}$. النقطتان P و Q متناظرتان بالنسبة إلى المركز M .



فالمواضي فاصلتان متعاكستان وترتيبان
متراكسان



$$\text{تبعد } \alpha = (\pi + \alpha)$$

$$\text{جيب } \alpha = (\pi + \alpha)$$

$$\text{ظل } \alpha = (\pi + \alpha)$$

$$\frac{\pi}{2} = \alpha + \alpha - 4.4$$

$$\text{لدينا } \alpha - \frac{\pi}{2} = \alpha'$$

لتكن M و M' النقطتين من الدائرة المثلثية (ω) بحيث يكون α قياساً للقوس

$$M \quad \text{و} \quad M' \quad \left(\alpha - \frac{\pi}{2} \right) \quad \text{قيساً للقوس } MM'.$$

تسمى القوسان MM' و MM' قوسين متمامتين والزاويتان الموجهتان (M^1, M^2) و (M^1, M^2') زاويتين متمامتين.

لقد رأينا أنه إذا كانت لدينا زاويتان متمامتان يكون جيب قيس إحداهما مساوياً لجيب تمام قيس الأخرى، ويمكن تعميم هذه النتيجة على أقياس زاويتين موجهتين ومتمامتين:

$$\begin{aligned} \text{تبعد } \alpha &= \left(\alpha - \frac{\pi}{2} \right) \\ \text{جيب } \alpha &= \left(\alpha - \frac{\pi}{2} \right) \\ \text{ظل } \alpha &= \left(\alpha - \frac{\pi}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{\pi}{2} = \alpha - ' \alpha} - 5.4$$

$$\alpha + \frac{\pi}{2} = ' \alpha \quad \text{لدينا}$$

بتطبيق النتائج السابقة يمكن أن نكتب :

$$\left((\alpha -) - \frac{\pi}{2} \right) \text{ تجب} = \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right) \text{ تجب}$$

$$x - - = (\alpha -) \text{ جب} =$$

$$\left((\alpha -) - \frac{\pi}{2} \right) \text{ جب} = \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right) \text{ جب}$$

$$x - - \text{ تجب} = (\alpha -) \text{ تجب}$$

$$\left((\alpha -) - \frac{\pi}{2} \right) \text{ ظل} = \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right) \text{ ظل}$$

$$x - - \text{ تظل} = (\alpha -) \text{ تظل}$$

المعادلات المثلثية الأساسية

27

1 - المعادلات من الشكل تجحب س = تجحب α

1.1 - الأعداد التي لها نفس جيب تمام :

• α و β عدوان حقيقيان و C ، C' نقطتان من الدائرة المثلثية (ω) بحيث

يكون α قياساً للقوس C و β قياساً

للقوس C'


يكون للعددين α و β نفس جيب

القام إذا وفقط إذا كانت للنقطتين C و C' نفس الفاصلة وهذا يعني أن

النقطتين C و C' متطابقتان أو

متنازليتان بالنسبة إلى (ω)

ومنه النتيجة :



$$\left(\begin{array}{l} \text{أو} \\ \text{ـ} \end{array} \right) \Leftrightarrow \begin{array}{l} \text{تجحب } \alpha = \text{تجحب } \beta \\ \text{ـ} \end{array}$$

2.1 - حل المعادلة تجحب س = تجحب α :

نعتبر المعادلة تجحب س = تجحب α حيث س هو المجهول الحقيقي و α عدد حقيقي معطى :

النتيجة الحصول عليها في الفقرة السابقة تسمح بحل المعادلة :

تجحب س = تجحب α

$$\left(\begin{array}{l} \text{ـ} \\ \text{أو} \\ \text{ـ} \end{array} \right) \Leftrightarrow \begin{array}{l} \text{تجحب س = تجحب } \alpha \\ \text{ـ} \end{array}$$

أمثلة

1) حلول المعادلة تجب $s = \frac{\pi}{3}$ هي الأعداد الحقيقية s

$$s = \frac{\pi}{3} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \quad \left[\begin{array}{l} \text{حيث} \\ \text{أو} \end{array} \right]$$

$$s = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \quad \left[\begin{array}{l} \text{أو} \\ \text{أو} \end{array} \right]$$

2) لنتبر المعادلة ذات المجهول s :

$$\text{تبعد } 2s = \text{تبعد} \left(\frac{\pi}{4} + s \right)$$

لدينا :

$$s = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \quad \left[\begin{array}{l} \text{أو} \\ \text{أو} \end{array} \right] \iff (1)$$

$$(2) \quad s = \frac{\pi}{4} + \left(\frac{\pi}{4} + s \right) \iff s = \frac{\pi}{2}$$

$$s = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} \iff s = \frac{3\pi}{4} \iff (1)$$

$$s = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} \iff s = \frac{3\pi}{4} \iff (2)$$

$$s = \frac{\frac{1}{3}\pi}{3} + \frac{\pi}{12} \iff s = \frac{\pi}{12} \iff (2)$$

حلول المعادلة (م) هي الأعداد الحقيقة س حيث

$$س = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} ك ، ك \in \mathbb{C}$$

أو

$$س = \frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{2} ك ، ك \in \mathbb{C}$$

(3) لنعتبر المعادلة ذات المجهول س :

$$\text{تبعد } \left(\frac{\pi}{6} + س \right) - \left(\frac{\pi}{3} \right) = \left(\frac{\pi}{6} + س \right) + \frac{\pi}{2} ك$$

: لدينا

$$(3) \quad س = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} ك . ك \in \mathbb{C}$$

أو

$\Leftrightarrow (M')$

$$(4) \quad س = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} - \left(\frac{\pi}{6} + س \right)$$

المعادلة (3) ليس لها حل

$$س = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} ك . ك \in \mathbb{C} \Leftrightarrow (4)$$

$$س = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6} ك . ك \in \mathbb{C} \Leftrightarrow$$

إذن حلول المعادلة (م') هي الأعداد الحقيقة س حيث

$$س = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6} ك . ك \in \mathbb{C}$$

3.1 - حل المعادلة تجحب س = ط :

ط عدد حقيقي و (ω) الدائرة المثلثية المرفقة بالمعلم (m^{ω} , m^{ω} , m^{ω})
 الأعداد الحقيقة س التي تتحقق تجحب س = ط هي أقياس الأقواس ω
 بحيث تكون فاصلة ω هي ط

- إذا كان ط $\notin [-1, 1]$ لا يوجد حل للمعادلة تجحب س = ط
- إذا كان ط $\in [-1, 1]$ توجد على الأقل نقطة ω من الدائرة (ω)
 فاصلتها ط

إذا كان α قياساً للقوس ω فإن حل المعادلة تجحب س = ط يؤول إلى
 حل المعادلة تجحب س = تجحب α

أمثلة :

$$1) \text{ نعتبر المعادلة تجحب س} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$$

نعلم أن تجحب

$$\frac{1}{2} \text{ هي حلول المعادلة تجحب س} = \frac{1}{2}$$

$$\text{تجحب س} = \text{تجحب } \frac{\pi}{3} \text{ وهي الأعداد الحقيقة س حيث}$$

$$\left(\text{س} = \text{تجب } \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$$

أو

$$\left(\text{س} = \text{تجب } \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}k, k \in \mathbb{Z} \right)$$

2) نعتبر المعادلة $1 + 2 \sin x = 0$

$$\text{لدينا } 1 + 2 \sin x = 0 \iff \sin x = -\frac{1}{2}$$

نعلم أن $\sin x = -\frac{1}{2}$ لأن :

$$\frac{1}{2} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \sin \left(\frac{\pi}{3} - \pi \right) = \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right)$$

حلول المعادلة $1 + 2 \sin x = 0$ هي حلول المعادلة

$\sin x = \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right)$ وهي الأعداد الحقيقية x حيث :

$$x = 2k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$$

أو

$$x = 2k\pi - \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$$

3) نعتبر المعادلة $\sin x = 1$

نعلم أن $\sin x = 1$ إذا

$$\sin x = 1 \iff \sin x = \sin 0$$

$$x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

أو

$$x = 2k\pi - \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

حلول المعادلة $\sin x = 1$ هي الأعداد الحقيقية x حيث

$$x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

4) نعتبر المعادلة تجب $s = -1$

نعلم أن تجب $1 - \pi$

تبجب $s = -1 \Leftrightarrow$ تجب $s = \pi$

$$s = \pi k + 2\pi, k \in \mathbb{Z}$$

أو

$$s = \pi k - 2\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$s = (\pi k + 1), k \in \mathbb{Z}$$

أو

$$s = (\pi k - 1), k \in \mathbb{Z}$$

\Leftrightarrow

\Leftrightarrow

العدان الصحيحان $(2k - 1)$ و $(2k + 1)$ فردان وكيفيان

يمكن كتابتها على شكل موحد $(2k' + 1), k' \in \mathbb{Z}$

إذن :

حلول المعادلة تجب $s = -1$ هي الأعداد الحقيقة

س حيث $s = (2k' + 1)\pi, k' \in \mathbb{Z}$


2 - المعادلات من الشكل $\sin s = \sin \alpha$:

1.2 - الأعداد التي لها نفس الجيب :

α و β عدانت حقيقيان ، M و M' نقطتان من الدائرة المثلثية (ω) المرفقة

بالمعلم (M, M^A, M^B)

حيث يكون α قياساً للقوس M^A و β قياساً للقوس M^B



يكون للعددين α و β نفس الجيب

إذا وفقط إذا كان للنقطتين M و M'

نفس الترتيب وهذا يعني أن

النقطتين M و M' متطابقتان أو

متنازلتان بالنسبة إلى (M, M') .

ومنه النتيجة :

$$\left(\begin{array}{l} \text{أو} \\ \text{أو} \end{array} \right) \Leftrightarrow \text{جب } \alpha = \text{جب } \beta$$

$\text{جب } s = \text{جب } \alpha$

2.2 - حل المعادلة $\text{جب } s = \text{جب } \alpha$:

نعتبر المعادلة $\text{جب } s = \text{جب } \alpha$ حيث s هو المجهول الحقيقي و α عدد حقيقي معطى. النتيجة المحصل عليها في الفقرة السابقة تسمح بحل المعادلة

$$\text{جب } s = \text{جب } \alpha$$

$$\boxed{\left[\begin{array}{l} \text{أو} \\ \text{أو} \end{array} \right] \Leftrightarrow \text{جب } s = \text{جب } \alpha}$$

أمثلة :

$$1) \text{ حلول المعادلة } \text{جب } s = \text{جب } \frac{\pi}{6} \text{ هي الأعداد الحقيقية } s$$

حيث :

$$\boxed{\left[\begin{array}{l} \text{أو} \\ \text{أو} \\ \text{أي} \end{array} \right]}$$

$\text{جب } s = \text{جب } \frac{\pi}{6}$

(م) $\left(-s - \frac{\pi}{4} \right)$ نعتبر المعادلة $\sin 2s = \sin \left(k\pi + \frac{\pi}{4} \right)$ لدينا :

$$\begin{aligned} \sin 2s &= \sin \left(k\pi + \frac{\pi}{4} \right) \\ \text{أو} \end{aligned} \quad \Rightarrow (م)$$

$$\left(-s - \frac{\pi}{4} \right) - \pi = 2k\pi \quad \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \sin 3s &= \sin \left(k\pi + \frac{\pi}{4} \right) \\ \text{أو} \end{aligned} \quad \Rightarrow$$

$$\sin 3s = \sin \left(k\pi + \frac{3\pi}{4} \right) \quad \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} s &= \frac{k\pi}{3} + \frac{\pi}{12} \\ \text{أو} \end{aligned} \quad \Rightarrow$$

$$s = \frac{k\pi}{3} + \frac{3\pi}{4} \quad \Rightarrow$$

إذن حلول المعادلة $\sin 2s = \sin \left(k\pi + \frac{\pi}{4} \right)$ هي الأعداد الحقيقة س حيث

$$\begin{aligned} s &= \frac{k\pi}{3} + \frac{\pi}{12} \\ \text{أو} \end{aligned} \quad \Rightarrow$$

$$s = \frac{k\pi}{3} + \frac{3\pi}{4} \quad \Rightarrow$$

$$(1) \quad 0 = 3 + 7 \sin s - 2 \cos^2 s$$

نضع $\cos s = u$ ونحل الجملة

$$\left. \begin{array}{l} u = \cos s \\ u^2 = \cos^2 s \end{array} \right\}$$

$$(2) \quad 0 = 3 + 7u^2 - 2u^2$$

للمعادلة (2) حلان 3 و $\frac{1}{2}$

من أجل $u = 3$ نحصل على المعادلة $\cos s = 3$ التي ليس لها حل ومن

أجل $u = \frac{1}{2}$ نحصل على المعادلة $\cos s = \frac{1}{2}$ والتي حلوها هي الأعداد

الحقيقية s حيث

$$s = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

أو

$$s = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

إذن حلول المعادلة (1) هي الأعداد الحقيقية s حيث:

$$s = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

أو

$$s = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

3.2 - حل المعادلة $\cos s = \theta$:

ط عدد حقيقي و (ω) الدائرة المثلثية

الأعداد الحقيقة s التي تتحقق $\cos s = \theta$ هي أقياس الأقواس $\overset{\leftarrow}{\theta}$
بحيث يكون ترتيب θ هو ط

- إذا كان $\theta \notin [-1, 1]$ لا يوجد حل للمعادلة $\cos s = \theta$
- إذا كان $\theta \in [-1, 1]$ توجد على الأقل نقطة θ من الدائرة (ω)

ترتيبها ط

إذا كان α قياساً للقوس $\overset{\leftarrow}{\theta}$ فإن حل المعادلة $\cos s = \theta$ يؤول إلى حل
المعادلة $\cos s = \cos \alpha$

أمثلة :

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad 1) \text{ نعتبر المعادلة } \cos s =$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3} \quad \text{نعلم أن } \cos \frac{\pi}{3} =$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{حلول المعادلة } \cos s = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{هي حلول المعادلة}$$

$$\cos s = \cos \frac{\pi}{3} \quad \text{وهي الأعداد الحقيقة } s \text{ حيث}$$

$$s = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad]$$

أو

$$s = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad]$$

أي :

$$س = \frac{\pi}{3} + 2\cot^{-1} k]$$

أو

$$س = \frac{\pi^2}{3} + 2\cot^{-1} k]$$

2) نعتبر المعادلة $1 + 2 \cot^{-1} k = 0$

$$\frac{1}{2} - \cot^{-1} k = 0 \Leftrightarrow \cot^{-1} k = \frac{1}{2}$$

$$\text{نعلم أن } \cot^{-1} \left(-\frac{\pi}{6} \right)$$

حلول المعادلة $1 + 2 \cot^{-1} k = 0$ هي حلول المعادلة

$$\cot^{-1} k = \frac{\pi}{6} \quad \text{وهي الأعداد الحقيقية } k \text{ حيث}$$

$$س = \frac{\pi}{6} + 2\cot^{-1} k]$$

أو

$$س = \frac{\pi}{6} - 2\cot^{-1} k]$$

أي :

$$س = \frac{\pi}{6} + 2\cot^{-1} k]$$

أو

$$س = \frac{7\pi}{6} + 2\cot^{-1} k]$$

3) نعتبر المعادلة $\cos s = 1$

$$\text{نعلم أن } \cos s = \frac{\pi}{2}$$

$$\cos s = 1 \Leftrightarrow \cos s = \cos \frac{\pi}{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos s = \cos \left(\frac{\pi}{2} + k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z} \\ \cos s = \cos \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z} \end{array} \right] \Leftrightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos s = \cos \left(\frac{\pi}{2} + k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z} \\ \cos s = \cos \left(\frac{\pi}{2} - k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z} \end{array} \right] \Leftrightarrow$$

$$\cos s = \cos \left(\frac{\pi}{2} + k\pi \right) \Leftrightarrow$$

حلول المعادلة $\cos s = 1$ هي الأعداد الحقيقية

$$s \text{ حيث } s = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

(4) نعتبر المعادلة جب س = 1 -

$$1 - = \left(\frac{\pi}{2} - \right) \text{ جب } \quad \text{نعلم } \text{ جب}$$

$$\left(\frac{\pi}{2} - \right) \text{ جب } \Leftrightarrow \text{ جب س} = \text{ جب} \quad (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{س} = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \\ \text{أو} \\ \text{س} = \left(\frac{\pi}{2} - \right) - \pi = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \end{array} \right] \Leftrightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{س} = \frac{\pi}{2} + \pi k \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ \text{أو} \\ \text{س} = \left(1 + k \right) \pi 2 + \frac{\pi}{2} \end{array} \right] \Leftrightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{س} = \frac{\pi}{2} + \pi k \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ \text{أو} \\ \text{س} = \left(k' \right) \pi 2 + \frac{\pi}{2} \end{array} \right] \Leftrightarrow$$

بوضع ك = 1 + ك'

إذن :

حلول المعادلة $\cos s = -1$ هي الأعداد الحقيقية s حيث :

$$s = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$


5) نعتبر المعادلة $\cos s = \sqrt{2}/2$

لدينا $\sqrt{2}/2 < 1$

إذن ليس للمعادلة $\cos s = \sqrt{2}/2$ حل

3 - المعادلات من الشكل $\cos s = \cos \alpha$

1.3 - الأعداد التي لها نفس الظل :



α و β عددين حقيقيان ، O و O'

ال نقطتان من الدائرة المثلثية (O)

بحيث يكون α قياساً للقوس $\text{O}\text{---}\text{M}$ و β

قيساً للقويس $\text{O}'\text{---}\text{M}'$

نسمى P نقطة تقاطع المستقيمين

(OM) و (OM') ، و P' نقطة

تقاطع المستقيمين ($\text{O}\text{---}\text{M}'$) و ($\text{O}'\text{---}\text{M}$)

يكون للعددين α و β نفس الظل إذا وفقط إذا كانت النقطتان P و P'

متطابقتين وهذا يعني أن النقطتين P و P' متطابقتان أو متناظرتان بالنسبة إلى

النقطة M

فعدمها تكون P و P' متطابقتين

يكون $\alpha = \beta + 2\pi k$ ، $k \in \mathbb{Z}$ (1)

وعندما تكون P و P' متناظرتين بالنسبة إلى M

يكون $\alpha = \beta + \pi + 2\pi k$ ، $k \in \mathbb{Z}$

(2) $\alpha = \beta + (\pi + 2\pi k)$ ، $k \in \mathbb{Z}$

يمكن كتابة (1) و (2) على الشكل الموحد
 $\alpha = \beta + \kappa \pi$, $\kappa \in \mathbb{Z}$
 لأن :

من أجل قيم κ الزوجية نحصل على (1) ومن أجل قيم κ الفردية نحصل على (2)

ومنه النتيجة :

$$\operatorname{Zl} \alpha = \operatorname{Zl} \beta \iff \alpha = \beta + \kappa \pi, \kappa \in \mathbb{Z}$$

2.3 - حل المعادلة $\operatorname{Zl} s = \operatorname{Zl} \alpha$

نعتبر المعادلة $\operatorname{Zl} s = \operatorname{Zl} \alpha$ حيث s هو المجهول الحقيقي و α عدد حقيقي معطى :

النتيجة الحصول عليها في الفقرة السابقة تسمح بحل المعادلة $\operatorname{Zl} s = \operatorname{Zl} \alpha$

$$\operatorname{Zl} s = \operatorname{Zl} \alpha \iff s = \alpha + \kappa \pi, \kappa \in \mathbb{Z}$$

أمثلة :

1) حلول المعادلة $\operatorname{Zl} s = \operatorname{Zl} \frac{\pi}{4}$ هي الأعداد الحقيقية s .

$$\text{حيث } s = \frac{\pi}{4} + \kappa \pi, \kappa \in \mathbb{Z}$$

2) نعتبر المعادلة $\operatorname{Zl} 3s = \operatorname{Zl} \left(2 - \frac{\pi}{3}\right)$ (م)

لدينا :

$$(m) \iff 3s = 2 - \frac{\pi}{3} + \kappa \pi, \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$s = \frac{2}{3} + \frac{\pi}{9} + \kappa \pi, \kappa \in \mathbb{Z} \iff$$

$$s = \frac{2}{3} + \frac{\pi}{15} + \frac{\kappa \pi}{5}, \kappa \in \mathbb{Z} \iff$$

إذن حلول المعادلة $\operatorname{ظل} 3s = \operatorname{ظل} 2s$

هي الأعداد الحقيقة من حيث

$$s = \frac{\pi}{5} + \frac{\pi}{15}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

3.3 - حل المعادلة $\operatorname{ظل} s = t$

مما يكُن العدد الحقيقي t يوجد ، على الأقل ، عدد حقيقي x بحيث يكون $\operatorname{ظل} x = t$

وحل المعادلة $\operatorname{ظل} s = t$ يُؤدي إلى حل المعادلة $\operatorname{ظل} s = \operatorname{ظل} x$

أمثلة :

1) نعتبر المعادلة $\operatorname{ظل} s = 1$

$$\text{نعلم أن } \operatorname{ظل} \frac{\pi}{4} = 1$$

جلول المعادلة $\operatorname{ظل} s = 1$ هي حلول المعادلة

$\operatorname{ظل} s = \operatorname{ظل} \frac{\pi}{4}$ وهي الأعداد الحقيقة s حيث

$$s = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) نعتبر المعادلة $\operatorname{ظل} \frac{s}{2} = \sqrt{3}$

$$\text{نعلم أن } \operatorname{ظل} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$\operatorname{ظل} \frac{s}{3} = \operatorname{ظل} \frac{s}{2} \Leftrightarrow \sqrt[3]{v} = \frac{s}{2}$$

$$\sim \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow$$

$$\sim \frac{\pi^2}{3} + \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{2} \Leftrightarrow$$

حلول المعادلة $\operatorname{ظل} \frac{s}{2} = \sqrt[3]{v}$ هي الأعداد الحقيقية s حيث

$$\sim \frac{\pi^2}{3} + \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{2} \Leftrightarrow$$

(3) نعتبر المعادلة $\operatorname{ظل} 2s = \operatorname{ظل} s$

$$\left(-\frac{\pi}{2} - s \right)$$

$$\operatorname{ظل} 2s = \operatorname{ظل} s \Leftrightarrow \operatorname{ظل} 2s = \operatorname{ظل} \left(-\frac{\pi}{2} - s \right)$$

$$\sim -s + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow$$

$$s + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow$$

$$s = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow$$

حلول المعادلة $\operatorname{ظل} 2s = \operatorname{ظل} s$ هي الأعداد الحقيقية s

$$s = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow$$

تمارين

الزوايا الهندسية :

1. الأقياس α ، β ، γ لزوايا مثلث متناسبة ، على الترتيب ، مع الأعداد
1 ، 2 ، 3 .

(1) أحسب هذه الأقياس بالدرجات وبالغرادات وبالراديانات

(2) ما هي طبيعة هذا المثلث ؟

2. نفس الأسئلة إذا كانت α ، β ، γ متناسبة ، على الترتيب ، مع الأعداد
1 ، 2 ، 3 .

3. نفس الأسئلة إذا كانت α ، β ، γ متناسبة ، على الترتيب ، مع الأعداد
1 ، 2 ، 2 .

4. أحسب ، بالراديانات ، ثم بالغرادات ، أقياس الزوايا التي أقياسها : 10° ،
 18° ، 53° ، 1° ، 135° ، 200° .

5. أحسب ، بالدرجات ، ثم بالغرادات ، أقياس الزوايا التي أقياسها :

$$\frac{\pi}{5} \text{ رد} ; \frac{3\pi}{8} \text{ رد} ; \frac{5\pi}{4} \text{ رد} ; \frac{3\pi}{5} \text{ رد} ; \frac{2\pi}{5} \text{ رد} ; \frac{\pi}{5} \text{ رد} .$$

6. 1) عبر ، بالدرجات وبالغرادات ، عن الأقياس :

$$\frac{\pi}{20} \text{ رد} ; \frac{7\pi}{5} \text{ رد} ; 0,3 \text{ رد} ; 15,8 \text{ رد} .$$

2) حول إلى الدرجات والراديانات الأقياس :

$$150 \text{ غر} ; 25 \text{ غر} ; 47,8 \text{ غر} ; 1230 \text{ غر}$$

3) حول إلى الرadianes والغرادات الأقياس :

$${}^{\circ}702 ; {}^{\circ}345 ; {}^{\circ}15$$

$${}^{\circ}36$$

7. أحسب ، بالراديانات وبالغرادات وبالدرجات الزاوية المخصوصة بين عقربي ساعة عندما تشير هذه الساعة إلى :

- الساعة 12 و 30 د
- الساعة 1 و 20 د
- الساعة 2 و 55 د

8. أب ح مثلث حيث : $\widehat{BAC} = 35^\circ$ و $\widehat{ABC} = 80^\circ$.

أحسب \widehat{BCA} و قيس زاوية المنصفين للزواياتين

$[BA]$ ، $[CA]$ و $[CB]$.

9. أب ح مثلث . ه نقطة تقاطع أعمدته .

أحسب \widehat{BCH} بدلالة \widehat{BAC} .

10. قيس قوس دائرة هو 50° وطول هذه القوس 3π سم .

ما هو نصف قطر هذه الدائرة ؟

11. دائرة (د) نصف قطرها 2 سم . أ و ب نقطتان من (د) .

إذا كان طول القوس \widehat{AB} يساوي 1 سم ، ما هو طول القوس \widehat{AC} ؟

12. دائرة (د) طولها 24 سم . أ و ب نقطتان من (د) حيث طول القوس \widehat{AB}

يساوي 9 سم .

ما هو قيس هذه القوس بالراديانات وبالدرجات ؟

13. لولب خطوطه 2 م (أي عندما يدور هذا اللولب دورة كاملة ، ينجز بعمق

قدره 2 م) .

1) ينجز هذا اللولب إذا دار بزاوية قدرها 63900° ؟

2) ما هي الزاوية التي يدورها هذا اللولب إذا انجز بعمق قدره 23 م ؟

الأقواس الموجهة :

14. أب ح مثلث متواليس الأضلاع و (د) دائرة موجهة محیطة به . الاتجاه

الموجب على (د) هو الاتجاه من أ نحو ب .

عين قيسا مقدراً بالراديانات لكل من القوسين \widehat{AB} و \widehat{AC} .

15. أبحد مربع و (د) دائرة موجهة محيطة به :

الاتجاه السالب على (د) هو الاتجاه من نحو . عين قياساً مقدراً بالراديانات لكل واحدة من الأقواس أب، أه، أه.

16. (د) دائرة موجهة و د نقطة من (د).

عين النقط أ، ب، ح، ك، ل، م، ه من الدائرة (د) بحيث تكون

الأعداد $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{2}$ أقياساً، على

الترتيب للأقواس دأ، دب، دح، دك، دل، دم، ده.

ما هي النقط المقابلة قطرياً؟


17. أبحد كل م د هو مصلع منتظم و (د) دائرة موجهة محيطة به

(الشكل).

عين قياساً مقدراً بالراديانات لكل

قوس من الأقواس التالية :

أه، أك، بـهـ، دـهـ، دـكـ،
لـكـ:



18. عين الأقياس الرئيسية للأقواس الموجهة التي أقياسها هي : 637° , 4857° , $\frac{\pi}{7}$, $\frac{227}{6}$, $\frac{239}{7}$

19. عين الأقياس الرئيسية للأقواس الموجهة التي أقياسها هي : $\frac{\pi}{2}$, $\frac{15}{2}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{125}{2}$, $\frac{128\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{172}{3}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{57}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{11}{6}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{10}{3}$, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5}{2}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{110}{4}$, $\frac{167}{5}$, $\frac{28}{3}$.

$$\frac{\pi}{2}, \frac{15}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{125}{2}, \frac{128\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{172}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{57}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{11}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{10}{3}, \frac{\pi}{6}, \frac{5}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{110}{4}, \frac{167}{5}, \frac{28}{3}$$

$$\frac{\pi}{2}, \frac{15}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{125}{2}, \frac{128\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{172}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{57}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{11}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{10}{3}, \frac{\pi}{6}, \frac{5}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{110}{4}, \frac{167}{5}, \frac{28}{3}$$

20. القيس الرئيسي لقوس موجهة هو 2 رد.

(1) أثبت أنه يوجد قيس وحيد α لهذه القوس حيث

$$[\pi^2 + 49] \ni \alpha$$

(2) أثبت أنه يوجد قيس وحيد β لهذه القوس حيث

$$[\pi^2 + 39] \ni \beta$$

21. ب، ح ثلث نقط من دائرة موجهة ؛ α و β قيسان للقوسين $\overset{\curvearrowleft}{AB}$ و $\overset{\curvearrowright}{CD}$ على الترتيب ..

عُين قيس القوس $\overset{\curvearrowleft}{AB}$ الذي يتسمى إلى المجال $[0, 2\pi]$ في كل حالة من الحالات التالية :

$$\frac{\pi 5}{6} = \beta \text{ و } \frac{\pi 4}{3} = \alpha$$

$$\frac{\pi 3}{2} = \beta \text{ و } \frac{\pi 3}{4} = \alpha$$

$$\frac{\pi 3}{4} = \beta \text{ و } \frac{\pi 2}{3} = \alpha$$

$$\frac{\pi 7}{4} = \beta \text{ و } \frac{\pi 50}{3} = \alpha$$

22. (د) دائرة موجهة نصف قطرها 4 سم .

$\overset{\curvearrowleft}{AB}$ ، $\overset{\curvearrowright}{CD}$ ثلث نقط من (د) بحيث يكون العددان $\frac{\pi 2}{3}$

و $\left(\frac{\pi}{3} - \text{قيسين} \right)$ على الترتيب ، للقوسين $\overset{\curvearrowleft}{AB}$ و $\overset{\curvearrowright}{CD}$.

1) عُين القيس الرئيسي للقوس $\overset{\curvearrowright}{CD}$.

2) أحسب طولي القوسين $\overset{\curvearrowleft}{AB}$ و $\overset{\curvearrowright}{CD}$.

23. (٦) دائرة مثلثية و ا نقطة منها .

عَيْنُ النقطتين \hat{c} و \hat{d} بحسب ي يكون العددان 1560 و (-2025) قيسين ، بالدرجات ، للقوسین \hat{a} و \hat{b} ، على الترتيب .
أحسب ، بالرadianات ، القيس الرئيسي للقوس \hat{c} .

24. (٦) دائرة مثلثية نصف قطرها 5 سم .
تحرك نقطة \hat{c} على الدائرة (٦) ، في الاتجاه الموجب ، منطلقة من ا ومستقرة عند ب .

عَيْنُ القيس الرئيسي للقوس \hat{a} ب إذا قطعت النقطة \hat{c} مسافة قدرها 12 سم .

الزوايا الموجهة لنصف مستقيمين :

25. [م س] نصف مستقيم من المستوى الموجه .

(1) ارسم أنصاف المستقيمات [م ع] ؛ [م ص] ؛ [م ف] بحسب ي يكون :

$$\frac{\pi}{6} = \overline{(م س، م ص)} ; \quad \frac{\pi}{4} = \overline{(م س، م ع)}$$

$$\frac{\pi}{6} = \overline{(م س، م ف)}$$

(2) أحسب القيس الرئيسي لكل من الزوايا التالية :

(م ع ، م ص) ؛ (م ص ، م ف) ؛ (م ف ، م ع)

26. نفس الترين علماً أن : $\frac{\pi}{3} = \overline{(م س، م ع)}$ ؛

$$\frac{\pi}{3} = \overline{(م س، م ص)} ; \quad \frac{\pi}{4} = \overline{(م س، م ف)}$$

27. (س' س) و (ع' ع) مستقيمان متقاطعان في النقطة م .

(1) أحسب $\overline{(م س، م ع)} + \overline{(م ع، م س')}$

و $\overline{(م ع، م س')} + \overline{(م س، م ع)}$

(2) استنتج المساواة :

$$\overline{(م س، م ع)} = \overline{(م س، م ع)} + 2\pi k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

28. [م س) محور قطبي لل المستوى الموجه .
 [م صه) و [م صه') نصفاً مستقيمين ، θ و θ' زاوياهما القطبيتان ، على الترتيب ، بالنسبة إلى [م س) .
 [مع) و [مع') نصفاً مستقيمين حيث :
 $(م ص ، مع) = (مع ، مع') = (مع' ، م ص')$
 أحسب أقياس الزوايا القطبية لنصف المستقيمين [مع) ، [مع') بالنسبة إلى [م س) .

- الزوايا الموجهة لشعاعين :
 29. أب ح د مربع حيث $(أب ، أد) = \frac{\pi}{2}$.
 [م س) محور قطبي لل المستوى الموجه و α قيس الزاوية القطبية لنصف المستقيم [أب) .
 أحسب أقياس الزوايا القطبية لأنصاف المستقيمات [س ح) ، [ح د) ، [د أ) بالنسبة إلى [م س) .

30. أب ح مثلث .
 (1) أحسب $m = (أب ، أح) + (اح ، حب) + (بـ ح ، بـ أ)$
 (2) أثبت أن :

$$(سـ ح ، سـ أ) = (أب ، سـ أ) + (بـ ح ، سـ أ) = (بـ ح ، سـ أ) + 2\pi$$

 (ك م صه)
 31. ارسم المثلث أب ح علماً أن :

$$\frac{\pi}{3} = \overbrace{(أب ، أح)}^{\pi} ; \quad \frac{\pi}{4} = \overbrace{(اح ، حب)}^{\pi} ; \quad \frac{\pi}{8} = \overbrace{(بـ ح ، سـ أ)}^{\pi}$$

أحسب $(بـ ح ، سـ أ)$.

تأكد من هذه النتيجة باستعمال الشكل .

32. أب ح مثلث متساوي الساقين حيث $أب = أـ ح$
 أحسب $(حـ أ ، حـ ب)$ بدلاة $(أـ ب ، أـ ح)$
 تطبيق : ارسم المثلث أب ح علماً أن :

$$\frac{\pi^2}{3} = \overbrace{(أـ ب ، أـ ح)}^{\pi} = 6 \text{ سم} ; \quad أـ ب = أـ ح ; \quad سـ ح = 6 \text{ سم} ;$$

33. أ ب ح مثلث ؛ و نقطة من القطعة [ب ح] حيث :

$$\cdot \frac{\pi}{4} = \overbrace{ب د}^{\alpha} + \overbrace{و د}^{\beta} = (\overbrace{ب ح}^{\gamma}, \overbrace{ب د}^{\alpha})$$

أحسب (أ ب ، أ ح) و (ح د ، د ب).

34. أ ب ح مثلث من المستوى الموجه حيث :

$$\cdot \frac{\pi}{4}^3 = \overbrace{ب د}^{\alpha} + \overbrace{ب ح}^{\beta} = (\overbrace{ب د}^{\gamma}, \overbrace{ب ح}^{\alpha})$$

د نقطة من المستوى . نضع : د ح = γ و (د ح ، د ب) = θ .
عَيْنَ γ و θ لكي يكون الرباعي أ ب د ح متوازي أضلاع .
هل يمكن أن يكون الرباعي أ ب د ح معينا ؟

الروايا الموجهة لمستقيمين :

35. (ق) و (Δ) مستقيمان من المستوى الموجه .

(ق') و (Δ') مستقيمان عموديان ، على الترتيب على (ق) و (Δ) .

$$\text{أثبت أن : } (ق' ، \Delta') = (ق ، \Delta) + \pi \text{ ك (ك} \in \text{صـ)}$$

36. (γ) و (γ') دائرتان مركزاهما م و م' على الترتيب ، متقطعتان في النقطتين
أ ، ب .

(Δ) الماس للدائرة (γ) في أ ، (Δ') الماس للدائرة (γ') في أ' .

$$\text{أثبت أن : } (Δ' ، Δ') = (Δ ، Δ') + \pi \text{ ك (ك} \in \text{صـ)}$$

37. أ ب ح مثلث قائم في أ ؛ ه المسقط العمودي للنقطة أ على (ب ح)

$$\text{أثبت أن : } (أ ه ، أ ب) = (ح ب ، ح د) + \pi \text{ ك (ك} \in \text{صـ)}$$

العلاقات المثلية الأساسية :

38. س عدد حقيقي ، أثبت أن

$$(1) \text{ جب س} + \text{تجب س} = 2 + 1 = 2 \text{ جب س} - \text{تجب س}$$

$$(2) \text{ جب س} - \text{تجب س} = 2 - 1 = 2 \text{ جب س} - \text{تجب س}$$

$$(3) \text{ جب س} + \text{تجب س} = (\text{جب س} - \text{تجب س})^2$$

$$(4) \text{ جب}^4 \text{ س} - \text{تجب}^4 \text{ س} = \text{جب}^2 \text{ س} - \text{تجب}^2 \text{ س}$$

39. س عدد حقيقي ، بسط ما يلي :

$$1) \text{ظل } s \text{ تجب } s$$

$$2) \text{جب } s^3 + \text{جب } s \text{ تجب } s^2$$

$$3) 1 - \frac{1}{\text{تجب } s^2}$$

$$4) \text{جب } s^4 - \text{تجب } s^4$$

40. س عدد حقيقي ، أثبتت أن :

$$1) \frac{1}{\text{تجب } s^2} = \frac{\text{جب } s^2}{s} + 1$$

$$2) \frac{1}{\text{جب } s^2} = \frac{\text{تجب } s^2}{s} + 1$$

$$3) \frac{\text{جب } s - \text{تجب } s}{\text{جب } s + \text{تجب } s} = \frac{s - 1}{s + 1}$$

$$4) \frac{\text{جب } s - \text{تجب } s}{\text{تجب } s + \text{جب } s} = \frac{s - 1}{s + 1}$$

41. أحسب تجب س و جب س إذا كان $s > 0$ و ظل س = $\frac{\pi}{2}$

42. أحسب تجب س و جب س إذا كان $s > \pi$ و ظل س = $\frac{3}{2}\pi$

43. أحسب جب س و ظل س على أن $s > 0$ و تجب س = $0,3 - \frac{2}{\pi}$

44. أحسب تجب س و ظل س إذا كان $s > 2\pi$ و جب س = $-0,6$

45. أثبتت أن : $(1 + \text{ظل } s^2)^2 = 1 + \text{ظل } s^4 \Leftrightarrow (\text{تجب } s^2 = \text{تجب } s^4)$

46. س عدد حقيقي حيث $s > 0$

$$1) \text{أثبتت أن } \text{تجب } s^2 = \frac{1}{1 + \text{ظل } s^2}$$

2) أحسب جب س و تجب س على أن ظل س = 1,5

48. س و ع قيسان ، بالراديان ، لزاویتين

$$\begin{aligned} \text{تجب } s + \text{تجب } u &= 1 \\ \left(\frac{\pi}{2} = s + u \right) \quad \text{و} \\ \text{جب } s + \text{جب } u &= 1 \end{aligned}$$

أثبت أن : $(s + u = \pi)$

$$\begin{aligned} \text{تجب } s + \text{تجب } u &= 1 \\ \left(\frac{\pi}{2} = s + u \right) \quad \text{و} \\ \text{جب } s + \text{جب } u &= 1 \end{aligned}$$

أثبت أن : $(s + u = \pi)$

نسمى لك المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم (BH)

ول المسقط العمودي للنقطة B على المستقيم (AK)

أثبت أن : $\widehat{AK} = \widehat{BL}$

2) نضع $AH = BL$.

$$x \text{ قيس . بالراديان للزاوية } [AH, AK] \text{ حيث } x = \left[\frac{\pi}{4}, 0 \right]$$

أثبت أن : $BH = 2 \cdot BL$ جب x ؛ $BL = 2 \cdot BH$ جب x ؛
أثبت أن :

$$\text{جب } 2x = \text{جب } x$$

51. (د) دائرة مركزها M ونصف قطرها r

A و B نقطتان متقابلتان قطريا في الدائرة (د) و C نقطة من (د) تختلف عن

A و B

x قيس ، بالراديان ، لزاوية $[AC, AB]$

1) أحسب المسافتين CA و CB بدلالة x و r

2) نسمى D نقطة تقاطع المستقيم (د) و الماس في النقطة B للدائرة (د)

أحسب المسافات CD ، CA ، CB ، CD بدلالة x و r

3) أدرس الحالات الخاصة التالية :

$$\frac{\pi}{3} = x \cdot \frac{\pi}{4} = x \cdot \frac{\pi}{6} = x$$

52. أ) حاصل مثلث قائم في الزاوية α و $\angle A = 60^\circ$

1) أحسب $\angle B$ ، بالدرجات

2) B' هي نظيرة النقطة B بالنسبة إلى النقطة A

ما هي طبيعة المثلث $AB'B$ ؟

3) نضع $B = \text{ط}$ ، $A = \text{ك}$ ، $A' = \text{ل}$

• أحسب A و A' بدلالة ط

• أحسب A و B بدلالة ك

• أحسب A و B بدلالة ل

53. أ) حاصل مثلث متساوي الساقين حيث $A = B$

α المسقط العمودي للنقطة A على $(B\text{--}C)$ و B' المسقط العمودي للنقطة B

على $(A\text{--}C)$

نضع : $A = \text{ط}$ و $B = \text{ك}$

1) أحسب الأطوال $B\text{--}C$ ، $B\text{--}B'$ ، $A\text{--}B'$ ، $B\text{--}B'$ بدلالة

العددين ط و α

2) بالتعبير عن الطول $B\text{--}C$ بطريقتين مختلفتين

أثبت أن : $\text{جب } 2\alpha = \text{جب } \alpha \text{ تجب } \alpha$

3) بالتعبير عن الطول $A\text{--}B'$ بطريقتين مختلفتين

أثبت أن : $\text{تبجب } 2\alpha - 1 = \text{تبجب } 2\alpha^2 - \text{جب } \alpha^2$

و $\text{تبجب } 2\alpha = \text{تبجب } \alpha^2 - \text{جب } \alpha^2$

54. عَبَرْ عن الأعداد الحقيقة التالية بواسطة جب س ، تجب س ، ظل س ،

تظل س

$$1) \text{ تجب } \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi^3}{2} \right) \quad 7) \text{ جب } \left(\frac{\pi^5}{2} - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$2) \text{ تجب } \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi^7}{2} \right) \quad 8) \text{ جب } \left(\frac{\pi^5}{2} + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$3) \text{ تجب } \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi^7}{2} \right) \quad 9) \text{ ظل } \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi^5}{2} \right)$$

$$\left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) \text{ظل}$$

$$\left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) \text{تجيب}$$

$$\left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) \text{ظل}$$

$$\left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) \text{جب}$$

$$\left(\pi - \alpha \right) \text{ظل}$$

$$\left(\pi - \alpha \right) \text{جب}$$

55. α عدد حقيقي . أحسب الجاميع التالية :

$$(\pi - \alpha) + (\pi + \alpha) + (\pi - \alpha) + (\pi + \alpha) + (\pi - \alpha)$$

$$(\alpha + \pi) + (\alpha - \pi) + (\alpha + \frac{\pi}{2})$$

$$(\alpha + \pi) + (\alpha - \frac{\pi}{2}) + (\alpha + \frac{\pi}{2})$$

$$\left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) + \text{ظل}(\alpha - \pi) + \text{ظل}(\pi + \alpha) + \text{ظل}(\alpha - \pi) - (\alpha - \pi)$$

$$\left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) + \text{ظل}(\frac{\pi}{2} + \alpha) + \text{ظل}(\frac{\pi}{2} - \alpha) + \text{ظل}(\alpha - \frac{\pi}{2})$$

56. س عدد حقيقي ، بسط الجاميع التالية :

$$1 + 2 \text{تجيب}^2(-\alpha) + \text{تجيب}(-\alpha)$$

$$3 + \text{جب}^2(\pi - \alpha) - 2 \text{جب}(\pi - \alpha) - \text{جب} \alpha$$

$$\text{جب} \alpha - \text{تجيب} \alpha = \left(\alpha - \frac{\pi}{2} \right)^3 + \text{تجيب} \alpha$$

$$\left[\left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right)^2 \right] \text{جب} + \left[\left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right)^2 \right] \text{تجيب}$$

المعادلات المثلثية الأساسية :

57. حل ، في ح ، المعادلات التالية : \times

$$1) \frac{2\sqrt{}}{2} - \cos = \text{تجب}$$

$$2) 0 = \frac{1}{2} + \left(\frac{\pi}{4} - \cos 2 \right) \text{تجب}$$

$$3) 0 = 1 + \cos^2 \text{تجب}$$

$$4) 0 = 1 - \cos^2 \text{تجب}$$

$$5) 1 = \left(\frac{\pi}{3} - \cos 3 \right) \text{تجب}$$

$$6) \frac{\pi}{4} - \cos 2 = \cos \text{تجب}$$

$$7) 1 = \cos^2 \text{تجب}$$

$$8) 0 = 1 + \cos 2 \text{تجب}$$

$$9) \cos 3 = \cos - \frac{\pi}{7} \text{تجب}$$

$$10) \cos 5 = \cos - \frac{\pi^2}{3} \text{تجب}$$

$$11) \left(\frac{\pi}{3} + \cos 2 \right) = \left(\frac{\pi}{4} - \cos 3 \right) \text{تجب}$$

58. حل ، في ح ، المعادلات التالية :

$$1) \frac{1}{2} = \cos \text{جب}$$

$$2) \frac{3\sqrt{}}{2} = \cos 5 \text{جب}$$

$$3) 0 = 3 + \cos^2 2 \text{جب}$$

$$4) 0 = 3 - \cos^2 2 \text{جب}$$

$$0 = 1 - \cos^2 s \quad (5)$$

$$1 = \cos 3s \quad (6)$$

$$0 = 2 + \cos 2s \quad (7)$$

$$\sqrt{3} = \left(\cos -\frac{\pi}{3} \right) \cos 2s \quad (8)$$

$$\left(\cos -\frac{\pi}{3} \right) \cos 2s = \cos 2s \quad (9)$$

$$\left(\frac{\pi}{4} + \cos s \right) \cos = \left(\frac{\pi}{3} + \cos s \right) \cos \quad (10)$$

$$\left(\cos -\frac{\pi^2}{3} \right) \cos = \left(\frac{\pi}{3} + \cos 2s \right) \cos \quad (11)$$

59. حل ، في ح ، المعادلات التالية :

$$\operatorname{tan} \frac{s}{6} = \operatorname{tan} 1 \quad (1)$$

$$1 = \operatorname{tan} s \quad (2)$$

$$0 = 3 - \cos^2 s \quad (3)$$

$$\sqrt{3} = \left(\frac{\pi}{4} - \cos 2s \right) \operatorname{tan} s \quad (4)$$

$$0 = \sqrt{3} + \left(\frac{\pi}{3} - \cos s \right) \operatorname{tan} s \quad (5)$$

$$\left(\cos 2 - \frac{\pi}{3} \right) \cos = \operatorname{tan} 3 \quad (6)$$

$$\left(\frac{\pi}{4} + \cos s \right) \cos = \operatorname{tan} 3 \quad (7)$$

$$\left(\frac{\pi}{5} + \frac{\cos s}{2} \right) \operatorname{tan} s = \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\cos s}{3} \right) \operatorname{tan} s \quad (8)$$

60. حل ، في ع ، المعادلات التالية :

$$1) 2 \operatorname{جب}^2 s - 3 \operatorname{جب} s + 1 = 0$$

$$2) 2 \operatorname{تجب}^2 s - 7 \operatorname{تجب} s + 3 = 0$$

$$3) 0 = \sqrt[3]{s} - 2 (\operatorname{جب} s - 1)$$

$$4) 0 = \sqrt[3]{s} + (1 + \sqrt[3]{s}) \operatorname{ظل} s$$

$$5) 2 \operatorname{تجب}^2 s - 3 \operatorname{تجب} 2 s + 1 = 0$$

61. حل ، في ع ، المعادلات التالية :

$$\pi/2 \geq s \geq 0 \quad \text{و} \quad \left(\frac{\pi}{6} - \operatorname{تجب} 2 \right) \text{تجب } 6 s = \left(\frac{\pi}{3} + \operatorname{تجب} 2 \right) \text{تجب } 6 s$$

$$2) \operatorname{جب} s = \operatorname{جب} \frac{\pi/3}{10} \quad \text{و} \quad \operatorname{تجب} s > 0$$

$$3) \operatorname{جب} 2 s = \operatorname{جب} \left(s/3 - \frac{\pi}{2} \right) \quad \text{و} \quad s > \pi/3$$

$$4) \operatorname{تجب} 2 s = -\operatorname{تجب} s \quad \text{و} \quad s \geq 0$$

الباب الثامن

الدوال العددية

28 - عموميات على الدوال العددية لتغيير حقيقي

29 - الدالة التالية

30 - الدالة $s \leftarrow a s^2 + b s + c$ ($a \neq 0$)

31 - الدالة $s \leftarrow \frac{1}{s}$ ($a \neq 0$)

لقد قدّمت في السنة السابقة بعض المفاهيم الأولى المتعلقة بالدوال العددية (مجموعة التعريف ، التغيرات ، التمثيل البياني لتطبيق تالي ...) في هذه السنة ، تعمّم هذه المفاهيم وتدعّم بثباتات تمكن التلاميذ من دراسة كاملة لدوال عددية أخرى : $s \leftarrow a s^2 + b s + c$

$$s \leftarrow \frac{1}{s} \quad (a \neq 0)$$

وتطبيقاً لما ورد في البرنامج فإن مفهومي النهاية والمستقيم المقارب قد تم استخراجهما انطلاقاً من أمثلة بسيطة .

عموميات على الدوال العددية لمتغير حقيقي

1 - الدوال العددية لمتغير حقيقي :

تعريف

تسمى كل دالة لمجموعه الأعداد الحقيقية \mathbb{H} في نفسها دالة عدديه لمتغير حقيقي

إذا كانت تا دالة عدديه للمتغير الحقيقي س فإن العنصر تا (s) يسمى صورة العنصر س بالدالة تا
العنصر س يسمى سابقة للعنصر تا (s)
مجموعه تعريف الدالة تا هي مجموعه عناصر المجموعه \mathbb{H} التي لها صورة في \mathbb{H}
بالدالة تا

أمثلة :

1) الدالة تا : $\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$

$$s \mapsto s^2$$

هي دالة عدديه للمتغير الحقيقي س
مجموعه تعريفها هي المجموعه \mathbb{H}
 $f_a = \mathbb{H} = [-\infty, +\infty]$

2) الدالة ها : $\mathbb{H} \leftarrow \mathbb{H}$

$$s \mapsto \frac{1}{s-1}$$

هي دالة عدديه للمتغير الحقيقي س

مجموعه تعريفها هي المجموعه \mathbb{H} باستثناء 1
 $f_a = \mathbb{H} = \{1\} \cup [1, +\infty)$

3) الدالة عا : $u \leftarrow s$

$$s \leftarrow \sqrt{2}$$

هي دالة عدديه للمتغير الحقيقي s

تكون هذه الدالة معرفة إذا و فقط إذا كان $2 - s \leq 0$

$$u = [2, \infty)$$

4) الدالة التي ترقى بكل عدد حقيقي s العدد الحقيقي تجب s هي دالة
عدديه للمتغير الحقيقي s وتسمى الدالة جيب تمام
تجب : $u \leftarrow s$

$$s \leftarrow \arcsin u$$

مجموعه تعريفها هي المجموعه u

5) الدالة التي ترقى بكل عدد حقيقي s العدد الحقيقي جب s هي دالة
عدديه للمتغير الحقيقي s و تسمى الدالة الجيب
جب : $u \leftarrow s$

$$s \leftarrow \arccos u$$

مجموعه تعريفها هي المجموعه u

6) الدالة التي ترقى بكل عدد حقيقي s العدد الحقيقي ظل s هي دالة
عدديه للمتغير الحقيقي s وتسمى الدالة الظل
ظل : $u \leftarrow s$

$$s \leftarrow \operatorname{atan} u$$

نعلم أن ظل s معرف إذا و فقط إذا كان $\operatorname{atan} s \neq 0$

$$\operatorname{atan} s = 0 \iff s = \frac{\pi}{2}$$

$$s = \frac{\pi}{2} + \pi k, (k \in \mathbb{Z}) \iff$$

إذن مجموعة تعريف الدالة الفعل هي المجموعة \cup باستثناء الأعداد الحقيقة

من الشكل $\frac{\pi}{2} + \pi k$ ، ($k \in \mathbb{Z}$)

2 - اتجاه تغير دالة على مجال

1.2 - تعريف :

لقد رأينا في السنة السابقة ما يلي :

إذا اعتبرنا ، مثلا ، الدالة T_a : $S \rightarrow S^2$

وأخذنا عددين كيفين s_1 و s_2 فإن العددين $T_a(s_1)$ و $T_a(s_2)$

مرتبان في نفس الترتيب بالنسبة لترتيب العددين s_1 و s_2 وقلنا إن الدالة

T_a متزايدة تماما على \cup .

وإذا اعتبرنا الدالة H : $S \rightarrow S^2$ وأخذنا عددين كيفين s_1 و s_2

فإن العددين $H(s_1)$ و $H(s_2)$ مرتبان في الترتيب العكسي بالنسبة

لترتيب العددين s_1 و s_2 وقلنا إن الدالة H متناقصة تماما على \cup

وبصورة عامة يمكن إعطاء التعريف التالية :

ـ تا دالة عددية معرفة على مجال L .

تعريف 1 :

ـ تكون تا متزايدة على L إذا وفقط إذا تحقق ما يلي

$\forall s_1 \in L, \forall s_2 \in L : s_1 < s_2 \Rightarrow T_a(s_1) < T_a(s_2)$

تعريف 2 :

ـ تكون تا متزايدة على L إذا وفقط إذا تحقق ما يلي

$\forall s_1 \in L, \forall s_2 \in L : s_1 > s_2 \Rightarrow T_a(s_1) \geq T_a(s_2)$

تعريف 3 :

ـ تكون تا متناقصة على L إذا وفقط إذا تتحقق ما يلي

$\forall s_1 \in L, \forall s_2 \in L : s_1 < s_2 \Rightarrow T_a(s_1) > T_a(s_2)$

-تعريف 4 :

تكون تا متناقصة على ل إذا و فقط إذا تحقق ما يلي
 $\forall s_1 \in L, \forall s_2 \in L : s_1 < s_2 \Leftrightarrow t(s_1) > t(s_2)$

-تعريف 5 :

تكون تا ثابتة على ل إذا و فقط إذا تتحقق ما يلي
 $\forall s_1 \in L, \forall s_2 \in L : t(s_1) = t(s_2)$

إذا كانت الدالة تا إما متناقصة وإما متزايدة على ل نقول إنها رتيبة على ل

أمثلة :

1) الدالة العددية تا : $s \rightarrow s^2$ متزايدة تماماً على المجال $[0, +\infty]$

لأن : $0 \leq s_1 < s_2 \Rightarrow s_1^2 < s_2^2$

2) الدالة العددية تا : $s \rightarrow s^2$ متناقصة تماماً على المجال $[-\infty, 0]$


لأن : $s_1 < s_2 \leq 0 \Rightarrow s_1^2 > s_2^2$

3) نعتبر الدالتين العدديتين

$$s \rightarrow \cos s$$

$$s \rightarrow \sin s$$

باستعمال الدائرة المثلثية نلاحظ



أنه إذا كان : $0 \geq s_1 > s_2 \geq -\frac{\pi}{2}$ فإن $\cos s_1 > \cos s_2$

وإذا كان : $0 \geq s_1 > s_2 \geq -\frac{\pi}{2}$ فإن $\sin s_1 < \sin s_2$

الدالة الجيب متزايدة تماماً على $[0, \frac{\pi}{2}]$ والدالة الجيب تمام متناقصة تماماً

على $[\frac{\pi}{2}, 0]$

2.2 - نسبة تزايد دالة

إذا كانت دالة عدديّة f متزايدة على مجال L فإن النسبة $\frac{f(s_1) - f(s_2)}{s_1 - s_2}$ تكون موجبة منها يمكن العددان الحقيقيان المختلفان s_1 و s_2 وإذا كانت f متناقصة على L فإن النسبة $\frac{f(s_1) - f(s_2)}{s_1 - s_2}$ تكون سالبة منها يمكن العددان الحقيقيان المختلفان s_1 و s_2

تعريف :

تسمى النسبة $\frac{f(s_1) - f(s_2)}{s_1 - s_2}$ نسبة تزايد الدالة f بين العددين الحقيقيين المختلفين s_1 و s_2

من هذا التعريف ومن التعاريف السابقة نستنتج ما يلي

- f متزايدة تماماً على $L \iff \forall s_1 \in L, \forall s_2 \in L (s_1 \neq s_2 \Rightarrow f(s_1) < f(s_2))$

$$f(s_1) - f(s_2) < 0$$

$$\frac{s_1 - s_2}{s_1 - s_2} < 0$$

- f متزايدة على $L \iff \forall s_1 \in L, \forall s_2 \in L (s_1 \neq s_2 \Rightarrow f(s_1) \leq f(s_2))$

$$f(s_1) - f(s_2) \leq 0$$

$$\frac{s_1 - s_2}{s_1 - s_2} \leq 0$$

- f متناقصة تماماً على $L \iff \forall s_1 \in L, \forall s_2 \in L (s_1 \neq s_2 \Rightarrow f(s_1) > f(s_2))$

$$f(s_1) - f(s_2) > 0$$

$$\frac{s_1 - s_2}{s_1 - s_2} > 0$$

• تا متناقصة على ل $\Leftrightarrow \forall s_1 \in L, \forall s_2 \in L (s_1 \neq s_2 \Rightarrow t(s_1) - t(s_2) > 0)$

$$s_1 - s_2$$

• تا ثابتة على ل $\Leftrightarrow \forall s_1 \in L, \forall s_2 \in L (s_1 \neq s_2 \Rightarrow t(s_1) = t(s_2))$

$$t(s_1) - t(s_2) = 0$$

3.2 - جدول تغيرات دالة

إن دراسة تغيرات دالة تا تعني تعين المجالات من مجموعة تعريفها التي تكون فيها تا متزايدة وال المجالات التي تكون فيها تا متناقصة تسجل نتائج هذه الدراسة في جدول يسمى جدول تغيرات تا إذا كانت تا متزايدة على المجال [أ، ب] نرسم الجدول التالي

s_1	$t(s_1)$
s_2	$t(s_2)$

و إذا كانت متناقصة على المجال [أ، ب] نرسم الجدول التالي :

s_1	$t(s_1)$
s_2	$t(s_2)$

3 - التمثيل البياني للدالة

المستوي منسوب إلى معلم (m, w, i)

1.3 - تعريف :

تا دالة عددية معرفة على المجموعة ف

التمثيل البياني (ي) للدالة تا في المعلم (m, w, i) هو مجموعة النقاط (s, u) من المستوي بحيث يكون :

$$s \in F \text{ و } u = t(s)$$


المجموعة (ى) تسمى أيضا المنحني الممثل للدالة تا
المعادلة $u = ta(s)$ تسمى معادلة المنحني (ى)

مثال :

المنحني الممثل للدالة تا : $s \leftrightarrow 2s + 1$
هو مجموعة النقط $\{(s, u) \mid u = 2s + 1\}$ من المستوى بحيث يكون

$$u = 2s + 1$$

ونعلم أن $u = 2s + 1$ هي معادلة مستقيم (Δ)



2.3 - العناصر التي تساعد على رسم المنحنيات

- الدوال الزوجية

تا دالة عدديه معرفة على المجموعة U من W

تكون الدالة تا زوجية إذا وفقط إذا تحقق ما يلي
 $\forall s \in W : -s \in W \text{ و } ta(-s) = ta(s)$

أمثلة :

1) الدالة العددية $s \leftrightarrow s^2$ زوجية لأنها :

$$\forall s \in U : -s \in U \text{ و } (-s)^2 = s^2.$$

2) الدالة العددية $s \leftrightarrow \frac{1}{|s|}$ زوجية لأنها :

$$\forall s \in W : -s \in W \text{ و } \left| -\frac{1}{s} \right| = \left| \frac{1}{s} \right|.$$


3) الدالة العددية $s \rightarrow \text{تحب } s$ زوجية لأنه
 $\forall s \in \mathbb{R} : -s \in \mathbb{R}$ و $\text{تحب } (-s) = \text{تحب } s$

إذا كانت الدالة تا زوجية وكان

(ي) تمثلها البياني في المعلم المتعامد
 (m, o, i) فإن النقطتين

$(s, \text{تا}(s))$ و

$(-s, \text{تا}(-s))$ لها



فاصلتان متساكن وترتيبان متساويان ، فهما متناظرتان بالنسبة إلى محور التراتيب

محور التراتيب هو محور تناظر للمنحنى (ي)

• الدوال الفردية :

تا دالة عددية معرفة على المجموعة F من \mathbb{R}

تكون الدالة تا فردية إذا وفقط إذا تحقق ما يلي
 $\forall s \in F : -s \in F$ و $\text{تا}(-s) = -\text{تا}(s)$


أمثلة :

1) الدالة العددية $s \rightarrow \frac{2}{s}$ فردية لأن :

$\forall s \in \mathbb{R}^* : -s \in \mathbb{R}^*$ و $\frac{2}{-s} = -\frac{2}{s}$

2) الدالة العددية $s \rightarrow$ جب س فردية لأن :
 $\forall s \in \mathbb{R} : -s \in \mathbb{R}$ و $\text{جب } (-s) = -\text{جب } s$

3) الدالة العددية $s \rightarrow s^3$ فردية لأن :
 $\forall s \in \mathbb{R} : -s \in \mathbb{R}$ و $(-s)^3 = -s^3$



إذا كانت الدالة ta فردية وكان
 (y) تمثيلها البياني في المعلم
 (m, o, y) فإن النقطتين

$$m(s, ta(s))$$

$m(-s, ta(-s))$ لها فاصلتان متعاكستان وترتيبان
 $(-s, m)$ و (m, s)

متعاكستان فيها متناظرتان بالنسبة إلى النقطة m

المبدأ m هو مركز تنازير للمنحنى (y)

دورية دالة :

تا دالة عددية معرفة على المجموعة F من \mathbb{R}
 $\forall s \in F$ عدد حقيقي موجب غير معدوم

يكون العدد ω دوراً للدالة ta إذا وفقط إذا تحقق ما يلي
 $\forall s \in F : (s + \omega) \in F$, $(s - \omega) \in F$
 $\text{و } ta(s + \omega) = ta(s)$

أمثلة :

1) العدد 2π هو دور لكل من الدالتين

$s \leftrightarrow \text{جب } s$ و $s \leftrightarrow \text{تجب } s$

لأنه منها يمكن العدد الحقيقي s لدينا

$(s+2\pi) \in \mathbb{Q}$, $(s-2\pi) \in \mathbb{Q}$

و جب $(s+2\pi)$ =جب s و تجب $(s+2\pi)$ =تجب s

2) العدد π هو دور للدالة $s \leftrightarrow \text{ظل } s$

لأنه منها يمكن العدد الحقيقي s من مجموعة تعريفها F لدينا :

$(s+\pi) \in F$. $(s-\pi) \in F$ و $\text{ظل } (s+\pi) = \text{ظل } s$

ملاحظتان :

- إذا كان ω دوراً للدالة T فمن الواضح أن :

$\forall s \in F : T(s+2\omega) = T(s)$ ،

$T(s+3\omega) = T(s)$ ، $T(s-\omega) = T(s)$

وبصورة عامة يمكن التأكيد من النتيجة التالية :


$\forall s \in F ; \forall k \in \mathbb{Z} : T(s+k\omega) = T(s)$

• إذا كان ω دوراً للدالة T و (y) تمثيلها البياني فإن كل نقط

(y) التي فواصلها من الشكل $s+k\omega$. ($k \in \mathbb{Z}$)

لها نفس الترتيب $T(s)$ ولرسم المنحني (y) يكفي رسمه في مجال

طوله ω ثم إتمامه باستعمال الخاصية السابقة .



1 - تعريف :

نسمى دالة تألفية كل دالة عددية تا للمتغير الحقيقي س المعرفة كـ
يلي :

$$\text{تا}(س) = اس + ب \quad \text{حيث } ا \text{ و } ب \text{ عدادان حقيقيان}$$

- إذا كان ب معدوماً نقول إن الدالة تا خطية

- إذا كان ا معدوماً تكون الدالة تا ثابتة

أمثلة :

$$1) \text{ الدالة : } س \longleftrightarrow 2س + 1 \text{ تألفية .}$$

$$2) \text{ الدالة : } س \longleftrightarrow 4س \text{ تألفية وهي خطية}$$

$$3) \text{ الدالة : } س \longleftrightarrow 5 \text{ تألفية وهي ثابتة}$$

$$4) \text{ الدالة : } س \longleftrightarrow س^2 + 1 \text{ ليست تألفية .}$$

2 - دراسة الدالة تا : $س \longleftrightarrow 4س$

- مجموعة التعريف : الدالة تا معرفة على ح .

- اتجاه التغير

مما يكـن العددان الحقيقيان المختلفان $س_1$ و $س_2$

لدينا :

$$\frac{\text{تا}(س_1) - \text{تا}(س_2)}{س_1 - س_2} = \frac{4س_1 - 4س_2}{س_1 - س_2} = 4$$

بما أن هذه النسبة موجبة تماماً فإن الدالة تا متزايدة تماماً على ح .

- دراسة الدالة تا من أجل القيم الكبيرة للعدد $|س|$:

الجدول التالي يعطي بعض القيم الكبيرة للعدد s وقيم $t_a(s)$ المناسبة لها.

s	$t_a(s)$
$^{4}10$	$^{3}10$
40000	4000
$^{2}10$	$^{2}10$
400	40
10	40

نلاحظ أن قيمة $t_a(s)$ تكون كبيرة أكثر فأكثر بقدر ما يكون s كبيراً.
والسؤال الذي يمكن طرحه هو : هل يمكن جعل $t_a(s)$ كبيرة بالقدر الذي نريده ؟

وبتعبير آخر : هل يمكن جعل $t_a(s)$ أكبر من أي عدد معلوم L ؟
لدينا :

$$t_a(s) > L \iff s > \frac{L}{4}$$

إذن للحصول على $t_a(s) > L$ يكفي أخذ $s > \frac{L}{4}$ (مثلاً لكي يكون

$$t_a(s) > 10^9 \text{ يكفي أخذ } s > \frac{1}{4} \cdot 10^9$$

ونعبر عن هذه الحالة بالقول :

إن $t_a(s)$ يؤول إلى ما لا نهاية عندما يؤول s إلى ما لا نهاية
ونكتب : $t_a(s) \leftarrow +\infty$ عندما $s \leftarrow +\infty$

ومن جهة أخرى نلاحظ ، في الجدول التالي :

s	$t_a(s)$
$^{4}10-$	$^{3}10-$
40000-	4000-
$^{2}10-$	$^{2}10-$
400-	40-

أن قيم $(-\infty)$ تكون كبيرة أكثر فأكثر بقدر ما يكون $(-\infty)$ ،
كبيراً. لكن ، هنا ، القول إن :

$(-\infty) \leftarrow + \infty$ عندما $(-\infty) \leftarrow + \infty$

نقول ، في هذه الحالة ، إن :

تا (∞) يقول إلى ناقص ما لا نهاية عندما يؤول ∞ إلى ناقص ما لا نهاية
ونكتب : تا $(\infty) \leftarrow - \infty$ عندما $\infty \leftarrow - \infty$

• جدول التغيرات :

نسجل في الجدول التالي نتائج الدراسة السابقة :


$\infty +$	$\infty -$	∞
$\infty +$	$\infty -$	س 4

• المثليل البياني : في المستوى المنسوب إلى المعلم (M, ω, i) المنحني
الممثل للدالة تا : $s \leftarrow 4$ س هو مجموعة النقط $\mathcal{C}(s, u)$ من
المستوي حيث :

$$s = u = 4$$

ونعلم أن $u = 4$ س هي معادلة مستقيم .

هذا المستقيم يشمل المبدأ M ومعامل توجيهه 4



3 - دراسة الدالة تا : $s \leftarrow -2s + 1$:

• مجموعة التعريف : الدالة تا معرفة على U .

• اتجاه التغير

مهمًا كان العددان الحقيقيان المختلفان s_1 و s_2
لدينا :

$$\frac{(1 + s_1) - ta(s_1) - (1 + s_2) - ta(s_2)}{s_1 - s_2} = \frac{2}{2} = \frac{s_1 - s_2}{s_1 - s_2}$$

بما أن هذه النسبة سالبة تماماً فإن الدالة ta متناقصة تماماً على s .

• دراسة الدالة ta من أجل القيم الكبيرة للعدد s |
المجدول التالي يعطي بعض القيم الكبيرة للعدد s وقيمة $ta(s)$ المناسبة
لها :

s	$ta(s)$
$^{+}10$	$^{+}10$
-19999	-1999
-1999	-199
-199	-19
-19	$-$

نلاحظ أن قيمة $(-ta(s))$ تكون كبيرة أكثر فأكثر بقدر ما يكون s كبيراً.

نفس السؤال الذي طرح في المثال السابق يمكن طرحه هنا :
هل يمكن جعل $(-ta(s))$ أكبر من أي عدد معلوم L ؟
لدينا :

$$-ta(s) > L \iff -2s - (1 + L) > L$$

$$\frac{s + \frac{1 + L}{2}}{2} < L \iff$$

إذن :

لكي يكون $(-ta(s)) > L$ يعني أخذ $s > \frac{-1 - L}{2}$ مثلاً

$$\left(\frac{1110 + 1}{2} \right) < تا(s) \text{ يكفي أنخذ } s <$$

ونعتبر عن هذه الحالة بالقول إن :
 تا(s) يؤول إلى ناقص ما لا نهاية عندما يقول s إلى ما لا نهاية
 ونكتب : تا(s) $\leftarrow -\infty$ عندما s $\rightarrow +\infty$

ومن جهة أخرى وبطريقة مماثلة نحصل على ما يلي :
 يؤول تا(s) إلى ما لا نهاية عندما يقول (-s) إلى ما لا نهاية .
 نقول في هذه الحالة إن :

تا(s) يؤول إلى ما لا نهاية عندما يقول s إلى ناقص ما لا نهاية
 ونكتب : تا(s) $\leftarrow +\infty$ عندما s $\rightarrow -\infty$

• جدول التغيرات :

نسجل في الجدول التالي نتائج الدراسة السابقة :

$\infty +$	$\infty -$	س
$\infty +$	$\infty -$	


• التمثيل البياني : في المستوى المنسوب إلى المعلم (م، و، ع) المنحني
 الممثل للدالة تا : $s \leftrightarrow -2s + 1$ هو المثلث للدالة تا :

هو مجموعة النقط $D(s, u)$ من المستوى حيث :

$$s = u - 2s + 1$$

ونعلم أن $u = -2s + 1$ هي معادلة مستقيم .

لرسم هذا المستقيم يكفي أنخذ نقطتين منه مثلاً النقطتين A(0, 1) و
 B(1, -1) .



٤ - دراسة الدالة التألفية تا : $s \rightarrow a s + b$

• مجموعة التعريف :

الدالة التألفية $s \rightarrow a s + b$ معرفة على \mathbb{C} .

• اتجاه التغير

مما كان العددان الحقيقيان المختلفان s_1 و s_2 لدينا :

$$\frac{\text{تا}(s_1) - \text{تا}(s_2)}{s_1 - s_2} = \frac{(as_1 + b) - (as_2 + b)}{s_1 - s_2} = \frac{a(s_1 - s_2)}{s_1 - s_2} =$$

نميز ثلاثة حالات :

إذا كان $a = 0$ تكون الدالة تا ثابتة على \mathbb{C} .

إذا كان $a > 0$ تكون الدالة تا متزايدة تماما على \mathbb{C} .

إذا كان $a < 0$ تكون الدالة تا منتفقة تماما على \mathbb{C} .

• دراسة الدالة تا من أجل القيم الكبيرة للعدد |s|

كما رأينا في المثالين السابقين يمكن التأكد من النتائج التالية :

1) إذا كان $a < 0$ فإن :

تا(s) $\leftarrow +\infty$ عندما $s \leftarrow +\infty$

تا(s) $\leftarrow -\infty$ عندما $s \leftarrow -\infty$

2) إذا كان $a > 0$ فإن :


تا(s) $\leftarrow -\infty$ عندما $s \leftarrow +\infty$

تا(s) $\leftarrow +\infty$ عندما $s \leftarrow -\infty$

• جدول التغيرات :

$\infty +$ $\infty -$	$0 > 1$ $\infty +$ $\infty -$	s $T(s)$
$\infty +$ $\infty -$	$0 < 1$ $\infty -$ $\infty +$	s $T(s)$

• التمثيل البياني : في المستوى المنسوب إلى المعلم (m , o , i) المنحني الممثل للدالة التألفية $s \rightarrow o s + b$ هو مجموعة النقط $\mathcal{C}(s, u)$ من المستوى حيث : $s \in \mathbb{R}$ و $u = o s + b$. ونعلم أن $u = o s + b$ هي معادلة مستقيم معامل توجيهه o .



- ملاحظات تتعلق بمعامل توجيه مستقيم :
- نذكر فيما يلي بعض النتائج المتعلقة بمعامل توجيه مستقيم :
 - معامل توجيه المستقيم الذي يشمل النقطتين $\mathcal{C}_1(s_1, u_1)$ و $\mathcal{C}_2(s_2, u_2)$ حيث $s_1 \neq s_2$ هو النسبة : $u_1 - u_2 / s_1 - s_2$
 - إذا كان o و o' معاملي توجيه المستقيمين (Δ) و (Δ') فإن : $o // o' \Leftrightarrow (\Delta) \perp (\Delta')$
 - إذا كان o و o' معاملي توجيه المستقيمين (Δ) و (Δ') وكان المعلم متعامداً ومتجانساً فإن : $o' = 1 - o \Leftrightarrow (\Delta) \perp (\Delta')$

30

الدالة $s \rightarrow s^2 + ms + h$ ($m \neq 0$)

1 - دراسة الدالة تا : $s \rightarrow s^2$:

• مجموعة التعريف :

الدالة تا معرفة على \mathbb{R} .

• اتجاه التغير :

مهما كان العددان الحقيقيان المختلفان s_1 و s_2 لدينا :

$$ta(s_1) - ta(s_2) = \frac{s_1^2 - s_2^2}{s_1 - s_2}$$

$$= (s_1 + s_2)(s_1 - s_2)$$

$$= s_1 - s_2$$

$$= s_1 + s_2$$

إذا كان $s_1 \leq 0$ و $s_2 \leq 0$ و $s_1 \neq s_2$ فإن : $s_1 + s_2 < 0$

و إذا كان $s_1 \geq 0$ و $s_2 \geq 0$ و $s_1 \neq s_2$ فإن : $s_1 + s_2 > 0$

إذن :

الدالة تا متناقصة تماماً على $[-\infty, 0]$ و متزايدة تماماً على $[0, +\infty]$.

لدينا :


$ta(0) = 0$ و $\forall s \in \mathbb{R} : ta(s) \leq ta(0)$

يسعى العدد $ta(0)$ القيمة الصغرى للدالة تا.

• دراسة الدالة تا من أجمل القيم الكبيرة المعنى | s | .

نلاحظ هنا : في بول التالي . أن قيم $ta(s)$ تكون كبيرة أكثر فأكثر بقدر

s كبيرة



لنفرض أن s موجب ولنبرهن أنه يمكن جعل $T(s)$ أكبر من أي عدد معلوم موجب L .

$$T(s) > L \iff s^2 > L$$

$$\iff s > \sqrt{L} \quad (\text{لأن } s \text{ موجب})$$

لكي يكون $T(s) > L$ يكفي أخذ $s > \sqrt{L}$ (مثلاً للحصول على $T(s) > 10^{12}$ يكفي أخذ $s > 10^6$).

نعبر عن هذه الحالة بالقول :

إن $T(s)$ يؤول إلى ما لا نهاية عندما يؤول s إلى ما لا نهاية ونكتب :

$$T(s) \leftarrow +\infty \quad \text{عندما } s \leftarrow +\infty$$

وبطريقة مماثلة نحصل على ما يلي :


يؤول $T(s)$ إلى ما لا نهاية عندما يؤول $(-s)$ إلى ما لا نهاية.

نقول ، في هذه الحالة إن :

$T(s)$ يؤول إلى ما لا نهاية عندما يؤول s إلى ناقص ما لا نهاية.

ونكتب :

$$T(s) \leftarrow +\infty \quad \text{عندما } s \leftarrow -\infty$$



المستوي منسوب إلى المعلم (m ، w ، i). .

المنحي الممثل للدالة $s \mapsto s^2$ هو مجموعة النقط $\{(s, u) \mid s \neq 0\}$ من

المستوي حيث $s \neq 0$ و $u = s^2$.


لرسم هذا المنحي ننشيء بعض النقط منه.

الجدول التالي يعطي إحداثيات هذه النقط

										س
3	2	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{3}{2}$
9	4	$\frac{9}{4}$	1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{9}{4}$	4	$\frac{9}{4}$

يسمى هذا المنحني قطعاً مكافئاً (الشكل 1)

نلاحظ أن هذا المنحني يشمل النقطة م وإذا أنشأنا عدة نقاط مجاورة للنقطة م نحصل على منحن له المظهر المبين في الشكل المجاور.



(الشكل 1)


من جهة أخرى نلاحظ أن الدالة تا زوجية :

$$تـا (س) = (س) \in ع$$

$$و تـا (س) = تـا (-س)$$

إذن ، في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد ، محور التراتيب هو محور تناظر للمنحني . (الشكل 2)

تسمى النقطة م ذروة القطع المكافيء



(الشكل 2)

٢ - دراسة الدالة تا : $s \rightarrow -2s^2 + 3$

• مجموعة التعريف
الدالة تا معرفة على ع .

• اتجاه التغير :

مهما يكن العددان الحقيقيان المختلفان s_1 و s_2 لدينا :

$$\frac{ta(s_1) - ta(s_2)}{s_1 - s_2} = \frac{(3 + 2s_1^2) - (3 + 2s_2^2)}{s_1 - s_2} = \frac{(s_1^2 - s_2^2)2}{s_1 - s_2} =$$

$$(s_1 + s_2)2 =$$

إذا كان $s_1 \leq 0$ و $s_2 \leq 0$ و $s_1 \neq s_2$ فإن :

$$-2(s_1 + s_2) > 0$$

إذا كان $s_1 \geq 0$ و $s_2 \geq 0$ و $s_1 \neq s_2$ فإن :

$$-2(s_1 + s_2) < 0$$

إذن :

الدالة تا متزايدة تماماً على $[-\infty, 0]$ ومتناقصة تماماً على $[0, +\infty]$ لدينا :



$$ta(0) = 3 \text{ و } \forall s \in \mathbb{R} : ta(s) - ta(0) = -2s^2$$

إذن : $\forall s \in \mathbb{R} : ta(s) \geq ta(0)$

يسمى العدد $ta(0)$ القيمة العظمى للدالة تا .

• دراسة الدالة تا من أجل القيم الكبيرة للعدد |s| .

نلاحظ ، في الجدولين التاليين




أن قيمة $(-f(x))$ تكون كبيرة أكثر فأكثر بقدر ما تكون قيمة $|f(x)|$ كبيرة.

كما رأينا في الأمثلة السابقة يمكن التأكد من النتيجة التالية :

$$f(x) \rightarrow \infty \text{ when } x \rightarrow \infty$$

$$f(x) \rightarrow -\infty \text{ when } x \rightarrow -\infty$$

• جدول التغيرات :




• التمثيل البياني :

المنحي (٢) الممثل للدالة : $y = -x^2 + 3$ هو مجموعة النقط


$\{(x, y) \mid y = -x^2 + 3\}$ حيث $y = -x^2 + 3$.

الجدول التالي يعطي إحداثيات بعض النقاط من (٢)



المنحي (٢) يسمى ، أيضاً ، قطعاً مكافئاً .

إذا رسمنا (٦) في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد نحصل على منحنٍ له المظهر المبين في الشكل التالي :



محور التراتيب هو محور تناظر (٦).

ذروة القطع المكافئ (٦)

هي النقطة د (٣ ، -٩)

$$3. \text{ دراسة الدالة تا : } s \mapsto \frac{1}{2}s^2 - 2s + 1$$

• مجموعة التعريف :

الدالة تا معرفة على ح.

• اتجاه الغير :

مهما يكن العددان الحقيقيان المختلفان s_1 و s_2 لدينا :

$$\frac{(1+s_1^2 - 2s_1) - (1+s_2^2 - 2s_2)}{s_1 - s_2} = \frac{\frac{1}{2}(s_1^2 - s_2^2)}{s_1 - s_2}$$

$$\frac{(s_1 - s_2)(s_1 + s_2 - 2)}{s_1 - s_2} =$$

$$\frac{\left[2 - (s_1 + s_2) \right] \frac{1}{2}}{s_1 - s_2} =$$

$$2 - (s_1 + s_2) \frac{1}{2} =$$

يمكن كتابة نسبة التزايد كما يلي :

$$\frac{1}{2} = \frac{\text{تا}(س_1) - \text{تا}(س_2)}{س_1 - س_2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{[(س_1 - 2) + (س_2 - 2)]}{(س_1 - س_2)}$$

إذا كان $س_1 \leq 2$ و $س_2 \leq 2$ و $س_1 \neq س_2$ فإن :

$$0 < \frac{[(س_1 - 2) + (س_2 - 2)]}{2}$$

إذا كان $س_1 \geq 2$ و $س_2 \geq 2$ و $س_1 \neq س_2$ فإن :

$$0 > \frac{[(س_1 - 2) + (س_2 - 2)]}{2}$$

إذن :

الدالة تا متناقصة تماماً على $[-\infty, 2]$ و متزايدة تماماً على $[2, +\infty]$

لدينا : $\text{تا}(2) = -1$ و $\forall س \in \mathbb{R} \quad \text{تا}(س) \leq \text{تا}(2)$

لأن : $\forall س \in \mathbb{R} \quad \text{تا}(س) - \text{تا}(2) = \frac{1}{2} (س - 2)^2 \geq 0$

$\text{تا}(2)$ هو القيمة الصغرى للدالة تا.

• دراسة الدالة تا من أجل القيم الكبيرة للعدد | س |

نلاحظ ، في الجدولين التاليين

س	تا(س)
498001	10
4801	210

س	تا(س)
502001	310-
5201	210-

أن قيمة $\lim_{s \rightarrow \infty}$ تكون كبيرة أكثر فأكثر بقدر ما تكون قيمة s كبيرة، كما رأينا في الأمثلة السابقة، يمكن التأكد من النتيجة التالية:

$\lim_{s \rightarrow \infty} s = \infty$ عندما $s \rightarrow \infty$

$\lim_{s \rightarrow -\infty} s = \infty$ عندما $s \rightarrow -\infty$

• جدول التغيرات :

$\infty +$	2	$\infty -$	s
$\infty +$		$\infty +$	$\lim_{s \rightarrow \infty} T(s)$
1			


• التمثيل البياني :

المنحني (٤) للدالة $s \mapsto \frac{1}{2}s^2 - 2s + 1$ هو مجموعة النقط

$\{(s, u) \mid s \in \mathbb{R}, u = \frac{1}{2}s^2 - 2s + 1\}$ من المستوى حيث $s \in \mathbb{R}$ و $u \in \mathbb{R}$.

الجدول التالي يعطي إحداثيات بعض النقاط من (٤).

s	4	3	2	1	0	$1 -$
$T(s)$	1	$\frac{1}{2}$	$1 -$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{7}{2}$




المنحني (٤) يسمى، أيضاً، قطعاً مكافئاً.

وفي المستوى المنسوب إلى معلم متعامد (m, o, i)، المستقيم ذو المعادلة $s = 2$ هو محور تناظر لامتحني (٤).

ولإثبات ذلك نقوم بتغيير للمعلم محتفظين بالأساس (ω , φ) ومتخذين
النقطة ν ($2 \cdot 1$) مبدأ جديداً.

(كما هو مبين في جدول التغيرات ، الدالة تأخذ قيمتها الصغرى (-1)
من أجل $s = 2$).

نعلم أنه إذا كان (s, u) إحداثي النقطة ν في المعلم (m, ω, φ) و
 (s', u') إحداثيها في المعلم (ν, ω, φ) فإن u'



$$s' = s + 2 \\ u' = u - 1$$

معادلة (٦) في المعلم (m, ω, φ)

$$\text{هي } u' = \frac{1}{2}s^2 - 2s + 1$$

ومعادلته في المعلم الجديد (ν, ω, φ) هي :

$$1 + u' = \frac{1}{2}(s' + 2)^2 - 2(s' + 2) + 1$$

$$\text{أي : } u' = \frac{1}{2}s'^2$$

بما أن الدالة $s' = \frac{1}{2}s^2$ زوجية فإن محور التراتيب للمعلم الجديد هو محور

تناظر لتمثيلها البياني (٦)

معادلة هذا المحور ، في المعلم الجديد هي $s' = 0$

ومعادلته ، في المعلم (m, ω, φ) هي $s = 2$.

إذن : المستقيم ذو المعادلة $s = 2$ هو محور تناظر للمنحنى (٦)

٤ - دراسة الدالة تا : $s \mapsto s^2 + ms + n$ ($m \neq 0$) :

- مجموعة التعريف
- الدالة تا معرفة على \mathbb{R} .

• اتجاه التغير :

مما يكمن العددان الحقيقيان المختلفان s_1 و s_2 لدينا :

$$\frac{\text{تا}(s_1) - \text{تا}(s_2)}{s_1 - s_2} =$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(s_1^2 + ms_1 + n) - (s_2^2 + ms_2 + n)}{s_1 - s_2} \\ &= \frac{(s_1 - s_2)(s_1 + s_2 + m)}{s_1 - s_2} \\ &= (s_1 + s_2 + m) \end{aligned}$$

يمكن كتابة نسبة التزايدات هذه كما يلي :

$$\begin{aligned} \left[\frac{m}{2} + (s_1 + s_2) \right] &= \frac{\text{تا}(s_2) - \text{تا}(s_1)}{s_2 - s_1} \\ \left[\left(\frac{m}{2} + s_2 \right) + \left(\frac{m}{2} + s_1 \right) \right] &= \end{aligned}$$

نميز حالتين : $m < 0$. و $m > 0$.

الحالة الأولى $a < 0$:

إذا كان $s_1 \leq -\frac{b}{12}$ و $s_2 \leq -\frac{b}{12}$ و $s_1 \neq s_2$ فإن :

$$0 < \left[\left(\frac{b}{12} + s_2 \right) + \left(s_1 + \frac{b}{12} \right) \right]$$

إذا كان $s_1 \geq -\frac{b}{12}$ و $s_2 \geq -\frac{b}{12}$ و $s_1 \neq s_2$ فإن :

$$0 > \left[\left(\frac{b}{12} + s_2 \right) + \left(s_1 + \frac{b}{12} \right) \right]$$

إذن :

الدالة تا متناقصة تماماً على $[-\infty, -\frac{b}{12}]$ ومتزايدة تماماً على $(-\frac{b}{12}, \infty)$.

$$\left] \infty + . \frac{b}{12} - \right]$$

الحالة الثانية $a > 0$:

إذا كان $s_1 \leq -\frac{b}{12}$ و $s_2 \leq -\frac{b}{12}$ و $s_1 \neq s_2$ فإن :

$$0 > \left[\left(\frac{b}{12} + s_2 \right) + \left(s_1 + \frac{b}{12} \right) \right]$$

إذا كان $s_1 \geq -\frac{b}{12}$ و $s_2 \geq -\frac{b}{12}$ و $s_1 \neq s_2$ فإن :

$$0 < \left[\left(\frac{b}{12} + s_2 \right) + \left(s_1 + \frac{b}{12} \right) \right]$$

إذن :

$$\text{الدالة تا متزايدة تماماً على } \left[-\frac{\omega}{12}, \infty \right] \text{ ومتناقصة تماماً على } \left[\infty, +\frac{\omega}{12} \right]$$

$$x + \left(\frac{\omega}{12} \right) x + \left(\frac{\omega}{12} \right)^2 = \left(\frac{\omega}{12} \right) \text{ لدينا : تا}$$

$$\frac{x^2 - \omega^2}{14} =$$

$$\forall s \in \mathbb{R} : \text{تا}(s) - \text{تا}(s^2 + \omega s + \omega^2) = \frac{x^2 - \omega^2}{14}$$

$$\frac{x^2}{14} = \omega s^2 + \omega s + \omega^2$$

$$\left(\frac{\omega}{12} + s \right)^2 =$$

إذن :

$$- \text{إذا كان } \omega < 0 \text{ فإن : } \forall s \in \mathbb{R} \text{ تا}(s) \leq \text{تا}\left(\frac{\omega}{12}\right)$$

ـ هي القيمة الصغرى للدالة تا

- إذا كان $a > 0$ فإن : $\forall s \in \mathbb{R} \text{ تا}(s) \geq 0$

$\left(\frac{s}{2} - \frac{a}{2} \right)$ هي القيمة العظمى للدالة تا

• دراسة الدالة تا من أجل القيم الكبيرة للعدد |s|

إذا حسبنا قيم تا(s) من أجل بعض القيم الكبيرة للعدد |s| نلاحظ أن قيم |تا(s)| تكون كبيرة أكثر فأكثر بقدر ما يكون |s| كبيراً . ويمكن التأكد من النتائج التالية :

- إذا كان $a < 0$ فإن :

تا(s) $\leftarrow +\infty$ عندما $s \leftarrow +\infty$

تا(s) $\leftarrow -\infty$ عندما $s \leftarrow -\infty$

- إذا كان $a > 0$ فإن :



تا(s) $\leftarrow -\infty$ عندما $s \leftarrow +\infty$

تا(s) $\leftarrow -\infty$ عندما $s \leftarrow -\infty$

• جدول التغيرات :

$0 > a$

$0 < a$




• التمثيل البياني :

التمثيل البياني (٦) للدالة $y \leftarrow a s^2 + b s + c$ ($a \neq 0$)

هو مجموعة النقط (s, y) من المستوى حيث :

$s^2 + bs + c = 0$ و $s = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$ (٢) يسمى المنحني

المنحنين المرسومان في الشكلين التاليين هما تمثيلان بيانيان لدادلين من الشكل $s \leftarrow s^2 + bs + c$ في الحالتين $b > 0$ و $b < 0$.



وفي المستوى المنسوب إلى معلم متعمد ، المستقيم الذي معادله

$$s = -\frac{b}{2}$$
 هو محور تناظر للمنحني (٢)

ويمكن التأكد من ذلك ، مثلا بإجراء تغير للمعلم كما رأينا في المثال السابق .

والنقطة $s = -\frac{b}{2}$ هي ذروة القطع المكافيء (٢)

الدالة $s \leftarrow \frac{1}{s}$ ($s \neq 0$)

1 - دراسة الدالة تا : $s \leftarrow \frac{1}{s}$

1.1 - مجموعة التعريف :

الدالة تا معرفة إذا وفقط إذا كان $s \neq 0$

$$T_a = \{ s \in \mathbb{R} : s \neq 0 \}$$

2.1 - اتجاه التغير :

s_1 و s_2 عدوان مختلفان من نفس المجال
($s_1, s_2 \in T_a$) أو ($s_1, s_2 \in \mathbb{R}$)

لدينا :

$$\begin{aligned} \frac{T_a(s_1) - T_a(s_2)}{s_1 - s_2} &= \frac{\frac{1}{s_1} - \frac{1}{s_2}}{s_1 - s_2} = \frac{\frac{s_2 - s_1}{s_1 s_2}}{s_1 - s_2} \\ &= \frac{1}{s_1 s_2} \end{aligned}$$

بما أن s_1 و s_2 لها نفس الإشارة فإن :

$$s_1 s_2 > 0 \text{ و } \frac{T_a(s_1) - T_a(s_2)}{s_1 - s_2} > 0$$

إذن :

الدالة تا متناقصة تماما على كلّ من المجالين $(-\infty, 0)$ و $(0, \infty)$

3.1 - دراسة الدالة تا من أجل القيم الكبيرة للعدد $|s|$

نلاحظ في الجدول التالي :

$^4 10$	$^3 10$	$^2 10$	10	ϵ
0,0001	0,001	0,01	0,1	$\frac{1}{\epsilon}$

أن قيمة ϵ تكون قريبة من الصفر أكثر فأكثر بقدر ما يكون ϵ كبيراً.
هل يمكن جعل ϵ قريبًا من الصفر بالقدر الذي نريده؟ وبعبارة أخرى :

عندما يكون ϵ كبيراً ، هل يمكن جعل ϵ موجباً وأصغر من أي عدد موجب تماماً ؟

$$0 < \epsilon < \frac{1}{s} \iff 0 < \epsilon < \frac{1}{s}$$

$$0 < \frac{1}{s} < \epsilon \iff$$

إذن للحصول على $0 < \epsilon < \frac{1}{s}$ يمكنني أخذ $s < \frac{1}{\epsilon}$

(مثلاً لكي يكون $0 < \epsilon < 10^{-9}$ يمكنني أخذ $s < 10^9$).
ونعبر عن هذه الحالة بالقول :

إن ϵ يؤول إلى الصفر عندما يؤول s إلى ما لا نهاية
ونكتب : $\lim_{s \rightarrow \infty} \epsilon = 0$

ومن جهة أخرى نلاحظ في الجدول التالي

$^5 10 -$	$^4 10 -$	$^3 10 -$	$^2 10 -$	$^1 10 -$	س
0,00001 -	0,0001 -	0,001 -	0,01 -	0,1 -	$\frac{1}{s}$

أن قيم $|ta(s)|$ تكون كذلك قريبة من الصفر أكثر فأكثر بقدر ما يكون $(-s)$ كبيرا

وبطريقة مماثلة يمكن التأكد من النتيجة التالية

$$- ta(s) \leftarrow 0 \text{ عندما } s \leftarrow -\infty$$

ونقول إن $ta(s)$ يؤول إلى الصفر عندما يقول s إلى ناقص ما لا نهاية
ونكتب : $ta(s) \leftarrow 0 \text{ عندما } s \leftarrow -\infty$

4.1 - دراسة الدالة ta من أجل القيم القريبة من الصفر للعدد $|s|$
نلاحظ في الجدول التالي :

$^5 -10 -$	$^4 -10 -$	$^3 -10 -$	$^2 -10 -$	$^1 -10 -$	س
$^5 10 -$	$^4 10 -$	$^3 10 -$	$^2 10 -$	$^1 10 -$	$\frac{1}{s}$

أن قيم $|ta(s)|$ تكون كبيرة أكثر فأكثر بقدر ما يكون s قريبا من الصفر وبطريقة مماثلة كما سبق يمكن التأكد من النتيجتين التاليتين :

• يؤهل $ta(s)$ إلى ما لا نهاية عندما يقول s إلى الصفر بقيم موجبة
ونكتب : $ta(s) \leftarrow +\infty \text{ عندما } s \leftarrow 0$

• يؤهل $ta(s)$ إلى ناقص ما لا نهاية عندما يقول s إلى الصفر بقيم سالبة

$$\text{ونكتب : } ta(s) \leftarrow -\infty \text{ عندما } s \leftarrow 0$$

5.1 - جدول التغيرات :

$\infty +$	0	$\infty -$	س
0	$\infty +$	$\infty -$	$\frac{1}{s}$

6.1 - التمثيل البياني :

• في المستوى المنسوب إلى المعلم (م و مي) . المنحني (٦).

الممثل للدالة تا : $s \rightarrow \frac{1}{s}$ هو

مجموعه النقط $\mathcal{D}(s, u)$ من المستوى

المساوي

$$\text{حيث } s = u^* \text{ و } u = \frac{1}{s}$$

يسمى المنحني (٦) قطعا زائدا

ويتألف هذا المنحني من فرعين متفصلين لأن العدد 0 ليس له صورة بالدالة تا

• مركز التناظر :

أبداً م هو مركز تناظر للمنحني (٦) لأن الدالة تا فردية

• المستقيمات المقاربة



إذا كانت \mathcal{D} نقطة من (٦) و هـ

مسقطها على (s' , s) وفق

منحني (u', u) ول مسقطها

على (u', u) وفق منحني

(s', s)



فإن :

الطول $\text{ع} \rightarrow 0$ يؤول إلى الصفر عندما يؤول الطول $\text{م} \rightarrow \infty$ إلى ما لا نهاية لأن .

تا (s) $\leftarrow 0$ عندما $s \rightarrow \infty$

تا (s) $\leftarrow 0$ عندما $s \rightarrow -\infty$

نقول إن المستقيم (s' - s) مستقيم مقارب للمنحنى (٦) وكذلك :

يؤول الطول $\text{م} \rightarrow 0$ إلى ما لا نهاية عندما يؤول الطول $\text{ل} \rightarrow 0$ إلى الصفر لأن

تا (s) $\leftarrow \infty$ عندما $s \leftarrow 0$

تا (s) $\leftarrow -\infty$ عندما $s \rightarrow 0$

نقول إن المستقيم (u' - u) مستقيم مقارب للمنحنى (٦)

2 - دراسة الدالة تا : $s \rightarrow \frac{1}{s} (s \neq 0)$

1.2 - مجموعة التعريف :

الدالة تا معرفة إذا و فقط إذا كان $s \neq 0$

ف $T_a = [0, \infty) \cup (-\infty, 0]$

2.2 - اتجاه التغيير :

s_1 و s_2 عدوان مختلفان من نفس المجال

$\left([\infty, 0] \cup [0, \infty) \right)$

لدينا :

$$\frac{1}{s_1} - \frac{1}{s_2}.$$

$$\frac{\frac{1}{s_1} - \frac{1}{s_2}}{s_1 s_2 (s_1 - s_2)} = \frac{s_2 - s_1}{s_1 s_2 (s_1 - s_2)} = \frac{s_2 - s_1}{s_1 s_2} = \frac{1}{s_1 s_2}.$$

بما أن $\frac{1}{s^1}$ و $\frac{1}{s^2}$ لها نفس الإشارة فإن إشارة النسبة

$$\left(\frac{\frac{1}{s^1}}{\frac{1}{s^2}} \right) = \frac{s^2}{s^1} = s^1$$

إذن :

- إذا كان $s > 0$ فإن الدالة تا متناقصة تماما على كل من المجالين

$$[0, +\infty) \cup [0, -\infty)$$

- إذا كان $s < 0$ فإن الدالة تا متزايدة تماما على كل من المجالين

$$[0, +\infty) \cup [0, -\infty)$$

3.2 - دراسة الدالة تا من أجل القيم الكبيرة للعدد $|s|$ ومن أجل قيم s القريبة من الصفر

- بدراسة مماثلة لدراسة الدالة $s \mapsto \frac{1}{s}$ نحصل على النتائج التالية :

$0 > s$	$0 < s$
$\frac{1}{s} \rightarrow 0$ عندما $s \rightarrow +\infty$	$\frac{1}{s} \rightarrow 0$ عندما $s \rightarrow +\infty$
$\frac{1}{s} \rightarrow 0$ عندما $s \rightarrow -\infty$	$\frac{1}{s} \rightarrow 0$ عندما $s \rightarrow -\infty$
$\frac{1}{s} \rightarrow -\infty$ عندما $s \rightarrow 0^-$	$\frac{1}{s} \rightarrow +\infty$ عندما $s \rightarrow 0^+$
$\frac{1}{s} \rightarrow +\infty$ عندما $s \rightarrow 0^+$	$\frac{1}{s} \rightarrow -\infty$ عندما $s \rightarrow 0^-$

4.2 - جدول التغيرات :


$0 > 0$			
$\infty +$	0	$\infty -$	س
$\infty -$	0	$\infty +$	$\frac{0}{s}$

$0 < 0$			
$\infty +$	0	$\infty -$	س
0	$\infty +$	0	$\frac{0}{s}$

5.2 - التمهيل البياني

منها يكُن العدد الحقيقي غير المعدوم أ فإن المنحني الممثل للدالة $s \leftarrow \frac{1}{s}$ في المستوى المرتّب إلى المعلم ($m \rightarrow 0$. ي) يسمى قطعاً زائداً والمستقيمان ($s \cdot s$) و ($u \cdot u$) هما مستقيمان مقاربان لهذا القطع الزائد والمبدأ m هو مركز تناظره

يبين الشكلان التاليان المنحنيين الممثلين لهذا الدين



تمارين

الدوال المذكورة في ما يلي هي دوال عددية لمتغير حقيقي

عموميات :

1. عين مجموعة تعريف كل دالة من الدوال التالية :

$$2) \frac{5 + 3s}{4 - s^2} \leftarrow s$$

$$\frac{4 + s}{2 - s} \leftarrow s$$

$$4) \frac{(5 + s)(s + 1)}{s + 1} \leftarrow s$$

$$3) \frac{3s - 2}{s^2 + 2} \leftarrow s$$

$$6) \sqrt{s-2} + \sqrt{2-s} \leftarrow s$$

$$5) \sqrt{s-4} + \sqrt{4-s} \leftarrow s$$

$$8) \frac{1}{\sqrt{1-s}} \leftarrow s$$

$$7) \sqrt{s^2 + 2s - 24} \leftarrow s$$

$$10) \frac{s+2}{|s+3|} \leftarrow s$$

$$9) \sqrt{\frac{s}{s+1}} \leftarrow s$$

$$11) \sqrt{\frac{s}{|s|}} \leftarrow s$$


2. عين مجموعة تعريف الدالة تا المعرفة كما يلي :

$$\text{تا}(s) = \begin{cases} \frac{1}{s} & \text{إذا كان } s \neq 0 \\ 0 & \text{و تا}(0) \end{cases}$$


3) عُيّن بِجَمْعَةٍ تَعْرِيفَ الدَّالَّةِ هَا الْمُعْرَفَةَ كَمَا يَلِي :

$$\text{هَا}(\text{s}) = \frac{1 - \text{s}}{(\text{s} - 2)(\text{s} + 5)} \quad \begin{array}{l} \text{إِذَا كَانَ} \text{s} \in [-\infty, 2], \\ \text{وَهَا}(\text{s}) = \sqrt{\text{s} - 2} \quad \begin{array}{l} \text{إِذَا كَانَ} \text{s} \in [2, \infty). \end{array} \end{array}$$


4. هل التمثيلات التالية تمثيلات بيانية لدوال؟




5. المثلثات التالية تمثيلات بيانية للدواء طلب تعينها



الممثل البياني 1



الممثل البياني 2



الممثل البياني 3

كـ . يـ بـ يـ أـنـ الدـ الـ لـ تـ المـ عـ رـ فـ كـ يـ بـ مـ تـ زـ اـ يـ دـ ةـ عـ لـىـ المـ جـ الـ فـ فـ يـ كـ لـ سـ حـ لـ اـ تـ سـ لـ بـ لـ اـ تـ التـ الـ لـ يـ :

$$\text{تا}(\text{s}) = \frac{5}{\text{s}} + 2 \quad \text{فـ} = [\text{s} - 3]$$

$$\text{تا}(\text{s}) = \frac{\text{s}^2 + 2}{\text{s} - 3}$$

$$\text{تا}(\text{s}) = \frac{1}{\text{s}} \quad \text{فـ} = [\infty - 1]$$

$$\text{تا}(\text{s}) = \frac{1}{\text{s} - 2} \quad \text{فـ} = [0, 2]$$

$$\text{تا}(\text{s}) = \frac{\text{s}^3}{\text{s}^3} \quad \text{فـ} = [0, \infty)$$

$$\text{تا}(\text{s}) = \sqrt[3]{\text{s}} \quad \text{فـ} = [0, 1]$$

7. أثبتت أن الدالة تا : $\text{s} \rightarrow \frac{4}{\text{s}^2} + 1$ متزايدة على $[2, 5]$ ومتناقصة على $[-1, 0]$ وأتها غير رتيبة على $[-2, 3]$.

8. دالتان تا وها معرفتان على مجال ف .

عا دالة معرفة على ف كما يلي :

$$\forall \text{s} \in \text{فـ عـا}(\text{s}) = \text{تا}(\text{s}) + \text{ها}(\text{s})$$

أثبت أنه :

- 1) إذا كانت تا وها متزايدتين تماماً على ف ، فإن عا متزايدة تماماً على ف
- 2) إذا كانت تا وها متناقضتين تماماً على ف ، فإن عا متناقصة تماماً على ف .

9. تا وها دالتان معرفتان على مجال ف حيث :

$$\forall \text{s} \in \text{فـ تـا}(\text{s}) < 0 \quad \text{وـ هـا}(\text{s}) > 0$$

عا دالة معرفة على ف كما يلي :

$$\forall \text{s} \in \text{فـ ، عـا}(\text{s}) = \text{تا}(\text{s}) \times \text{ها}(\text{s})$$

أثبت أنه :

- 1) إذا كانت تا وها متزايدتين تماماً على ف ، فإن عا متزايدة تماماً على ف .
- 2) إذا كانت تا وها متناقضتين تماماً على ف ، فإن عا متناقصة تماماً على ف .

10. تا و ها دالاتان معرفتان على مجال ف حيث :

$$\forall s \in F \text{ such that } f(s) > 0 \text{ and } g(s) > 0.$$

عا دالة معرفة على ف كما يلي :

$$f(s) = g(s) \times h(s).$$

أدرس اتجاه تغير الدالة عا على ف ، في الحالتين التاليتين :

1) تا و ها متزايدتان تماماً على ف .

2) تا و ها متناقصستان تماماً على ف .

11. من بين الدوال التالية ، أذكر الدوال الفردية والدوال الزوجية

$$1) s \leftrightarrow s (s^2 - 5) \quad 2) s \leftrightarrow \frac{s}{1 + s^2} \quad 3) s \leftrightarrow \frac{|s|}{1 + s^2}$$

$$4) s \leftrightarrow \frac{3s}{3 + s^2} \quad 5) s \leftrightarrow \frac{s^3 - 2s}{2s^3 + s} \quad 6) s \leftrightarrow \frac{s^2 - s}{s - 1}$$

$$7) s \leftrightarrow \frac{s^3 + s}{s^4 + s^2} \quad 8) s \leftrightarrow \sqrt{s^2 + s} \quad 9) s \leftrightarrow \sqrt[3]{s^2 - 4}$$

$$10) s \leftrightarrow \sqrt{\frac{s+1}{s-1}} \quad 11) s \leftrightarrow \sqrt{(s+1)(s-1)} + \sqrt{s(s+1)}$$

$$12) s \leftrightarrow |s - 2| \quad 13) s \leftrightarrow |s + 2| \quad 14) s \leftrightarrow \left| \frac{1-s}{1+s} \right|$$

$$15) s \leftrightarrow \frac{|s-1| - |s+1|}{|s-1| + |s+1|}$$

(Handwritten note)

12. تا دالة معرفة على ح حيث :

$$\forall s \in \mathbb{H} : 3 \text{Ta}(-s) + \text{Ta}(s) = 4s^3 + 2s.$$

بين أن الدالة تا فردية . ثم عينها

13. تا دالة معرفة على ح . عا و ها دالتان معرفتان على ح كما يلي :

$$\forall s \in \mathbb{H} \quad \text{عا}(s) + \text{تا}(-s) = \frac{1}{2}$$

$$\forall s \in \mathbb{H} \quad \text{ها}(s) - \text{تا}(-s) = \frac{1}{2}$$

1) أثبتت أن الدالة عا زوجية وأن الدالة ها فردية

2) بين أن : $\forall s \in \mathbb{H} \text{Ta}(s) = \text{عا}(s) + \text{ها}(s)$.

14. دالة تا معرفة على مجال ف حيث $\forall s \in F \text{Ta}(s) \neq 0$ و $(-s) \in F$

ها دالة معرفة على ف كما يلي :

$$\frac{\text{تا}(s)}{\text{تا}(|s|)} = \frac{\text{فا}(s)}{\text{فا}(|s|)}$$

بين أن الدالة ها زوجية في كل من الحالتين التاليتين :

1) تا زوجية 2) تا فردية

15. تا دالة زوجية معرفة على ح .

أثبتت أنه إذا كانت تا متزايدة تماماً على $[0, +\infty]$

فإنها متناقصة تماماً على $[-\infty, 0]$

16. تا دالة فردية معرفة على ح .

بين أنه إذا كانت تا متزايدة على $[0, +\infty]$ فإنها متزايدة على $[-\infty, 0]$

17. أثبتت أن العدد π دور للدالة $s \mapsto \text{جب } 2s$

18. أثبتت أن العدد 2π دور للدالة $s \mapsto \text{جب } (\text{س} + \pi)$

19. أثبت أن العدد $\frac{\pi^4}{3}$ دور للدالة $s \mapsto \tan\left(\frac{s^3}{2}\right)$ وأن العدد 2π ليس دوراً لهذه الدالة.

20. أثبت أن العدد 6π دور للدالة $s \mapsto \tan s + \cot\left(\frac{s}{3}\right)$.

21. أثبت أن الدالة $s \mapsto \frac{1}{s}$ غير دورية.

22. تا دالة معرفة على \mathbb{R} كما يلي :

$$\forall s \in [-1, 1] \quad \text{تا}(s) = |s| \quad \text{و} \quad 2 \text{ دور للدالة تا}$$

1) أرسم التمثيل البياني للدالة تا في المجال $[-3, 4]$.

2) حل ، في المجال $[-3, 4]$ ، المعادلة $\text{تا}(s) = \frac{1}{2}$

(يمكن استعمال المنحني)

23. تا دالة معرفة على \mathbb{R} كما يلي :

$$\forall s \in [-1, 1] \quad \text{تا}(s) = s \quad \text{و} \quad 2 \text{ دور للدالة تا}.$$

1) أحسب $\text{تا}(1)$ ؛ $\text{تا}(2)$ ؛ $\text{تا}(-3)$

2) أرسم التمثيل البياني للدالة تا في المجال $[-4, 3]$.

3) حل ، في المجال $[-4, 3]$ ، المعادلة $\text{تا}(s) = 1$

24. نعلم أن الجزء الصحيح للعدد الحقيقي s هو العدد الصحيح $y(s)$ حيث $y(s) \geq s > y(s) + 1$.

نعتبر الدالة تا : $s \mapsto s - y(s)$.

1) أحسب $\text{та}(0)$ ، $\text{та}(1)$ ، $\text{та}(2)$ ، $\text{та}(-2)$ ، $\text{та}(1,01)$ ،

$$\text{та}(-2,45) , \text{تا}\left(\frac{2}{5}\right)$$

2) أحسب $\text{та}(s)$ إذا كان s صحيحاً.

- 3) أحسب تا (س) من أجل س ∈ [0, 1] و من أجل س ∈ [1, 2]
 4) ارسم التمثيل البياني لهذه الدالة على المجال [0, 2]
 5) بيّن أن العدد 1 دورٌ للدالة تا .

الدوال التألفية :

25. تعتبر الدالة تا : س ←→ ³س
 1) عَيْن مجموعـة الأعداد الحقيقـية س بحيث يكون :

$$تا (س) < 10^8$$

 2) عَيْن مجموعـة الأعداد الحقيقـية س بحيث يكون :

$$تا (س) > 10^7$$
26. تعتبر الدالة تا : س ←→ -5 س
 1) أوجـد عدـداً حقيقـياً α بحيث يكون :

$$س < \alpha < تا (س)$$

 هل α وحـيد ؟
 2) β عـدد حقيقـي موجـب تماماً . عـيـن عـددـاً حـقيقـياً α يـحقق ما يـلي :

$$س < \alpha < تا (س)$$
27. شـكل جـدول التـغيرات لـكـل دـالـة مـن الدـوـال التـالـيـة :
 ثـم ارسم تمثـيلـها البيـانـي فـي مـعـلـم (م ، و ، يـ).

$$(2) س \leftarrow -\frac{s}{2} + \frac{1}{4}$$

$$(1) س \leftarrow 3s + 1$$

$$(4) س \leftarrow \frac{s}{2} - \frac{3}{2}$$

$$(3) س \leftarrow \frac{s}{3} - \frac{1}{6}$$

$$(6) س \leftarrow \frac{2}{5}s + \frac{1}{2}$$

$$(5) س \leftarrow 2s + 5$$

28. المستوى منسوب إلى معلم $(m, \omega, \dot{\omega})$.
أنشئ التثيل البياني لكل دالة من الدوال التالية :

$$1) s \leftarrow |s - 1|$$

$$3) s \leftarrow |s + 2|$$

$$5) s \leftarrow |3s - 2|$$

$$7) s \leftarrow \sqrt{(s - 2)^2 + \sqrt{(s + 1)^2}}$$

29. المستوى منسوب إلى معلم $(m, \omega, \dot{\omega})$.
 $y(s)$ هو الجزء الصحيح للعدد الحقيقي s
أنشئ التثيل البياني لكل دالة من الدوال التالية :

$$1) y(s) \leftarrow [3, 3 -]$$

$$y(s) \leftarrow i(s)$$

$$3) y(s) \leftarrow [3, 3 -]$$

$$y(s) \leftarrow -\frac{5}{2}s + i(s)$$

30. المستوى منسوب إلى معلم متعمد و متجانس .
 $(\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4, \Delta_5, \Delta_6)$ مستقيمات معادلاتها ،
على الترتيب :

$$1) u = s + 2$$

$$3) u = -\frac{1}{2}s + 2$$

$$5) u = \frac{1}{2}s + 2$$

أذكر ، من بين هذه المستقيمات ، المستقيمات المترادفة والمستقيمات المتعامدة .
31. المستوى منسوب إلى معلم متعمد ومتجانس .

$$\Delta \text{ مستقيم معادلته } \text{ ع} = 2 \text{ س} + 5 .$$

عَيْن ، في كل حالة من الحالات التالية ، دالة تآلفية بحيث تمثيلها البياني :

- 1) يشمل النقطة $(-2, 1)$ و يوازي (Δ) .
- 2) يشمل النقطة $(-1, 0)$ و يعادل (Δ) .
- 3) يكون نظير (Δ) بالنسبة إلى محور الفواصل .
- 4) يكون نظير (Δ) بالنسبة إلى محور الترتيب .

32. أ ب ح مثلث . أقياس أضلاعه ، بالستيمرات هي :

$$\text{أ ب} = 5 ; \text{أ ح} = 8 ; \text{ب ح} = \text{س} .$$

رسم تمثيل البياني للدالة $\text{س} \leftrightarrow \text{م} (\text{s})$ حيث
 $\text{م} (\text{s})$ هو محيط المثلث أ ب ح .

33. (Δ) مستقيم و $(\text{م} , \text{و})$ معلم له .

أ ، ب ، ح ثلات نقط من (Δ) فواصلها (-2) ، $(1+)$ ، (s) على الترتيب .

1) أحسب الأعداد الحقيقة $\underline{\text{تا}} (\text{s})$ ، $\underline{\text{ها}} (\text{s})$ ، $\underline{\text{عا}} (\text{s})$ ، $\underline{\text{طا}} (\text{s})$

حيث : $\text{تا} (\text{s}) = \text{م} + \text{ب}$ ؛ $\text{ها} (\text{s}) = \text{م} - \text{ب}$

$\text{عا} (\text{s}) = \text{م} + \text{ب}$ ؛ $\text{طا} (\text{s}) = \text{م} - \text{ب}$

2) هل الدوال التالية تآلفية :

$\text{س} \leftrightarrow \text{تا} (\text{s})$ ؛ $\text{س} \leftrightarrow \text{ها} (\text{s})$ ؛ $\text{س} \leftrightarrow \text{عا} (\text{s})$

$\text{س} \leftrightarrow \text{طا} (\text{s})$.

34. تعتبر الداللين الخططيين ، تا : $\text{س} \leftrightarrow \text{أ س}$

ها : $\text{س} \leftrightarrow \text{أ}' \text{ س}$

نسمى (Δ) و (Δ') التثنين البيانيين للداللين تا ، ها ، على الترتيب ، في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد $(\text{م} , \text{و} , \text{ى})$.

أثبت أن (Δ') يكون نظير (Δ) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل إذا وفقط إذا كان

$$\text{أ}' + \text{أ} = 0$$

35. المستوى منسوب إلى معلم متعمد ($\leftarrow m$, $\leftarrow w$, $\leftarrow i$).

(Δ) و (Δ') مستقيمان معادلتها، على الترتيب ،

$$w = a_1 s + b \quad \Delta' \quad \Delta \quad w = a_1' s + b'.$$

كيف نختار الأعداد الحقيقة a_1, a_1' . b, b' حتى يكون (Δ') نظير (Δ)

بالنسبة إلى حامل محور الفواصل

الدالة : $s \leftrightarrow a_1 s^2 + b s + c$ ($a_1 \neq 0$)

36. تا هي الدالة : $s \leftrightarrow 4 s^2 + 7 s + 5$

1) يَبْيَنْ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ كُلِّ عَدْدٍ حَقِيقِيٍّ مُوْجِبٌ s يَكُونْ تا (s) $< 4 s^2$

2) أُوجِدْ عَدْدًا حَقِيقِيًّا مُوْجِبًا a بِحِيثُ :

إِذَا كَانَ $s > a$ فَإِنْ تا (s) $< 10^{20}$

37. تا هي الدالة : $s \leftrightarrow s^2 + 5 s - 8$

1) يَبْيَنْ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ كُلِّ عَدْدٍ حَقِيقِيٍّ $s > 2$ يَكُونْ تا (s) $< s^2$

2) أُوجِدْ عَدْدًا حَقِيقِيًّا مُوْجِبًا a بِحِيثُ :

إِذَا كَانَ $s < a$ فَإِنْ تا (s) $< 10^{-8}$

38. المستوى منسوب إلى معلم ($\leftarrow m$, $\leftarrow w$, $\leftarrow i$)

شكل جدول تغيرات كل من الدوال التالية وأنشئ تمثيلاتها البيانية

1) $s \leftrightarrow s^2$

2) $s \leftrightarrow -\frac{1}{3} s^2$

3) $s \leftrightarrow -\frac{1}{2} s^2$

4) $s \leftrightarrow 2 s^2 + 3 s - 5$

5) $s \leftrightarrow -3 s^2$

39. المستوى منسوب إلى معلم ($\leftarrow m$, $\leftarrow w$, $\leftarrow i$). نضع : $m^1 = w$, $m^2 = b$, $m^3 = i$

شكل جدول تغيرات الدالة : $s \leftrightarrow s^3 + 2 s^2 - 3 s$ ثم أنشئ تمثيلاتها البياني

في كل حالة من الحالات التالية

(1) $y = \sqrt{m + s}$ معلم متعمد متجانس
 (2) $\sqrt{s} = \sqrt{m + 60}$
 (3) $\sqrt{s} = \sqrt{m + 1} - \sqrt{m}$
 فيما يلي المستوى منسوب إلى المعلم (m, s, y)

40. شكل جدول تغيرات كل من الدوال التالية وأنشئ تمثيلاتها البيانية

$$1) \quad s \leftarrow s - 4$$

$$2) \quad s \leftarrow s^2 - 4$$

$$3) \quad s \leftarrow -s^2 + 4$$

$$4) \quad s \leftarrow -s^2 - 2$$

41. أدرس كل دالة من الدوال التالية ثم أنشئ تمثيلها البياني

$$1) \quad s \leftarrow |s|^3 - 2$$

$$2) \quad s \leftarrow |s^2 + s|$$

$$3) \quad s \leftarrow |s^2 - s + 1|$$

$$4) \quad s \leftarrow |4s^2 - 2s + 4|$$

$$5) \quad s \leftarrow \sqrt{|s^2 + 2s - 1|}$$

42. a) عدد حقيقي و (ك) المنحني الممثل للدالة : $s \leftarrow s^2 - a$
 b) عين حي تنتهي النقطة $(1, 4)$ إلى المنحني (ك) ثم أنشيء (ك)

43. α, β عدادان حقيقيان و (ك) المنحني الممثل للدالة :

$$س \leftarrow \alpha س^2 + \beta (س^2 - س) + 1$$

عين α و β حتى تنتهي النقطتان (1، 2) و (2، -1) إلى المنحني (ك)
ثم أنشيء (ك)

44. α, β, δ أعداد حقيقة و (ك) المنحني الممثل للدالة :

$$س \leftarrow \alpha س^2 + \beta س + \delta$$

عين α, β, δ حتى تنتهي النقط (1، 2)، (2، -1)، (-1، -2)
و ج (-2، 3) إلى المنحني (ك). ثم أنشيء (ك)

45. α, β, δ أعداد حقيقة و (ك) المنحني الممثل للدالة :

$$س \leftarrow \alpha س^2 + \beta س + \delta$$

عين α, β, δ حتى تنتهي النقط (1، -6)، (-1، 4)، (1، 4)
و ج (2، -3) إلى المنحني (ك). ثم أنشيء (ك)

46. تأوه دالثان معرفتان كما يلي

تا : ح \leftarrow ح
ها : ح \leftarrow ح

$$س \leftarrow س^2 - 4$$

(ك) المنحني الممثل للدالة تا ، (Δ) المستقيم الممثل للدالة ها
عن إحداثيات نقط تقاطع (ك) و (Δ)
· أنشيء (ك) و (Δ)

47. تأوه دالثان معرفتان كما يلي :

تا : ح \leftarrow ح
ها : ح \leftarrow ح

$$س \leftarrow س^2 + 2 س - 3$$

(ك) المنحني الممثل للدالة تا ، (ل) المنحني الممثل للدالة ها

1) عين إحداثيات نقط تقاطع (ك) مع الحاملين (س، س) و (ع، ع)
للمحورين

2) عين إحداثيات نقط تقاطع (ل) مع (س، س) و (ع، ع)

3) عين إحداثيات نقط تقاطع (ك) و (ل)

48. (ك) المُنْحَنِي المُمْثَل لِلداَلَة : تا : س \leftrightarrow س² - 2 س - 8

- 1) أكتب كثِير الْخَدُود تا (س) عَلَى شَكْلِه التَّوْذِيجِي
- 2) م' نقطَة إِحْدَائِيَاها (1 . 9) فِي الْمَعْلُوم (م' ، و' ، ي')
- أكتب معادلة المُنْحَنِي (ك) بِالنِّسْبَة إِلَى الْمَعْلُوم (م' ، و' ، ي')

49. ط عدد حَقِيقِي وَ هَاط الدَّالَة :

$$س \leftrightarrow ط س^2 - 2 (ط + 1) س + ط$$

- 1) عَيْن مُجْمُوعَة قِيم ط بِحِيث تَقْبِيلَ الْمَعْدَلَة هَاط (أ) حلاً وَاحِدًا
- 0 عَيْن مُجْمُوعَة قِيم ط بِحِيث يَكُون هَاط (2) = 0 أَو هَاط
- 0 عَيْن مُجْمُوعَة قِيم ط حَتَّى يَكُون هَاط (1) ...
- 2) عَيْن . حَسْب قِيم العَدْد الحَقِيقِي ك . مُجْمُوعَة الأَعْدَاد الحَقِيقِيَّة ط الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَقْبِيل الدَّالَة هَاط قِيمَة صَغِيرَى تَسَاوِي ك
- 3) أَنْشِئ المُنْحَنِين المُمْثَلَيْن لِلداَلَتَيْن هَاط وَ هَاط (1)
- بَيْن أَنْ هَذَيْن المُنْحَنِين نقطَة مشتركة يَطْلُب حَسَاب إِحْدَائِيهَا
- 4) أَثْبِت أَنَّ المُنْحَنِي المُمْثَل لِلداَلَة هَاط يَشْمَل نقطَة إِحْدَائِيَاها مُسْتَقْلَان عَن د

50. [م ك ، م ل] زاوية قائمة . د نقطَة متغيرة من [م ك) تختلف عن م . د نقطَة

ثابتة من [م ل) بِحِيث م⁴ = 4
(وحدة الطول هي المستيمتر)

الدائرة التي تشمل نقطَة د و تمس المستقيم (م ك) في نقطَة د تقطع [م ل) في
النقطة ب .

نضع م د = س و م س = ع

1) قارن بين الزاويتين [د م ك] و [د ب م]

2) بَيْن أَنْ : س² = 4 ع

3) شكل جدول تغييرات الدالة : س \leftrightarrow ع ثم أنشِئ تَفْسِيلَهَا الْبَيَانِي

$$5.1) \text{ أنشيء القطع المكافيء } (\kappa) \text{ الذي معادلته: } \frac{s^2}{2}$$

$$2) \text{ ط عدد حقيقي حيث } \frac{1}{2} < \text{ ط} < \frac{1}{2}$$

بتقاطع المنحني (κ) مع المستقيم (Δ) الذي معادلته $s = \text{ط}$ في النقاطين x_1 و x_2

أحسب بدلالة ط إحداثي النقطة يتصف القطعة $[x_1, x_2]$

عين مجموعة النقط ي عندما يتغير ط في المجال $[-\infty, +\infty]$

52. إذا سقط حجر سقطوا حرا فإنه يقطع في زمن ز مسافة قدرها 4.8 ز^2

1) ما هو الزمن الذي استغرقه هذا الحجر إذا قطع في سقوطه $176.4 \text{ م}?$

2) ما هي المسافة التي قطعها هذا الحجر إذا استغرق في سقوطه زمنا قدره 7 ثا

$$\text{الدالة: } s \leftarrow \frac{1}{s} (0 \neq s)$$

$$53. \text{ تا هي الدالة } s \leftarrow \frac{5}{s}$$

1) أوجد عدداً حقيقياً موجباً α بحيث يكون

$$s < \alpha \iff 0 < \text{تا}(s) < 10^{-9}$$

2) أوجد عدداً حقيقياً موجباً β بحيث يكون

$$s > \beta \iff -10^{-9} < \text{تا}(s) < 0$$

$$54. \text{ تا هي الدالة } s \leftarrow -\frac{2}{s}$$

أوجد عددين حقيقيين موجبين α و β بحيث

$$1) -s > \alpha \iff 0 < \text{تا}(s) < 10^{-7}$$

$$2) -s > \beta \iff 0 < \text{تا}(s) < 10^{-7}$$

55. أدرس تغيرات كل دالة من الدوال التالية ثم أنشيء تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم $(m, 0, i)$

$$\frac{2}{s-3} \quad (3)$$

$$\frac{1}{s-2} \quad (2)$$

$$\frac{2}{s} \quad (1)$$

$$\frac{2.1}{s} \quad (6)$$

$$\frac{4}{s-3} \quad (5)$$

$$\frac{3}{s} \quad (4)$$

56. أدرس و مثل بيانيا كلا من الدوال التالية

$$\frac{3}{\sqrt[2]{s-2}} \quad (3) \quad \frac{2}{|s|} \quad (2) \quad \frac{1}{|s|} \quad (1)$$

57. المستوى منسوب إلى معلم $(m, 0, i)$

(Δ) و (γ) هما التمثيلان البيانيان للدالتين

$$ta : s \leftrightarrow -s + 3 ; ha : s \leftrightarrow \frac{2}{s}$$

1) عين إحداثيات نقط تقاطع (Δ) و (γ)

2) أنشيء في المعلم $(m, 0, i)$ (Δ) و (γ)

58. نفس الأسئلة إذا كان :

$$ta : s \leftrightarrow 2s + 1 ; ha : s \leftrightarrow \frac{1}{s}$$

نفس الأسئلة إذا كان :

$$ta : s \leftrightarrow 2s + 1 ; ha : s \leftrightarrow \frac{1}{|s|}$$

60. أدرس ومثل بيانيا الدالة المعرفة كما يلي :

$$ta(s) = \frac{2}{s} \text{ إذا كان } s > 0$$

$$\text{و } ta(0) = 0$$

$$\text{و } ta(s) = s + 1 \text{ إذا كان } s < 0$$

61. ١) أنشيء . في المستوى المنسوب إلى معلم (م . و . ي) المنحني (٢) الممثل

$$\frac{1}{\text{للداة : } S \leftrightarrow \frac{S}{2}}$$

2) ط عدد حقيقي أكبر من ١ . (و) مستقيم معادلته $U = \frac{s}{2} + t$

عِين إحداثيات نقط تقاطع (٢) و (و)

3) نسمى أ و س نقطتي تقاطع (٢) و (و)

عِين إحداثي النقمة ي متصرف [أ ب]

ما هي مجموعة النقط ي عندما يتغير ط في المجال $[1, + \infty)$

62. ١) المستوى منسوب إلى معلم (م . و . ي) $\leftarrow \leftarrow$

عِين العددين الحقيقيين x و y حتى تتحيز القطatan $A(-1, 3)$

$W = \left(\frac{1}{2}, -3 \right)$ إلى المنحني (٢) الذي معادلته

$$U = \frac{x}{s} + y$$

نقطة إحداثياها (٠ ، ٠) في المعلم (م . و . ي)

2) أكتب معادلته المنحني (٢) في المعلم (م . و . ي)

3) أنشيء (٤) في المعلم (م . و . ي)

3) أ . ب . حثلاث نقط متغيرة في المستوى بحيث تكون هذه النقط رؤوس

متوازية مساحتها M

سب . بالامتر . الطول للصلب [أ س] بلالة الطول س العمود

مسيق بالصلب [أ ب]

ادرس الدالة $S \rightarrow U$ و أنشيء تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم
(م . و . ي)

64. (ذ) نصف دائرة قطرها $[AB]$ حيث $A = 6$ (يؤخذ الستيمتر وحدة للأضوال)

(ـ) و (Δ_2) هما الماسان للقوس (ـ) في النقطتين ـ ، ب على الترتيب .
ـ نقطة متغيرة على (ـ) مختلفة عن ـ و ب .

الماس (Δ) للقوس (ـ) في النقطة ـ يقطع الماسين (Δ_1) و (Δ_2)
في النقطتين ك ، ل على الترتيب

نضع $AK = s$ ، $BL = u$

1) يُبين أن : $s = 9$

2) شكل جدول تغيرات الدالة $s \leftarrow u$ و أنشيء تمثيلها البياني في المستوى
المنسوب إلى المعلم (م ، و ، ي)

65. المستوى منسوب إلى معلم (م ، و ، ي). حاملا محوريه (s', s)
و (u', u)

ط عدد حقيقي غير معبدوم

$s' = u'$ معادلة قطع زائد ؛ ـ ، ـ نقطتان مماثلتان من هذا القطع الزائد .
فاصلتها ـ ط ، $\frac{3}{2}$ ط على الترتيب

1) يُعين معادلة للمستقيم (ـ)

2) نسمي ـ و ب نقطتي تقاطع المستقيم (ـ) مع (s', s) و (u', u)
أثبت أن للقطعتين $[AB]$ و $[C\Delta]$ نفس المنتصف ي وأن النقطة ي تغير على
مستقيم ثابت عندما يتغير ط في ح *

66. تحت درجة حرارة ثابتة ، جداء الضغط ض في الحجم ح لكتلة غازية معلومة
ثبت

تملاً هذه الكتلة ، تحت درجة حرارة التجربة ، حجا قدره 30 سم^3 وتحت
ضغط 1 بار
أدرس الدالة $H \leftarrow P$ ض و أنشيء تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم
(م ، و ، ي)

الباب التاسع

التحويلات النقطية

- 32. التحويلات النقطية في المستوى
التناظر بالنسبة الى مستقيم
- 33. الانسحاب والتحاكي

يعالج في هذا الباب موضوع التحويلات النقطية في المستوى وهو خاص بشعبى الرياضيات والرياضيات التقنية .

يكتشف التلميذ من خلال هذه الدراسة وجهاً جديداً للهندسة ووسائل تساعدة في حل عدة مسائل هندسية (دراسة أشكال هندسية ، البحث عن مجموعة نقط ، الإنشاءات الهندسية ...) .

التحويلا^تن النقاطية في المستوى
التناظر بالنسبة إلى مستقيم

32

1 - التحويلا^تن النقاطية في المستوى .

1.1 تعريف

نسمى تحويلا^تن نقاطيا في المستوى كل تطبيق لمجموعة نقط من المستوى في مجموعة نقط من المستوى .

- إذا كانت M' صورة M بالتحويل L نكتب : $M' = L(M)$ ونقول إن النقطة M' هي محوّلة النقطة M بالتحويل L .
 - إذا كانت (L) مجموعة نقط M فإن مجموعة النقطة M' التي هي صور النقط M بالتحويل L تسمى صورة (L) أو محوّل (L) بالتحويل L .
 - إذا كان L تطبيقاً تقابلياً نقول إن L تحويل نقطي تقابلية وإن التطبيق L^{-1} هو التحويل العكسي للتحويل L ويكون لدينا :
- $$M' = L(M) \iff M = L^{-1}(M')$$

أمثلة :


1) M نقطة من المستوى .

التناظر بالنسبة إلى النقطة M
تحويل نقطي .

فهو تطبيق للمستوى في نفسه يرافق بكل نقطة M' النقطة M' بحيث تكون النقطة M متنصف القطعة $[MM']$.

هذا التحويل تقابلية .

2) (و) و (د) مستقيمان متقطعاً عن المستوي .



الإسقاط على (و) وفق منحى (د) تحويل نقطي . فهو تطبيق للمستوي في نفسه يرفق بكل نقطة d' النقطة d التي هي نقطة تقاطع المستقيم (و) مع المستقيم الذي يوازي (د) ويشمل النقطة d .

هذا التحويل غير متبادر وغير غامر .

3) المستوى منسوب إلى معلم (m, o, i) التطبيق للمستوى في نفسه الذي يرفق بكل $d'(s', u')$ النقطة $d(s, u)$ حيث $[s' = s + 1, u' = u - 2]$ تحويل نقطي .

لدينا :

$$\left\{ \begin{array}{l} s' = s + 1 \\ u' = u - 2 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} s = s' - 1 \\ u = u' + 2 \end{array} \right.$$

وهذا يعني أن هذا التحويل تقابل و تحويله العكسي هو التطبيق للمستوى في نفسه الذي يرفق بكل $d(s', u')$ النقطة $d(s, u)$ حيث $[s = s' - 1, u = u' + 2]$.

4) التطبيق المطابق للمستوى الذي يرفق بكل نقطة d النقطة d نفسها تحويل نقطي .

يسمى هذا التطبيق التحويل المطابق وهو تقابل .

5) π مستوى اختيرت عليه واحدة للأطوال .
 م نقطة من π : ك عدد حقيقي غير معروف : و π^* مجموعة نقط π
 باستثناء النقطة م .

التطبيق من π^* في نفسه الذي يرفق بكل نقطة م النقطة σ'
 حيث $M \sigma M' = \sigma'$ تحويل نقطي يسمى تعاكسا .
 وهو تحويل تقابلية للمجموعة π^* في نفسها .

2.1 التحويل التضامني :

يكون التحويل النقطي تا تضامنا إذا وفقط إذا كان تا تقابلها ومساويها
 تحويله العكسي T^{-1} .
 إذن :

إذا كان تا تحويلا نقطيا تقابلها فإن :

$$تا \text{ تضامني} \Leftrightarrow تا = T^{-1}$$

أمثلة :

- . التمازن بالنسبة إلى نقطة تحويل تضامني .
- . تحويل المطابق تحويل تضامني .
- . التعاكس تحويل تضامني .

3.1 تركيب تحويلين نقطيين :

تا و ها تحويلان نقطيان في المستوى .

التحويل المركب من التحويلين تا و ها . بهذا الترتيب . هو التطبيق

المركب ها ° تا .

$$\begin{aligned} \text{علم أن } (ها ° تا) (\sigma) &= \text{ها} [تا (\sigma)] \\ \sigma' &= \text{تا} (\sigma) \xrightarrow{\text{ها}} \sigma'' = \text{ها} (\sigma') = \text{ها} [\text{تا} (\sigma)] \end{aligned}$$

↑
[ها ° تا]

4.1 - التقايس :

التقايس هو تحويل نقطي يرافق بكل ثنائية نقطية $(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ الثنائية
النقطية $(\mathcal{C}'_1, \mathcal{C}'_2)$ حيث :

$$\mathcal{C}'_1 \mathcal{C}'_2 = \mathcal{C}_1 \mathcal{C}_2$$

نقول إنه يحافظ على المسافات .

مثال :

التحويل المطابق و التناظر بالنسبة إلى نقطة هما تقاييسان .

5.1 - النقط الصامدة :

تكون نقطة \mathcal{C} صامدة في تحويل نقطي L إذا وفقط إذا انطبقت L على صورتها

$$\mathcal{C} \text{ صامدة بالتحويل } L \iff L(\mathcal{C}) = \mathcal{C}$$

• النقط الصامدة تدعى أيضا النقط المضاعفة .

مثال :

• النقط الصامدة في الإسقاط العمودي على المستقيم (\mathcal{V}) هي نقط المستقيم (\mathcal{V})

• النقطة M هي النقطة الصامدة الوحيدة في التناظر بالنسبة إلى M

• كل نقطة من المستوى صامدة في التحويل المطابق .

6.1 - تمرين محلول

- المستوي منسوب إلى معلم (m, ω, \vec{v}).
 تا تحويل نقطي. يرقق بكل نقطة $\mathcal{D}(s, u)$ النقطة
 $\mathcal{D}'(s', u')$ حيث : $s' = 3u - 2s$ و $u' = u$
- 1) أثبت أن التحويل تا تقابلي وأوجد تحويله العكسي تا⁻¹.
 - 2) عين مجموعة النقط الصامدة في التحويل تا.
 - 3) (Δ) مستقيم معادله $u = 2s + 1$. ما هي صورة (Δ) بالتحويل تا؟.

(1) لدينا :

$$\left\{ \begin{array}{l} s' = 3u - 2s \\ u' = u \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} s = \frac{1}{2}(s' + 3u') \\ u = \frac{1}{2}(s' - s') \end{array} \right.$$

إذن كل نقطة $\mathcal{D}'(s', u')$ لها سابقة واحدة بالتحويل تا هي النقطة
 $\mathcal{D}(s, u)$ حيث :

$$s = \frac{1}{2}(s' + 3u') \quad u = \frac{1}{2}(s' - s')$$

التحويل تا تقابلي وتحويله العكسي هو التحويل الذي يرقق بكل نقطة
 $\mathcal{D}'(s', u')$ النقطة $\mathcal{D}(s, u)$ حيث :

$$s = \frac{1}{2}(s' + 3u') \quad u = \frac{1}{2}(s' - s')$$

(2) $\mathcal{D}(s, u)$ صامدة \Leftrightarrow تا(\mathcal{D}) = \mathcal{D}

$$\left\{ \begin{array}{l} s = 3u - 2s \\ u = u \end{array} \right. \Leftrightarrow$$

$$u = s \Leftrightarrow$$

إذن مجموعة النقاط الصامدة في التحويل Δ' هي مجموعة نقط المستقيم ذي المعادلة $u = s$.

(3) $\Delta(s, u)$ نقطة كيفية من المستوى صورتها $\Delta'(s', u')$

$$\text{نعلم أن: } s = \frac{1}{2}(-s' + 3u') \quad \text{و} \quad u = u'$$

لدينا :

$$1 + \left[1 - \frac{1}{2}(-s' + 3u') \right] 2 \Leftrightarrow u = 2s + 1 \Leftrightarrow u = s + 1$$

$$u = s + 1 \Leftrightarrow u = \frac{1}{2}(s - 1)$$

إذن صورة المستقيم الذي معادلته $u = 2s + 1$ هي المستقيم (Δ')

$$\text{الذي معادلته } u = \frac{1}{2}(s - 1).$$

2 - التماز بال بالنسبة إلى مستقيم :

1.2 - تعريف و خواص :

(و) مستقيم في المستوى


التماز بال بالنسبة إلى المستقيم (و) هو التحويل النقطي الذي يرافق بكل نقطة Δ' النقطة Δ بحيث يكون المستقيم (و) محور القطعة

[$\Delta \Delta'$]

* التماز بال بالنسبة إلى مستقيم هو تحويل تقابل و بالإضافة إلى ذلك فهو تضامني.

- النقط الصامدة في التناظر بالنسبة إلى مستقيم (φ) هي نقط المستقيم (φ)
- التناظر بالنسبة إلى مستقيم يحافظ على المسافات . إنه تفاس .

2.2 - التعريف التحليلي :
المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس حاملا محوريه (s, s') و (u, u') .



• من الواضح أن :
التناظر بالنسبة إلى المستقيم (s, s') هو التحويل القطبي الذي يرفق بكل نقطة $P(s, u)$ النقطة $P'(s', u')$ حيث .

$$s' = s + u' = -u$$

التناظر بالنسبة إلى المستقيم (u, u') هو التحويل القطبي الذي يرفق بكل نقطة $P(s, u)$ النقطة $P'(s', u')$ حيث :

$$s' = -s + u' = u$$

• التماز بالنسبة إلى مستقيم (ω) يوازي (u' , u)

لتكن $s = s_0$ معادلة (ω) .

تكون النقطة $M'(s', u')$

صورة النقطة $M(s, u)$ في


التماز بالنسبة إلى (ω) إذا

و فقط إذا كان المستقيم (ω)

محور القطعة $[M M']$ وهذا يعني

أن النقطة $M(s_0, u)$ هي

متصف القطعة $[M M']$



$$\text{أي : } \frac{1}{2}(s + s') = s_0 \quad \text{و} \quad \frac{1}{2}(u + u') = u$$

$$\text{أي } s' = 2s_0 - s \quad \text{و} \quad u' = u$$

• التماز بالنسبة إلى مستقيم (ω) يوازي (s', s)

لتكن $u = u_0$ معادلة (ω) .

تكون النقطة $M'(s', u')$

صورة النقطة $M(s, u)$ في


التماز بالنسبة إلى (ω) إذا

و فقط إذا كان المستقيم (ω)

محور القطعة $[M M']$ وهذا يعني

أن النقطة $M(s, u_0)$ هي

متصف القطعة $[M M']$



$$\text{أي : } \frac{1}{2}(s + s') = s \quad \text{و} \quad \frac{1}{2}(u + u') = u_0$$

$$\text{أي : } s = s' \quad \text{و} \quad u = 2u_0 - u'$$

3.2 - صور بعض الأشكال الهندسية :

التناظر بالنسبة إلى مستقيم (φ) هو تقابس .

لذلك فإن صورة أي شكل هندسي هو شكل هندسي يقابسه .

• صورة قطعة مستقيم :

صورة القطعة [$A'B'$] هي القطعة
[$A'B'$] حيث A' و B' هما صورتا A و B .

• صورة دائرة :

صورة دائرة (ω) هي دائرة (ω')
تقابسها ومركز (ω') هو صورة
مركز (ω)

• صورة مستقيم :

صورة مستقيم (Δ) هي مستقيم (Δ').
يكون المستقيمان (Δ) و (Δ')

متوازيين إذا كان (Δ) و (φ)
متوازيين ويكون (Δ) و (Δ')
متناطعين في النقطة M من (φ)

إذا كان (Δ) قاطعاً للمستقيم (φ) في M .



(Δ) و (Δ') يحققان المساواة

التالية :

$$(\overline{\Delta} : \overline{\varphi}) = (\overline{\varphi} : \overline{\Delta})$$

4.2 تطرين ملول

أ و ب نقطتان ثابتان من نفس نصف المستوى المحدد بالمستقيم (هـ). هـ نقطة من (هـ).

عِيْن النقطة هـ حتى يكون للمثلث أ بـ هـ أصغر محبيط ممکن.

يكون للمثلث أ بـ هـ أصغر محبيط ممکن إذا وفقط إذا كانت للمجموع ($أ هـ + بـ هـ$) أصغر قيمة ممکنة.

لتكن $أ'$ نظيرة النقطة $أ$ بالنسبة إلى المستقيم (هـ).

$$\text{لدينا: } أ هـ = أ' هـ$$


ومنه :

$$أ هـ + بـ هـ = أ' هـ + بـ هـ$$

نعلم أن أصغر قيمة للمجموع $(أ' هـ + بـ هـ)$ هي التي نحصل عليها عندما تكون النقطة $أ'$ بـ هـ على إستقامة واحدة.

إذن :

يكون للمثلث أ بـ هـ أصغر محبيط ممکن عندما تكون النقطة $أ'$ بـ هـ على إستقامة واحدة.



1 - الانسحاب :

1.1 - تعريف و خواص :

ش شعاع للمستوى

الانسحاب الذي شعاعه $\overleftarrow{ش}$ هو التحويل النقطي الذي يرفق . بكل نقطه $\overleftarrow{د}$ من المستوى . النقطة $\overleftarrow{د}$ من المستوى بحيث : $\overleftarrow{د} = \overleftarrow{ش}$

من التعريف نستنتج الخواص التالية

1) النقط الصامدة بالانسحاب الذي شعاعه $\overleftarrow{ش}$ هي النقط $\overleftarrow{د}$ التي تحقق $\overleftarrow{د} = \overleftarrow{ش}$

إذا كان $\overleftarrow{ش} \neq \overleftarrow{0}$ فلا توجد أية نقطة صامدة

إذا كان $\overleftarrow{ش} = \overleftarrow{0}$ فإن كل نقطه من المستوى صامدة .

الانسحاب الذي شعاعه $\overleftarrow{0}$ هو التحويل المطابق .

2) من التكافؤ $\overleftarrow{د} = \overleftarrow{ش} \Leftrightarrow \overleftarrow{د} = \overleftarrow{ش}$ نستنتج أن لكل نقطه $\overleftarrow{د}$ من المستوى سابقة وحيدة $\overleftarrow{د}$ بالانسحاب الذي شعاعه $\overleftarrow{ش}$ وهذا يعني أن كل انسحاب هو تحويل تقابلی والتحويل العکسی للانسحاب الذي شعاعه $\overleftarrow{ش}$ هو الانسحاب الذي شعاعه $(-\overleftarrow{ش})$

3) إذا كانت $\overrightarrow{أ}'$ و $\overrightarrow{ب}'$ صورتي النقطتين $\overrightarrow{أ}$ و $\overrightarrow{ب}$ بانسحاب شعاعه $\overleftarrow{ش}$ فإن :

$\overrightarrow{أ}' = \overrightarrow{ب}' \Leftrightarrow \overleftarrow{ش}$

من المساواة $\overrightarrow{أ}' = \overrightarrow{ب}' \Leftrightarrow \overrightarrow{ش}$ نستنتج $\overrightarrow{أ} = \overrightarrow{ب}$

إذن :

صورة كل ثنائية نقطية $(\overrightarrow{أ} . \overrightarrow{ب})$ بانسحاب هي ثنائية نقطية $(\overrightarrow{أ}' . \overrightarrow{ب}')$ حيث $\overrightarrow{أ}' = \overrightarrow{أ} \overleftarrow{ش}$

ومن المساواة $\overleftarrow{AB} = \overleftarrow{A'B'}$ نستنتج $\overleftarrow{AB} = \overleftarrow{A'B'}$
إذن الانسحاب تحويل نقطي يحافظ على المسافات إنه تقابس

2.1 - التعريف التحليلي :

المستوى منسوب إلى معلم (M) و $\overset{\leftarrow}{\text{ش}}(\alpha, \beta)$ شعاع للمستوى

نعلم أنه إذا كانت $\overset{\leftarrow}{(S, U)}$ صورة النقطة $\overset{\leftarrow}{(s, u)}$ بالانسحاب
الذي شعاعه $\overset{\leftarrow}{\text{ش}}$ فإن: $\overset{\leftarrow}{\text{ش}} = \overset{\leftarrow}{\text{ش}}$ وهذا يعني أن

$\begin{cases} S' - S = \alpha \\ U' - U = \beta \end{cases}$
لأن مركبتي $\overset{\leftarrow}{\text{ش}}$ هما $(S' - S, U' - U)$
إذن:

الانسحاب الذي شعاعه $\overset{\leftarrow}{\text{ش}}(\alpha, \beta)$ هو التحويل النقطي الذي يرفق
بكل نقطة $\overset{\leftarrow}{(S, U)}$ النقطة $\overset{\leftarrow}{(s, u)}$ بحيث يكون:

$$\overset{\leftarrow}{S} = S + \alpha \quad \text{و} \quad \overset{\leftarrow}{U} = U + \beta$$


3.1 - صور بعض الأشكال الهندسية :


بما أن الانسحاب تقابس فإن صورة

كل شكل هندسي هي شكل
هندسي يقابسه

- صورة قطعة مستقيم


صورة القطعة $[AB]$ هي القطعة
 $[A'B']$ حيث A' و B' هما صورتا
 A و B و $\overset{\leftarrow}{AB} = \overset{\leftarrow}{A'B'}$





• صورة دائرة :


صورة دائرة (ω) هي دائرة (ω') تقابيسها ومركز (ω') هو صورة مركز (ω)



• صورة مستقيم :

صورة مستقيم (ω) هي مستقيم (ω') يوازيه

4.1 - مركب تنازرين بالنسبة إلى مستقيمين متوازيين :



(ω) ، (ω') مستقيمان متوازيان
أ نقطة من (ω) و ω' ، مسقطها
العمودي على (ω). الشعاع $\omega\omega'$
شعاع ثابت (الشكل)

تا التنازل بالنسبة إلى المستقيم (ω)
وتا التنازل بالنسبة إلى المستقيم
(ω'). لندرس التحويل المركب
تا. إذا كانت ω نقطة من
المستوى و ω' صورتها بالتنازل تا فإن :

$$\omega' = \overleftarrow{\omega} \quad (1) \text{ حيث } \omega \text{ هي المسقط العمودي للنقطة } \omega \text{ على}$$

(ω) وكذلك إذا كانت ω' صورة ω بالتنازل تا فإن

$$\omega'' = \overleftarrow{\omega} \quad (2) \text{ حيث } \omega'' \text{ هي المسقط العمودي للنقطة } \omega$$

على (ω')

من (1) و (2) نستنتج أن : $\omega'' = \overleftarrow{\omega} + \overleftarrow{\omega} = 2\overleftarrow{\omega}$
أي $\omega'' = 2\overleftarrow{\omega}$

لدينا :

$\overrightarrow{HH'} = \overrightarrow{AA'}$ لأنه من الواضح أن الرباعي $AH'HA$ مستطيل
إذن :

التحول T \circ المركب من التاظرين T و T' هو تحويل يرافق بكل نقطة P
النقطة P' حيث $\overleftarrow{PP'} = \overleftarrow{AA'}$.
 فهو انسحاب شعاعه $\overleftrightarrow{AA'}$.

5.1 - تمرين محلول :


(٦) دائرة مركزها M ونصف قطرها sh . (Q) مستقيم
 \leftarrow
شعاع.

عين نقطة A من (٦) ونقطة A' من (Q) بحيث يكون $\overleftrightarrow{AA'} = sh$

التحليل :

نفرض أن النقطتين A ، A' موجودتان . من $\overleftrightarrow{AA'} = sh$
نستنتج أن A' هي صورة A بالانسحاب الذي شعاعه sh
بهذا الانسحاب صورة الدائرة (٦)

هي الدائرة (Q') التي نصف قطرها
 \leftarrow
بعو ومركزها M' حيث $M' M = sh$
بما أن $A \in (Q)$ فإن $A' \in (Q')$.
من $A' \in (Q')$ و $A' \in (Q)$ نستنتج
أن : $A' \in (Q) \cap (Q')$



الإنشاء :

إذا كانت المجموعتان (Q) و (Q') متقاطعتين وكانت A' إحدى نقطتا
تقاطعهما فإن الثانية النقطية (A, A') حيث $\overleftrightarrow{AA'} = sh$ هي حل للمسألة

المناقشة :

- إذا كان (m) قاطعاً للدائرة (γ') فإن المسألة تقبل حلّين
- إذا كان (m) مماساً للدائرة (γ') فإن المسألة تقبل حلاً واحداً
- إذا كان (m) خارج الدائرة (γ') فإن المسألة لا تقبل أي حلّ

2 - التحاكي :

1.2 - تعريف وخصائص :

م نقطة ثابتة من المستوى ، ك عدد حقيقي غير معروف .

التحاكي الذي مرکزه m ونسبة k هو التحويل النقطي الذي يرافق

$$\text{بكل نقطة } m \text{ النقطة } m' \text{ حيث } m' = k m$$

نرمز إلى التحاكي الذي مرکزه m ونسبة k بالرمز $\text{Ha}(m, k)$
من التعريف نستنتج الخواص التالية

1) إذا اطبقت Ha على m تتطبق Ha على m' وإذا اختلفت m عن m' فإن
النقط m, m' على استقامة واحدة . بالإضافة إلى ذلك فإنه :

إذا كان $k < 0$ تكون m خارج m' : $m > m'$

القطعة $[m m']$ وإذا كان

$k < 0$ تكون m بين m و m' $k < 0$: $m < m' < m$

2) النقط الصامدة بالتحاكي $\text{Ha}(m, k)$ هي النقط m التي تتحقق

$$m = k m' \text{ أي } (1 - k)m = 0 \quad (1)$$

إذا كان $k \neq 1$ فإن المساواة (1) تكتب $m = 0$ و النقطة m هي النقطة
الصامدة الوحيدة بالتحاكي $\text{Ha}(m, k)$

إذا كان $k = 1$ فإن كل نقطة m من المستوى تتحقق (1) وهذا يعني أن
كل نقطة من المستوى صامدة بالتحاكي $\text{Ha}(m, k)$

التحاكي $\text{Ha}(m, 1)$ هو التحويل المطابق

$$3) \text{ بما أن } k \neq 0 \text{ فإن } \overleftarrow{m} = \overleftarrow{k} \overleftarrow{m} \Leftrightarrow \overleftarrow{m} = \frac{1}{k}$$

من هذا التكافؤ نستنتج أن التحاكي $\text{Ha}(m, k)$ تقابل وتحويله

$$\text{العكسي هو التحاكي } \text{Ha}\left(m, \frac{1}{k}\right)$$

4) حسب ما سبق يكون التحاكي $\text{Ha}(m, k)$ تضامنها إذا وفقط إذا

$$\text{كان : } 1 = \frac{1}{k} \text{ أي } k^2 =$$

$$\text{أي } k = 1 \text{ أو } k = -1$$

التحاكي $\text{Ha}(m, 1)$ هو التحويل المطابق
والتحاكي $\text{Ha}(m, -1)$ هو التناظر بالنسبة إلى النقطة m

5) إذا كانت a, b صوري نقطتين a, b بالتحاكي

$$\text{Ha}(m, k) \text{ فإن : } \overleftarrow{m} = k \overleftarrow{a} \\ \overleftarrow{m-b} = k \overleftarrow{a-b}$$

من المساواتين السابقتين نستنتج

$$\overleftarrow{m-b} - \overleftarrow{m} = k \overleftarrow{m-b} - k \overleftarrow{m} \\ = k(\overleftarrow{m-b} - \overleftarrow{m})$$

$$\text{أي } \overleftarrow{b-a} = k \overleftarrow{a-b}$$

إذن :

صورة كل ثنائية (a, b) بالتحاكي $\text{Ha}(m, k)$ هي الثنائية
 (a', b') حيث $\overleftarrow{a'} = k \overleftarrow{a}$

بالاضافة إلى ذلك فإن المساواة $\overleftarrow{a'} = k \overleftarrow{a}$ تستلزم
 $|a'| = |k| |a|$ ومنه :

إذا كان $|k| \neq 1$ فإن التحاكي $\text{Ha}(m, k)$ ليس تقابل

2.2 - التعريف التحليلي :

المستوي منسوب إلى معلم (M_0, ω_0)
 $M_0(S_0, U_0)$ نقطة ثابتة من المستوي. k عدد حقيقي غير معروف
 نعلم أنه إذا كانت $M'(S', U')$ صورة النقطة $M(S, U)$
 بالتحاكي حا (M_0, k) فإن $M' = k M$ وهذا يعني أن :

$$\left. \begin{array}{l} S' - S_0 = k (S - S_0) \\ U' - U_0 = k (U - U_0) \end{array} \right\}$$

لأن مركبتي M' هما $(S' - S_0, U' - U_0)$
 ومركبتي M هما $(S - S_0, U - U_0)$
 التحاكي حا (M, k) هو التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة
 $M(S, U)$ النقطة $M'(S', U')$ حيث :

$$S' - S_0 = k (S - S_0) \quad \text{و} \quad U' - U_0 = k (U - U_0)$$

3.2 - صور بعض الاشكال الهندسية :

• صورة قطعة مستقيم :

صورة قطعة $[AB]$ هي القطعة

$[A'B']$ حيث A' و B' هما صورتا A و B بالفعل :

إذا كانت M نقطة من المستوي و M'


صورتها فإن :

$$M \in [AB] \Leftrightarrow \lambda E \Leftrightarrow A \overset{\lambda}{\sim} M \overset{\lambda}{\sim} B$$


$$[A'B'] \in \lambda E \Leftrightarrow A' \overset{\lambda}{\sim} M' \overset{\lambda}{\sim} B'$$

$$(لأن A' \overset{\lambda}{\sim} M' = k A \overset{\lambda}{\sim} M \overset{\lambda}{\sim} B' = k B')$$


وهذا يعني أن : $M' \in [A'B']$



• صورة مستقيم



• صورة دائرة :




- تهارين محلولة :

- ١) (٢) و (٢') دائرتان متماستان خارجيا في النقطة A'
 ب و H' نقطتان متمايزتان من (٢) و مختلفتان عن A'
 M' و H' نقطتا تقاطع الدائرة (٢') مع المستقيمين ($A'B$) و
 $(A'H)$ على الترتيب
 أثبت أن المستقيمين (MH) و ($M'H'$) متوازيان

ليكن M مركز الدائرة (٢) و M' مركز الدائرة (٢')

بالتحاكى حا $\left(\begin{matrix} M' & \\ A & M \end{matrix} \right)$ صورة M هي M' وصورة (٢) هي (٢')



صورة النقطة B من (٢) هي
 نقطة من (٢') على استقامة واحدة
 مع A . فهي إذا النقطة B' .
 كذلك صورة النقطة H من (٢)
 هي نقطة من (٢') على استقامة
 واحدة مع H . فهي النقطة H'
 اذن :

صورة المستقيم (MH) بالتحاكى حا $\left(\begin{matrix} M' & \\ A & M \end{matrix} \right)$ هي المستقيم
 $(M'H')$ ونعلم أن صورة مستقيم بتحاك هو مستقيم يوازيه :
 ومنه : $(MH) \parallel (M'H')$

2) (٥) دائرة و (٥') مستقيم خارج الدائرة (٥).

A و B نقطتان ثابتتان من المستقيم (٥')


C نقطة متغيرة من (٥)

عين مجموعة النقطة H بحيث يكون H مركز ثقل المثلث ABC

بما أن Δ ثابتان فإن المتصف ي للقطعة $[AB]$ ثابت


$$\text{نعلم أن: } \overleftarrow{y} = \frac{1}{3} \overleftarrow{x}$$

إذن:



٣. (P) و (P') مستقيمان متلقاطعان. M نقطة ثابتة حيث
 $M \neq (P)$ و $M \neq (P')$.

أنشئ مستقيما يشمل M ويقطع (P) و (P') في النقطتين
 P و P' على الترتيب وبحيث يكون: $\overleftarrow{PP'} = 2\overleftarrow{PM}$



الإنشاء :

نشيء المستقيم $(\text{ه}')$ صورة المستقيم (ه) بالتحاكي $\text{Ha}(\text{م}، 3)$
بما أن المستقيمين (ه) و (Δ) متلقعان فإن $(\text{ه}')$ و (Δ) يتلقعان
في نقطة $\text{م}'$

نقطة التلقاء $\text{م}'$ لل المستقيمين (ه) و $(\text{م}\text{م}')$ هي سابقة النقطة $\text{م}'$
بالتحاكي $\text{Ha}(\text{م}، 3)$. فهي تتحقق المساواة $\text{م}' = \text{م}^3 \neq \text{م}^2 \text{م}'$
وبالتالي تتحقق المساواة $\text{م}' = 2\text{م}'$
إذن المسألة تقبل دوما حلّاً وحيداً.

تمارين

التحوليات النقطية في المستوى - التماز بالنسبة إلى مستقيم

1. (و) و (د) مستقمان من المستوى (π) متوازيان تماماً. هـ نقطة من (و).

$$\text{نضع } (\pi^*) = (\pi) - (و)$$

تا التحويلي النقطي الذي يرفق بكل نقطة \mathfrak{P} من (π^*) نقطة تقاطع المستقيمين

$$(و) \text{ و } (د)$$

1) هل التحويلي تا غامر؟

2) هل توجد نقط صامدة بالتحويلي تا؟

2. (و) و (د) مستقمان متتقاطعان من المستوى

$$(و) \text{ دائرة مركزها م}$$

تا الإسقاط على (و) وفق منحى (د)

1) هـ نقطة من (و). ما هي صورتها؟ بالتحويلي تا؟

هل توجد نقطة أخرى من (و) لها نفس الصورة؟؟

2) ما هي صورة الدائرة (و) بالتحويلي تا؟

ما هي صورة المركز م بالتحويلي تا؟

3. المستوى منسوب إلى معلم (م، و، ي)

تا التحويلي النقطي في المستوى الذي يرفق بكل نقطة \mathfrak{P} (س، ع) النقطة

$\mathfrak{P}'(س'، ع')$ حيث :

$$\left. \begin{array}{l} س' = 2س + 3ع - 1 \\ و' = س + 5ع \end{array} \right\}$$

$$ع' = 3س + 5ع$$

1) أوجد صور النقاط التالية : (1، 1)، (0، 2)، (-1، 1) :

$$\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{2} \right)$$

2) أثبت أن التحويل تا تقابلية . عين تحويله العكسي تا-

3) أوجد مجموعة النقط الصامدة

4. المستوى منسوب إلى معلم ($m, \overset{\leftarrow}{w}, \overset{\leftarrow}{y}$)

تا التحويل النقطي في المستوى الذي يرفق بكل نقطة $\overset{\leftarrow}{n} (s, u)$ النقطة $\overset{\leftarrow}{n}' (s', u')$ حيث :

$$\left. \begin{aligned} s' &= \frac{1}{3}(s + 4u - 4) \\ w & \\ u' &= \frac{1}{3}(2s - u + 4). \end{aligned} \right\}$$

1) بين أن التحويل تا تقابلية

2) بين أن مجموعة النقط الصامدة بالتحويل تا هي مستقيم (v)

3) n نقطة من المستوى w صورتها بالتحويل تا
أثبتت أن منتصف القطعة $[n n']$ يتبع إلى (v) وأن الشعاع $\overset{\leftarrow}{n}$ يوازي
شعاعا ثابتا يطلب تعينه

5. المستوى منسوب إلى معلم ($m, \overset{\leftarrow}{w}, \overset{\leftarrow}{y}$)

تا التحويل النقطي في المستوى الذي يرفق بكل نقطة $\overset{\leftarrow}{n} (s, u)$ النقطة $\overset{\leftarrow}{n}' (s', u')$ حيث :

$$\left. \begin{aligned} s' &= -3s + 4u - 12 \\ w & \\ u' &= -\frac{3}{2}s + 2u - 4 \end{aligned} \right\}$$

1) بين أنه توجد نقطة صامدة وحيدة بالتحويل تا

2) أثبت أنه منها كانت النقطة n من المستوى فإن صورتها n' تتبع إلى مستقيم ثابت يطلب تعينه

3) أثبت أنه إذا كانت n نقطة غير صامدة بالتحويل تا و n' صورتها فإن منتصف $[n n']$ يتبع إلى مستقيم ثابت
استنتج طريقة لإنشاء النقطة n' .

$$\begin{aligned}
 & 6. \text{ المستوي منسوب إلى معلم } (m, \omega, \dot{\gamma}) \\
 & \text{تا التحويل النقطي في المستوى الذي يرفق بكل نقطة } \overset{\leftarrow}{\delta} (s, u) \text{ النقطة} \\
 & \overset{\leftarrow}{\delta} (s', u') \text{ حيث :} \\
 & \left. \begin{array}{l} s' = 2s + 3u \\ \omega \\ u' = 3s + 10u \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

- 1) بين أن التحويل تا تقابلي ، عين تحويله العكسي
- 2) عين مجموعة النقط الصامدة بالتحويل تا
- 3) بين أن مجموعة النقط $\overset{\leftarrow}{\delta}$ من المستوى حيث $m, \omega, \dot{\delta}$ على استقامة واحدة هي اتحاد مستقيمين .

$$\begin{aligned}
 & 7. \text{ المستوي منسوب إلى معلم متعمد ومتجانس } (m, \omega, \dot{\gamma}) \\
 & \text{تا التحويل النقطي في المستوى الذي يرفق بكل نقطة } \overset{\leftarrow}{\delta} (s, u) \text{ النقطة} \\
 & \overset{\leftarrow}{\delta} (s', u') \text{ حيث :} \\
 & \left. \begin{array}{l} s' = 2s + 3u \\ \omega \\ u' = s + 2u \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

- ط. عدد حقيقي ω ممستقيم معادله $u - \omega s = 0$
- 1) بين أن صورة $\overset{\leftarrow}{\delta}$ بالتحويل تا هي ممستقيم $\overset{\leftarrow}{\delta}$ يشمل النقطة m .
احسب بدلالة ط معامل توجيه الممستقيم $\overset{\leftarrow}{\delta}$

$$\text{عين معادلة الممستقيم } \overset{\leftarrow}{\delta} \text{ عندما يكون } \omega = -\frac{2}{3}$$

- 2) أوجد العدد الحقيقي ω الذي يكون من أجله $\overset{\leftarrow}{\delta}$ و $\overset{\leftarrow}{\delta}'$ متعاددين
- 3) عين قيمى العدد ω بحيث يكون $\overset{\leftarrow}{\delta}$ و $\overset{\leftarrow}{\delta}'$ متطابقين .

$$\begin{aligned}
 & 8. \text{ المستوي منسوب إلى معلم } (m, \omega, \dot{\gamma}) \\
 & \text{ا، ب، ج، د أعداد حقيقة}
 \end{aligned}$$

$$\text{تا التحويل النقطي في المستوى الذي يرفق بكل نقطة } \Delta(S, U) \text{ النقطة } \Delta'(S', U') \text{ حيث:} \\ \left. \begin{array}{l} S' = AS + BU \\ U' = HS + DU \end{array} \right\}$$

عَيْنُ الأَعْدَادِ الْحَقِيقِيَّةِ A, B, H, D الَّتِي تَكُونُ مِنْ أَجْلِهَا النَّقْطَةُ $\Delta(1, -1)$ صَامِدَةٌ وَتَكُونُ النَّقْطَةُ $\Delta'(0, 2)$ صُورَةُ النَّقْطَةِ $\Delta(2, 0)$ بِالتحويمِ تا.

9. المستوى منسوب إلى معلم (M, ω, \vec{Y}) ، حاملا محوريه (S', S) و (U', U) .

تا التمازن بالنسبة إلى (S', S)
 $(\Delta) \text{ و } (\Delta')$ مستقيمان معادلتاهما على الترتيب:
 $S - U = 0 \text{ و } S + 2U - 2 = 0$
 بين أنه توجد ثنائية نقطية وحيدة (Δ, Δ') بحيث يكون:
 $\Delta(\Delta) = \Delta' \text{ و } \Delta' = \Delta(\Delta')$

الأنسحاب :

10. اب ح مثلث .

" $A(S, U)$ " صورة $A(B, H)$ بالانسحاب الذي شاعره $A(B)$.
 "B(H)" صورة $A(B, H)$ بالانسحاب الذي شاعره $B(H)$.
 أثبت أن H هو منتصف القطعة $[A(H)]$.

11. المستوى منسوب إلى معلم (M, ω, \vec{Y}) .

تا التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة $\Delta(S, U)$ النقطة $\Delta'(S')$ حيث:

$$S = S - 4 \quad \omega \quad U = U + 2 .$$

حدّ التحويل تا .

12. المستوي منسوب إلى معلم ($\overset{\leftarrow}{m}$, $\overset{\leftarrow}{o}$, $\overset{\leftarrow}{y}$).
 (Δ_1) و (Δ_2) مستقيمان معادلاتها ، على الترتيب :
 $3s + 2u = 5$ و $3s - 2u = 1$

ما هما صورتا (Δ_1) و (Δ_2) بالانسحاب الذي شعاعه $\overset{\leftarrow}{s}$ ؟

13. المستوي منسوب إلى معلم ($\overset{\leftarrow}{m}$, $\overset{\leftarrow}{o}$, $\overset{\leftarrow}{y}$).
 (Δ) و (Δ') مستقيمان معادلاتها على الترتيب :
 $2s + 3u = 0$ و $4s + 6u = 5$
(1) بين أن (Δ) و (Δ') متوازيان .
(2) عين مركبتي الشعاع $\overset{\leftarrow}{s}$ الموازي للشعاع $\overset{\leftarrow}{u}$ بحيث يكون (Δ') صورة (Δ) بالانسحاب الذي شعاعه $\overset{\leftarrow}{s}$.
(3) نفس السؤال إذا كان $\overset{\leftarrow}{s}$ يوازي الشعاع $\overset{\leftarrow}{y}$.

14. $\overset{\leftarrow}{a}$ و $\overset{\leftarrow}{b}$ نقطتان ثابتتان و $\overset{\leftarrow}{s}$ شعاع غير معروف .
عين مجموعة النقط $\overset{\leftarrow}{c}$ وبمجموعتها النقط $\overset{\leftarrow}{d}$ من المستوى
 بحيث يكون : $(\Delta') // (\Delta)$ و $\overset{\leftarrow}{c} = \overset{\leftarrow}{s}$.

15. $\overset{\leftarrow}{a}$ و $\overset{\leftarrow}{b}$ نقطتان ثابتتان من المستوى .
عين التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة $\overset{\leftarrow}{c}$ من المستوى النقطة $\overset{\leftarrow}{d}$ ، في كل
حالة من الحالتين التاليتين :
1) الرباعي $\overset{\leftarrow}{a} \overset{\leftarrow}{b} \overset{\leftarrow}{c} \overset{\leftarrow}{d}$ متوازي أضلاع .
2) الرباعي $\overset{\leftarrow}{a} \overset{\leftarrow}{b} \overset{\leftarrow}{c} \overset{\leftarrow}{d}$ متوازي أضلاع .

16. $\overset{\leftarrow}{a}$ و $\overset{\leftarrow}{b}$ نقطتان ثابتان من المستوى .
 (Δ) مستقيم ثابت . $\overset{\leftarrow}{c}$ نقطة متغيرة من (Δ) .
نسمى $\overset{\leftarrow}{a}'$ نظيرة $\overset{\leftarrow}{a}$ بالنسبة إلى $\overset{\leftarrow}{b}$ و $\overset{\leftarrow}{c}$ منتصف القطعة $[a'b]$.
عين مجموعة النقط $\overset{\leftarrow}{c}'$.


17. أ و ب نقطتان ثابتان من المستوى .
 ج و د عدادان حقيقيان موجبان تماماً .
 ج و د نقطتان متغيرتان من المستوى بحيث يكون الرباعي ABCD شبه منحرف ويكون $\alpha = \angle A$: $\beta = \angle C$.
 عين مجموعتي النقطتين ج و د .
18. أ نقطة ثابتة من المستوى .
 د دائرة تشمل النقطة أ . نصف قطرها ثابت ومركزها م متغير .
 1) عين مجموعة النقط م .
 2) (د) و (د') مماسان للدائرة د في النقطتين ج و د منحاجهما منحى مستقيم (ه) ثابت .
 عين مجموعتي النقطتين ج و د' .
19. (د) و (د') مستقيمان متقاطعان .
 أ و ب نقطتا ثابتان .
 أنشيء نقطة د من (د) ونقطة د' من (د') بحيث يكون الرباعي ABCD متوازي أضلاع .
20. د دائرة مركزها م ونصف قطرها نو .
 ش شعاع معلوم .
 أنشيء نقطتين أ و ب من الدائرة د بحيث يكون $\overline{AB} = \overline{Sh}$
21. د و د' دائرتان من المستوى . (ه) مستقيم ثابت .
 أنشيء مستقيما (د) يوازي (ه) ويقطع د و د' في النقط
 أ . ب . أ' . ب' : على الترتيب . بحيث يكون $\overline{AB} = \overline{A'B}$.
22. أ ب ح مثلث . أنشيء خارج هذا المثلث المربع م ح د ه .
 نسمي أ' المسقط العمودي للنقطة أ على (بـه) و د' المسقط العمودي للنقطة
 د على (أـب) و ه' المسقط العمودي للنقطة ه على (أـد) .
 أثبت أن نقطة تقاطع المستقيمين (دـه') و (هـه') تتبع إلى (أـأ') .

23. نهر حافاته متوازيتان .

أ و ب قريتان من جهتين مختلفتين
بالنسبة لهذا النهر .

نريد إنجاز طريق يربط بين القريتين أ
و ب ويقطع النهر عمودياً .

عينَ النقطة A' من الشكل المجاور
بحيث يكون طول هذا الطريق أصغر ما يمكن .



التحاكي :

24. نعتبر التحويل النقطي α لل المستوى في نفسه الذي يرفق بكل نقطة

$\alpha(s, u)$ النقطة $\alpha(s', u')$ حيث $s' = 3s - 4$ و $u' = 3u + 2$

1) عين إحدائي النقطة A' صورة النقطة $A(1, 2)$ بالتحويل α .

2) عين إحدائي النقطة B سابقة النقطة $B(-2, 0)$ بالتحويل α .

3) أثبتت أنه توجد نقطة وحيدة صامدة بالتحويل α .

4) أثبتت أن التحويل α تحاكي يطلب تعين مركزه ونسبته .

25. المستوي منسوب إلى معلم (M, ω, γ) . (Δ) مستقيم معادله

$2s + u - 5 = 0$. حا التحاكي الذي مركزه $(-3, 1)$ ونسبة 4 .

أوجد معادلة لصورة المستقيم (Δ) بالتحاكي حا .

26. A, B, A', B' أربع نقاط من المستوى حيث $(AB) // (A'B')$.

1) برهن أنه إذا كان $AB \neq A'B'$ فإنه يوجد تحاكيان مختلفان ،

بحيث تكون القطعة $[A'B']$ صورة القطعة $[AB]$. عين مركزي هذين التحاكيين .

2) ادرس الحالة $AB = A'B'$.

27. (ω) دائرة مركزها M . A نقطة داخل الدائرة (ω) و $A \neq M$.

نرق بـ كل نقطة P من (ω) النقطة P' التي هي المسقط العمودي للنقطة M على

المستقيم (AM) والنقطة H التي هي مركز ثقل المثلث AMP .

عين مجموعتي النقطتين P' و H عندما تتغير P على (Δ) .

28. أ ب ح مثلث حيث تكون النقطتان ب و ح ثابتتين والنقطة أ متغيرة من مستقيم (Δ) معلوم .

عِين المجموعات التالية :

1) مجموعة منصفات القطع [أ ب]

2) مجموعة منصفات القطع [أ ح]

3) مجموعة منصفات القطع [ب ح] حيث ب و ح هما منصفا [أ ب] و [أ ح] .

4) مجموعة مراكز ثقل المثلثات أ ب ح .

29. أ ب ح مثلث و أ' متصل [ب ح] .

نفرض أن النقطتين ب و ح ثابتان والنقطة أ متغيرة بحيث يكون طول القطعة [أ' ح] ثابتة .

ما هي مجموعة النقط أ؟

عِين المجموعات التالية :

1) مجموعة النقط ب منصفات القطع [أ ح]

2) مجموعة النقط ج منصفات القطع [أ ب]

3) مجموعة النقط د منصفات القطع [ب ح] .

30. (Δ) و (Δ') مستقيمان متتقاطعان . أ و ه نقطتان مختلفتان أنشيء مثلثا أ ب ح بحيث تكون ب نقطة من (Δ) وتكون ح نقطة من (Δ') ويكون ه مركز ثقل المثلث أ ب ح .

31. أ ب ح مثلث . (Δ) مستقيم .

أنشيء مثلثا أ ب ح متوايس الأضلاع بحيث يكون :

أ' إ [ب ح] ; ب إ [ح أ] ; ح إ [أ ب] و (ب ح) // (Δ) .

32. أ ، ب و م ثلات نقط من المستوى .
تا الانسحاب الذي شاعره $\overleftarrow{أ ب}$.

حا التحاكي الذي مركزه م و نسبته 2
ها التحويل المركب حا $^{-1}$ ° تا ° حا .

- 1) أنشيء صور النقط α ، β ، γ بالتحويلها .
- 2) أثبت أن التحويل γ انسحاب يطلب تعين شعاعه .
33. المستوي منسوب إلى معلم (α, β, γ) .
- تا الانسحاب الذي شعاعه ش (α, β, γ) .
- ها التناظر بالنسبة إلى حامل المخور (α, β, γ) .
- 1) أنشيء صور النقط $\alpha = (-2, 0)$ ، $\beta = (0, 3)$ بالتحويل المركب لها γ .
- 2) هل توجد نقط صامدة بالتحويل لها γ ؟
34. 1 و 2 نقطتان ثابتان من المستوى .
- 1) تا التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة γ من المستوى النقطة γ' مركز المسافات المتناسبة للنقطة α ، β ، γ المرفقة بالمعاملات $(+1), (-1), (+2)$ على الترتيب .
- بيان أن تا انسحاب يطلب تعين شعاعه .
- 2) حا التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة γ من المستوى النقطة γ' مركز المسافات المتناسبة للنقطة α ، β ، γ المرفقة بالمعاملات $(+1), (+2), (+3)$ على الترتيب .
- أثبت أن حا تحالف مركزه متصرف القطعة $[\alpha, \beta]$.
- ما هي نسبة هذا التحالف ؟
- 3) α, β, γ : γ ثلاثة أعداد حقيقة حيث $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$.
- ل التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة γ من المستوى النقطة γ' مركز المسافات المتناسبة للنقطة α ، β ، γ المرفقة بالمعاملات α, β, γ على الترتيب :
- خرين التحويل، ل في كل حالة من الحالتين التاليتين :
- $$\bullet \quad 0 = \beta + \alpha$$
- $$\bullet \quad 0 \neq \beta + \alpha$$

الباب العاشر

المهندسة الفضائية

- 34. المستويات والمستقيمات في الفضاء
- 35. التوازي في الفضاء
- 36. التعماد في الفضاء

تُغَالِجُ فِي هَذَا الْبَابِ الْمَفَاهِيمُ الْأَسَاسِيَّةُ فِي الْمَهَنْدِسَةِ الْفَضَائِلِيَّةِ (الْمَسْتَوَيَّاتُ ، الْمَسْتَقِيمَاتُ وَأَوْضَاعُهُنَّ النَّسِيبِيَّةُ ، التَّوَازِيُّ وَالتَّعَامِدُ فِي الْفَضَاءِ)

تُقْدِمُ هَذِهِ الْمَفَاهِيمُ بِطَرِيقَةٍ بَسيِّطةٍ وَبِالْاعْتِمَادِ عَلَى رَسُومَاتٍ وَتَمَارِينٍ مُتَنَوِّعَةٍ تُسَمِّحُ لِلتَّلَمِيذِ تَصُورَ الْأَشْكَالِ فِي الْفَضَاءِ .

الْفَقَرَاتُ التَّالِيَّةُ ، لَيْسَ مَقْرَرَةً فِي بَرَنَامِجِ شَعْبَةِ الْعِلُومِ : الْمَسْتَوَيُّ الْمُحْوَرِيُّ لِقَطْعَةِ مَسْتَقِيمٍ ، مَقَارِنَةُ أَطْوَالِ الْقَطْعَيْنِ الْوَاصِلَيْنِ بَيْنَ نَقْطَتَيْهِنَّ . وَتَعْتَدِنُ نَقْطَةٌ مَسْتَوٍ ، زَوَالِيَا الثَّانِيَّةِ .

المستويات والمستقيمات في الفضاء

34

1. الفضاء ، المستوى ، المستقيم


1.1 - الفضاء :

رأينا في السنوات السابقة كيف تمثل بعض الأجسام بالورق المقوى : المكعب ، الهرم ، متوازي المستويات ... هذه الأجسام أجزاء من الفضاء ، وكل نقطة من هذه الأجسام هي نقطة من الفضاء .
الفضاء هو مجموعة غير منتهية من النقط

2.1 - المستويات :

• طبقة ماء في حالة السكون تعطينا فكرة عن المستوى


• يمثل كل وجه من أوجه مكعب جزءاً من مستوى مثلاً ، الوجه α في الشكل المجاور يمثل جزءاً من المستوى الذي يشمل النقط A, B, C, D .



الشكل 1

المستوى مجموعة غير منتهية من النقط وهو جزء من الفضاء مختلف عنه .

• يمثل كل مستو (ط) بمتوازي أضلاع (الشكل 2)



الشكل 2

و $(F_1) \cup (\text{ط})$ نصف فضاء مفتوحاً

ويسمى كل من $(F_1) \cup (\text{ط})$

و $(F_2) \cup (\text{ط})$ نصف فضاء مغلقاً


3.1 - المستويات والمستقيمات في الفضاء .

للمستويات والمستقيمات في الفضاء الخواص التالية:


- 1) إذا كانت α ، β نقطتين مختلفتين فإنه يوجد مستقيم وحيد يشمل
النقطتين α ، β

- 2) إذا كانت α ، β ، γ ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة فإنه
يوجد مستوى وحيد يشمل النقطة α ، β ، γ (الشكل 3)

- 3) إذا كان مستوى (δ) ولمستقيم (φ) نقطتان مشتركتان مختلفتان فإن
 (δ) يحتوي على (φ) . (الشكل 4)



(الشكل 4)




(الشكل 3)

4.1 - تعيين المستوى .


من الخواص السابقة نستنتج ما يلي :

يكون مستوى معيناً بإعطاء:


- ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة (الشكل 5)
- مستقيم ونقطة لا تتبع إلى هذا المستقيم (الشكل 6)
- مستقيمين متتقاطعين (الشكل 7)



(الشكل 7)



(الشكل 6)



(الشكل 5)

2 - الأوضاع النسبية لمستقيم ومستوى .


(و) مستقيم و (ط) مستوى.

لدينا ثلاثة حالات ممكنة

1) (و) و (ط) لها نقطتان مشتركتان . في هذه الحالة نقول إن (و) محتوا في (ط) . (الشكل 8)

2) (و) و (ط) لها نقطة مشتركة واحدة . في هذه الحالة نقول إن (و) يقطع (ط) . (الشكل 9)

3) (و) و (ط) ليست لهما أية نقطة مشتركة .
في هذه الحالة نقول إن (و) و (ط) متوازيان تماماً (الشكل 10)



3 - الأوضاع النسبية لمستقيمين

(و₁) و (و₂) مستقيمان في الفضاء .

لدينا الحالات التالية

1) (و₁) و (و₂) لها نقطتان مشتركتان متباينتان :
فهما متطابقان

2) (و₁) و (و₂) لها نقطة مشتركة واحدة : فهما متتقاطعان


3) (و₁) و (و₂) ليست لهما أية نقطة مشتركة :

لتكن أ نقطة من (و₁)

النقطة أ والمستقيم (و₂) يعینان مستوياً (ط)

• إذا كان (و₁) ⊂ (ط) نقول إن (و₁) و (و₂) متوازيان تماماً
(الشكل 11)

- إذا كان (ف_1) يقطع $(ط)$ نقول إن (ف_1) و (ف_2) ليسا في مستوى واحد (الشكل 12)



خلاصة ما سبق :

إذا كان (ف_1) و (ف_2) مستقيمين في الفضاء فإنها


- إما متطابقان
- وإنما مقاطعان
- وإنما متوازيان تماما
- وإنما ليسا في مستوى واحد

4 - الأوضاع النسبية لمستويين


$(ط_1)$ و $(ط_2)$ مستويان

- إذا كانت للمستويين $(ط_1)$ و $(ط_2)$ ثلاث نقاط مشتركة ليست على استقامة واحدة فإن المستويين $(ط_1)$ و $(ط_2)$ متطابقان
- إذا كان $(ط_1)$ و $(ط_2)$ متبايزين وكانت لها نقطتان مشتركتان متبايزتان α و β فإن تقاطعهما هو المستقيم $(\alpha \beta)$
- نقول إن $(ط_1)$ و $(ط_2)$ مقاطعان (الشكل 13)
- إذا كان المستويان $(ط_1)$ و $(ط_2)$ متبايزين وكانت لها نقطة مشتركة α فإن تقاطعهما هو مستقيم يشمل النقطة α ونقول أيضا إنها مقاطعان .

- إذا كان $(ط_1)$ و $(ط_2)$ منفصلين نقول إنها متوازيان تماماً
- (الشكل 14)



(الشكل 14)



(الشكل 13)

خلاصة ما سبق :

إذا كان $(ط_1)$ و $(ط_2)$ مستويين فإنها

• إما متطابقان

• وإما متتقاطعان

• وإنما متوازيان تماماً

5 - رباعي الوجوه :

أ، ب، ح، د أربع نقاط ليست في مستوى واحد
تعين هذه النقط أربعة مستويات : (أ ب ح)، (أ د ح)،
(أ ب د)، (ب د ح) وتحدد هذه المستويات الأربعة ، جسماً يسمى

رباعي وجوه (الشكل 15)

النقط أ، ب، ح، د هي رؤوسه

القطع [أ ب] ، [أ د] ،


[ب ح] ، [أ د] ، [ب د] ،

ح د هي أحرفه

أجزاء المستويات المحددة بالمثلثات

أ ب ح، أ د ح، أ ب د،

ب د ح ، هي وجوه رباعي الوجوه



(الشكل 15)

تمرين محلول :

[م س) ، [م ع) ، [م ص) أنصاف مستقيمات ليست في مستوى واحد . ١ و ٢' نقطتان متمايزتان من [م س)
ب و ب' نقطتان متمايزتان من [م ع) ، ح و ح' نقطتان متمايزتان من [م ص)

- 1) يَبْيَّنُ أَنَّ الْمُسْتَقِيمَيْنَ (أَب) و (أَب') مُتَقَاطِعَانَ أَوْ مُتَوَازِيَانَ
 - 2) نَفْرُضُ أَنَّ الْمُسْتَقِيمَاتَ (أَب) ، (أَب') ، (بَح) مُتَقْطِعَاتٍ
- الْمُسْتَقِيمَاتَ (أَب') ، (أَب') ، (بَح') فِي النَّقْطَيْنَ δ ، β ، α
عَلَى التَّرْتِيبِ


- أَثْبَتَ أَنَّ النَّقْطَيْنَ α ، β ، γ تَعِينُ مُسْتَوِيَاً وَأَنَّ النَّقْطَيْنَ α' ، β' ، γ' تَعِينُ مُسْتَوِيَاً وَأَنَّ هَذِيَنِ الْمُسْتَوِيَيْنِ مُخْتَلِفَانِ
- أَثْبَتَ أَنَّ النَّقْطَيْنَ α ، β ، γ عَلَى إِسْتِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ

الحل :

- 1) الْمُسْتَقِيمَانِ المُتَقَاطِعَانِ (م س) ، (م ع) يَعْيَّنُانِ مُسْتَوِيَاً .
الْمُسْتَقِيمَانِ (أَب) و (أَب') مُحْتَوِيَانِ فِي هَذَا الْمُسْتَوِيِّ . فَهُمَا، إِذَاً

إِما مُتَقَاطِعَانِ وَإِما مُتَوَازِيَانِ

- 2) النَّقْطَيْنَ α ، β ، γ لَيْسُوا عَلَى إِسْتِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ γ نَقْطَةً مِنْ (أَب') لَكَانَتْ γ نَقْطَةً مِنْ الْمُسْتَوِيِّ (م ب')
- وَبِالْتَّالِي تَكُونُ الْمُسْتَقِيمَاتُ (م ب') ، (م ب) ، (م ح) فِي مُسْتَوِيٍّ وَاحِدٍ وَهَذَا يَنَاقِضُ الْفَرْضِ



وبنفس الطريقة يمكن الإثبات على أن α' ، β' ، γ' ليست على
استقامة واحدة
إذن :

١ ، β ، γ تعيّن مستويات α' ، β' ، γ' تعيّن مستويات آخر
• المستقيم $(\alpha \beta \gamma)$ يقطع المستوى $(\alpha' \beta' \gamma')$ في النقطة α .
بما أن α و α' مختلفتان فالنقطة α لا تنتمي إلى المستوى $(\alpha' \beta' \gamma')$
إذن المستويان $(\alpha \beta \gamma)$ و $(\alpha' \beta' \gamma')$ مختلفان .
النقطة α تنتمي إلى المستقيمين $(\beta \gamma)$ و $(\beta' \gamma')$ فهي نقطة
مشتركة للمستويين $(\alpha \beta \gamma)$ و $(\alpha' \beta' \gamma')$
كذلك النقطتان β و β' مشتركتان لهذين المستويين .
المستويان $(\alpha \beta \gamma)$ و $(\alpha' \beta' \gamma')$ مختلفان ولها نقطة مشتركة فهما
متقاطعان وتتقاطعهما مستقيم يشمل النقط α ، β ، γ
إذن : α ، β ، γ على استقامة واحدة .

التوازي في الفضاء

35

1 - المستقيمات المتوازية

1.1 - تعريف

يتوازى مستقيمان في الفضاء إذا و فقط إذا كانوا متطابقين أو كانوا في مستوى واحد ومنفصلين

- إذا توازى مستقيمان وكأنهما منفصلين نقول إنهم متوازيان تماما
- في الهندسة المستوية إذا كان مستقيمان منفصلان فإنهما متوازيان ، بينما في الهندسة الفضائية هذا غير صحيح إذ يمكن أن يكون مستقيمان منفصلان دون أن يكونا متوازيين
- مستقيمان متوازيان تماما يعنيان مستويان .

2.1 - نظرية 1

إذا كان (ω) مستقيما وكانت Ω نقطة من الفضاء فإنه يوجد مستقيم وحيد يشمل Ω ويوازي (ω)

البرهان


بالفعل

?

(ق)

- إذا كانت $\Omega \in (\omega)$ فإن (ω) هو المستقيم الوحد الذي يشمل Ω ويوازي (ω) .

(الشكل 17)



(الشكل 18)

- إذا كانت $\Omega \notin (\omega)$ فإن (ω) و Ω يعنيان مستويان (ط) ونعلم أنه يوجد في (ط) مستقيم وحيد يشمل Ω ويوازي (ω) .


3.1 - نظرية 2

إذا كان (w_1) و (w_2) مستقيمين متوازيين وكان (ط) مستويًا يقطع (w_1) فإن (ط) يقطع أيضًا (w_2)

البرهان :

(w_1) و (w_2) مستقيمان متوازيان و (ط) مستو حيث $\{\text{ط}\} \cap \{w_1\} = \{\text{أ}\}$

• إذا كان (w_1) و (w_2) متطابقين فإنه من الواضح أن $\{\text{ط}\} \cap \{w_2\} = \{\text{أ}\}$



• إذا كان (w_1) و (w_2) متوازيين تماماً فإنها يعینان مستوى (ط') يختلف عن المستوى (ط)

بما أن (ط) و (ط') لها نقطة مشتركة أ فهما متتقاطعان وتقاطعهما

هو مستقيم (Δ) يقطع (w_2) في النقطة 'أ' لأن (Δ) يقطع (w_1) و $(w_1) // (w_2)$ والنقطة 'أ' مشتركة بين المستقيم (w_2) والمستوى (ط) .

إذن المستوى (ط) يقطع المستقيم (w_2) في النقطة 'أ'

4.1 - نظرية 3

(w_1) ، (w_2) و (w_3) ثلاثة مستقيمات في الفضاء .
إذا كان (w_1) يوازي (w_2) وكان (w_2) يوازي (w_3) فإن (w_1) يوازي (w_3) .

البرهان :

(v_1) ، (v_2) و (v_3) ثلاثة مستقيمات في الفضاء حيث (v_1) // (v_2) و (v_2) // (v_3) لندرس وضعية (v_3) بالنسبة إلى (v_1). لدينا حالتان ممكنتان : [(v_1) و (v_3) منفصلان] و [(v_1) و (v_3) غير منفصلين].

الحالة الأولى : (v_1) و (v_3) غير منفصلين
لتكن Ω نقطة مشتركة بين المستقيمين (v_1) و (v_3) نعلم أنه يوجد مستقيم وحيد يشمل Ω ويوازي (v_2). بما أن المستقيمين (v_1) و (v_3) يشملان النقطة Ω ويوازيان (v_2) فهما متطابقان .

الحالة الثانية : (v_1) و (v_2) منفصلان .
لتكن Ω نقطة من (v_1) و (ط) المستوي المعين بالمستقيم (v_3) وبالنقطة

حسب النظرية السابقة لو كان

(ط) يقطع (v_1) لكن يقطع (v_2)


(v_2) وبالتالي يقطع (v_3) وهذا

يناقض الفرض : (v_3) ⊥ (ط)

إذن (v_1) محتوى في (ط)

بما أن المستقيمين (v_1) و (v_3) منفصلان ومن نفس المستوى

(ط) فهما متوازيان تماماً .



(الشكل 20)

2 - المستويات والمستقيمات المتوازية

1.2 - تعريف :

يكون مستقيم (ω) ومستوى (π) متوازيين إذا وفقط إذا كان (π) و (ω) منفصلين أو كان (ω) محتوا في (π).

إذا كان المستقيم (ω) والمستوى (π) منفصلين نقول إنها متوازيان تماما

2.2 - شرط توازي مستقيم ومستوى :

يكون مستقيم (ω) موازيا لمستوى (π) إذا وفقط إذا كان (ω) موازيا لمستقيم من المستوى (π)


البرهان :

- إذا كان ($\omega \subset \pi$) فإن النظرية واضحة
- نفرض فيما يلي أن (ω) غير محتوا في (π)
1) نفرض أن (ω) يوازي (π)
ونبرهن أنه يوجد في المستوى

(π) مستقيم يوازي (ω).


لتكن A نقطة من (π). (ω) و B يعّدان مستويان (π') مختلفان عن (π) وتتقاطع (π) و (π') هو مستقيم (Δ).

(ω) و (Δ) من نفس المستوى (π') وهما منفصلان لأن (ω) و (π) متوازيان تماما وبالتالي (ω) و (Δ) متوازيان تماما.



(الشكل 21)

2) نفرض أنه يوجد في المستوى (ط) مستقيم $(\text{و}')$ يوازي المستقيم (و) ونبرهن أن $(\text{و}')$ يوازي (ط) . (ق)




(الشكل 22)

لو كان (ط) يقطع $(\text{و}')$ لكان أيضاً يقطع (و) لأن $(\text{و} // \text{و}')$ وهذا ينافي الفرض $(\text{و} // \text{ط})$ إذن $(\text{و}')$ و (ط) متوازيان


3.2 - نتائج :

انطلاقاً من النظرية السابقة يمكن التأكد من التاليتين التاليتين



(الشكل 23)

1. إذا كان مستقيماً $(\text{و}')$ يوازي مستويياً (ط) وكانت Δ نقطة من (ط) فإن المستقيم الذي يوازي $(\text{و}')$ ويشمل Δ محتواً في (ط) .



(الشكل 24)

2. إذا كان مستقيماً يوازي مستويين متقطعين فإنه يوازي مستقيماً تقطعاً بهما

3 - المستويات المتوازية

1.3 - تعريف :

مستويان متوازيان هما مستويان متطابقان أو منفصلان



2.3 - شرط توازي مستويين :

يتوازي مستويان إذا وفقط إذا احتوى أحدهما على مستقيمين متتقاطعين وموازيين لل المستوى الآخر

البرهان :

- إذا كان المستويان متطابقين فإن النظرية واضحة .
- نفرض فيما يلي أن المستويين (ط) و $(\text{ط}')$ مختلفان .
- 1) إذا كان (ط) و $(\text{ط}')$ متوازيين فإن كل مستقيم من (ط) يوازي $(\text{ط}')$.

إذن (ط) يحتوي ، على الأقل ، على مستقيمين متتقاطعين يوازيان $(\text{ط}')$.



2) نفرض أن (ط) يحتوي على مستقيمين (و_1) و (و_2) متتقاطعين موازيين لل المستوى $(\text{ط}')$ و نبرهن أن (ط) و $(\text{ط}')$ متوازيان .
لو كان (ط) و $(\text{ط}')$ متتقاطعين لكن تقاطعهما مستقيما (Δ) .

من $(\text{و}_1) \parallel (\text{ط})$ ومن $(\text{و}_1) \parallel (\text{ط}')$ (الشكل 25)

نستنتج أن $(\text{و}_1) \parallel (\Delta)$

كذلك ، من $(\text{و}_2) \parallel (\text{ط})$ و من $(\text{و}_2) \parallel (\text{ط}')$

نستنتج أن $(\text{و}_2) \parallel (\Delta)$ ويكون ،

عندئذ ، $(\text{و}_1) \parallel (\text{و}_2)$ وهذا ينافي


الفرض : (و_1) و (و_2) متتقاطعان .

إذن (ط) و $(\text{ط}')$ متوازيان .

3.3 - نظرية :


إذا كان $(ط)$ مستوياً وكانت M نقطة من الفضاء فإنه يوجد مستويٌ
وحيد $(ط')$ يوازي $(ط)$ ويشمل M

البرهان :



• وجود $(ط')$:

ليكن $(ف_1)$ و $(ف_2)$ مستقيمين متتقاطعين من المستوى $(ط)$.



المستقيمان (Δ_1) و (Δ_2) اللذان يشتملان النقطة M ويوازيان $(ف_1)$ و $(ف_2)$ متتقاطعان فيها يعینان مستوى $(ط')$ يوازي $(ط)$

(الشكل 26)

• وحدانية $(ط')$:

نفرض أنه يوجد مستوى $(ط'')$ مختلف عن $(ط')$ ويشمل M ويوازي $(ط)$.

المستويان $(ط')$ و $(ط'')$ متتقاطعان وتتقاطعهما مستقيم (Δ)
المستقيمان المتتقاطعان $(ف_1)$ و $(ف_2)$ من $(ط)$ يوازيان (Δ) لأن كلاً
منهما يوازي $(ط')$ و $(ط'')$ وهذا تناقض لأنه لا يوجد مستقيم يوازي
مستقيمين متتقاطعين

إذن $(ط')$ و $(ط'')$ متطابقان وبالتالي $(ط')$ وحيد

4.3 - نظرية :

$(ط_1)$ ، $(ط_2)$ ، $(ط_3)$ ثلاثة مستويات
إذا كان $(ط_1)$ يوازي $(ط_2)$ وكان $(ط_2)$ يوازي $(ط_3)$
فإن $(ط_1)$ يوازي $(ط_3)$


البرهان :

نفرض أن $(ط_1)$ و $(ط_3)$ متقطعان ولتكن A نقطة مشتركة بينهما.
المستويان $(ط_1)$ و $(ط_3)$ مختلفان ويشملان النقطة A ويواذيان المستوي $(ط_2)$


وهذا تناقض مع النظرية السابقة إذن $(ط_1)$ و $(ط_3)$ متوازيان

5.3 - نتائج :


انطلاقاً من النظريات السابقة يمكن التأكد من النتائج التالية



1. إذا كان $(ط_1)$ و $(ط_2)$ مستويين متوازيين وكان $(ط)$ مستوياً يقطع $(ط_1)$ فإن $(ط)$ يقطع $(ط_2)$ تقاطعهما متوازيان.



2. إذا كان $(ط_1)$ و $(ط_2)$ مستويين متوازيين وكان $(و)$ مستقيماً يوازي $(ط_1)$ فإن $(و)$ يوازي $(ط_2)$.



3. إذا كان $(ط_1)$ و $(ط_2)$ مستويين متوازيين وكان $(و)$ مستقيماً يقطع $(ط_1)$ فإن $(و)$ يقطع $(ط_2)$.

تمرين محلول :


أ ب ح د رباعي وجوه ، أ ب ح متصرفات القطع [ب ح] ،
[أ ح] و [أ د] على الترتيب

(1) أثبت أن المستوى المعين بالنقطة أ' ، ب' ، ح' يوازي المستقيمين
(أ ب) و (ح د)

(2) أثبت أن المستوى (أ' ب' ح') يقطع الحرف [ب د] في نقطة (د')
وأن الرباعي أ' ب' ج' د' متوازي أضلاع

الحل :

(1) في المثلث أ ب ح لدينا أ' متصرف [ب ح] و ب' متصرف
[أ ح].



نعلم في هذه الحالة أن
(أ' ب') // (أ ب)

إذن (أ ب) يوازي المستوى
(أ' ب' ح')

لأنه يوازي المستقيم (أ' ب')
من هذا المستوى

كذلك للبيان (ب د) // (ح د)

إذن (ب د) يوازي المستقيم
(أ' ب' ح')

(الشكل 30)

(2) لنبرهن أن المستوى (أ' ب' ح') يقطع المستقيم (ب د).
لو كنا (ب د) يوازي (أ' ب' ح') لكان المستويان (أ ب د) و
(أ' ب' ح') متوازيين لأن (أ ب) يوازي (أ' ب' ح')

ومن ($\text{حد}'$) يوازي ($\text{أ}'\text{ب}'\text{حد}'$) نستنتج أن ($\text{حد}'$) يوازي ($\text{أ}'\text{ب}'\text{د}'$)
وهذا يعني أن $\text{أ}'\text{ب}'\text{، ب}'\text{، ح}'$ تتتمي إلى مستوى واحد وهذا تناقض.
إذن ($\text{أ}'\text{ب}'\text{حد}'$) يقطع ($\text{ب}'\text{د}'$) في نقطة $\text{د}'$.

لبرهن أن $\text{د}'$ هي منتصف [$\text{ب}'\text{د}'$].

المستويات ($\text{أ}'\text{ب}'\text{حد}'$) و ($\text{ب}'\text{حد}'$) متقاطعان وتتقاطعهما هو المستقيم
($\text{أ}'\text{د}'$)

المستقيم ($\text{حد}'$) يوازي كلا من المستويين ($\text{أ}'\text{ب}'\text{حد}'$) و ($\text{ب}'\text{حد}'$)
 فهو إذا يوازي تقاطعهما ($\text{أ}'\text{د}'$)

في المثلث $\text{ب}'\text{حد}'$ لدينا : $\text{أ}'$ منتصف [$\text{ب}'\text{ح}'$] و ($\text{أ}'\text{د}'$) // ($\text{حد}'$)
وهذا يعني أن $\text{د}'$ هي منتصف [$\text{ب}'\text{د}'$] وبما أن $\text{ح}'$ منتصف [$\text{أ}'\text{د}'$] فإن
($\text{ح}'\text{د}'$) // ($\text{أ}'\text{ب}'$).
بما أن $\text{ح}'$ منتصف [$\text{أ}'\text{د}'$] وبما أن $\text{د}'$ منتصف [$\text{ب}'\text{د}'$] فإن

ومن جهة أخرى لدينا :
($\text{أ}'\text{ب}'$) // ($\text{أ}'\text{ب}'$) و ($\text{ب}'\text{ح}'$) // ($\text{حد}'$) و ($\text{أ}'\text{د}'$) // ($\text{حد}'$)
ومنه : ($\text{أ}'\text{ب}'$) // ($\text{ح}'\text{د}'$) و ($\text{أ}'\text{د}'$) // ($\text{ب}'\text{ح}'$)
إذن $\text{أ}'\text{ب}'\text{حد}'\text{، د}'$ متوازي أضلاع .

التعامد في الفضاء

36

1 - المستقيمات المتعامدة في الفضاء

1.1 - تعريف :

(w_1) و (w_2) مستقيمان في الفضاء و م نشطة من الفضاء .
نعلم أنه يوجد مستقيم وحيد (Δ_1) يوازي (w_1) ويشمل م .
كذلك يوجد مستقيم وحيد (Δ_2) يوازي (w_2) ويشمل م .
عندما يكون المستقيمان (Δ_1) و (Δ_2) متعامدين نقول إن (w_1)
و (w_2) متعامدان في الفضاء .

التعريف :


يتعادم ، في الفضاء ، مستقيمان (w_1) و (w_2) إذا وفقط إذا كانوا
موازيين لمستقيمين (Δ_1) و (Δ_2) متقاطعين ومتتعامدين

الترميز : إذا تعاهمد مستقيمان (w_1) و (w_2) في الفضاء

نكتب : ($w_1 \perp w_2$)

ملاحظة :

في الهندسة الفضائية يمكن
لستقيمين أن يكونا متعامدين دون
أن يكونا متقاطعين بينها في الهندسة
المستوية إذا تعاهمد مستقيمان فإنها
يتقاطعان .



(w_2)

(الشكل 31)

١.٢ - نتائج :

يمكن التأكيد من التبيّجتين التاليتين

- ١) (φ_1) و (φ_2) مستقيمان متعامدان في الفضاء .
مما كانت النقطة M من الفضاء فإن المستقيمين اللذين يشملان M و يوازيان (φ_1) و (φ_2) متعامدان .
- ٢) (φ_1) ؛ (φ_2) و (Δ) ثلاثة مستقيمات في الفضاء .
إذا كان $(\varphi_1) // (\varphi_2)$ وكان $(\Delta) \perp (\varphi_1)$ فإن $(\Delta) \perp (\varphi_2)$

٢ - المستقيمات والمستويات المتعامدة

١.٢ - نظرية وتعريف :

(Δ) مستقيم و M نقطة من (Δ)
يوجد في كل مستوى يحتوي على (Δ) مستقيم وحيد يعامد (Δ) في
ليكن (φ_1) و (φ_2) مستقيمين متقاطعين في M و يعماضان (Δ)
يعيّن هذان المستقيمان مستوىيا (ط)
لنبرهن أن (Δ) يعامد كل مستقيم من (ط)
ليكن (φ) مستقيما من (ط)

لدينا حالتان : (φ) يشمل M ، (φ) لا يشمل M


• الحالة الأولى : (φ) يشمل M :

لتكن A و A' نقطتين مختلفتين من (Δ) و متناظرتين بالنسبة إلى M ولتكن
 (φ') مستقيما من (ط) يقطع المستقيمات (φ_1) ، (φ_2) و (φ) في
النقط B ، H ، C على الترتيب

لدينا :

$$A = A' \text{ بـ } \left(\text{ لأن } (\varphi_1) \text{ محور } [AA'] \text{ في المستوى } (AA') \right)$$

$$A = A' \text{ حـ } \left(\text{ لأن } (\varphi_2) \text{ محور } [AA'] \text{ في المستوى } (AA') \right)$$



المثلثان $\triangle ABC$ و $\triangle A'B'C'$ متقابسان

وبالتالي :

$$\widehat{A B} = \widehat{A' B'}$$

$$\text{أي } \widehat{A B C} = \widehat{A' B' C'}$$

$$\text{من } \widehat{A B C} = \widehat{A' B' C'}$$

$$\text{و } \widehat{A B} = \widehat{A' B'}$$

نستنتج أن المثلثين $\triangle ABC$ و $\triangle A'B'C'$ متقابسان وبالتالي $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

المثلث $\triangle ABC$ متساوي الساقين

والمستقيم $(M C)$ هو متوسطه

المتعلق بالقاعدة $[BC]$ فهو إذًا عمودي على (BC) (الشكل 32)

إذن (Δ) يعمد (C)

• **الحالة الثانية :** (C) لا يشمل M

يوجد في المستوى (ط) مستقيم (C') يشمل M ويوازي (C) .

حسب الحالة السابقة (Δ) يعمد (C')

وبما أن (C) يوازي (C') فإن (Δ) يعمد (C)

ومنه النظرية والتعريف التاليين

نظيرية :

إذا كان مستقيماً (Δ) عمودياً على مستقيمين متقاطعين من مستوى

(ط) فإن (Δ) عمودي على كل المستقيمات من (ط)

تعريف :

نقول إن المستقيماً (Δ) عمودي على المستوى (ط) إذا وفقط إذا

كان (Δ) عمودياً على كل المستقيمات من (ط)

إذا كان (Δ) عمودياً على (ط) نقول أيضاً إن (ط) عمودي على (Δ)

2.2 - شرط تعامد مستقيم ومستو :

من النظرية والتعريف السابقين نستنتج النظرية التالية

- نظرية :

يكون مستقيم (Δ) عموديا على مستوى (α) إذا وفقط إذا كان (Δ) عموديا على مستقيمين متتقاطعين من (α)

3.2 - نظريات :


يمكن التأكد من النظريتين التاليتين (انظر إلى القرین رقم 38 والقرین رقم) 39

- نظرية 1 :

إذا كان (Δ) مستقيما وكانت M نقطة من الفضاء فإنه يوجد مستوى وحيد يعمد (Δ) ويشمل M


- نظرية 2 :

إذا كان (α) مستويا وكانت M نقطة من الفضاء فإنه يوجد مستقيم وحيد يعمد (α) ويشمل M




انطلاقا مما سبق نحصل على النتائج التالية

- إذا توازى مستويان فإن كل مستقيم يعمد أحدهما يعمد الآخر




(الشكل 33)




- إذا توازى مستقيمان فإن كل مستوى يعمد أحدهما يعمد الآخر

(الشكل 34)




- إذا عاًمد مستوىان نفس المستقيم فإن هذين المستويين متوازيان

(الشكل 35)



- إذا عاًمد مستقيمان نفس المستوى فإن هذين المستقيمين متوازيان

(الشكل 36)




- يتعامد مستقيمان في الفضاء إذا وفقط إذا كان أحدهما عموديا على مستوى يحتوي على الآخر

(الشكل 37)

٤.٢ - تمرين محلول :

- (ط) مستو و (Δ) مستقيم عمودي على (ط) في النقطة \textcircled{h}
 (و) مستقيم من (ط) لا يشمل \textcircled{h}
 ا نقطة من (Δ) تختلف عن \textcircled{h} و \textcircled{d} نقطة من (و)
 برهن أن : (\textcircled{h}) \perp (و) \iff (\textcircled{d}) \perp (و)

الحل :




(الشكل 38)

- (و) عمودي على (Δ) لأن
 (Δ) عمودي على (ط)
 • إذا كان (\textcircled{h}) عموديا على (و) يكون (و) عموديا على المستقيمين المتقاطعين (\textcircled{d}) و (Δ) وبالتالي يكون (و) عموديا على المستوى (\textcircled{h}).
 إذن : (و) عمودي على (\textcircled{d}).
 إذا كان (\textcircled{d}) عموديا على (و) يكون (و) عموديا على المستقيمين المتقاطعين (\textcircled{d}) و (Δ) وبالتالي يكون (و) عموديا على المستوى (\textcircled{h}).
 إذن (و) عمودي على (\textcircled{h}).

٥.٢ - المستوى الموري لقطعة مستقيم :

تعريف :

ا، ب نقطتان متباينتان ، م منتصف القطعة [اب]
 المستوى العمودي على المستقيم (اب) في النقطة م يسمى المستوى الموري للقطعة [اب]



(الشكل 39)

ملاحظات :

- في المستوى المورى للقطعة $[AB]$ كل مستقيم يشمل منتصف $[AB]$ هو محور للقطعة $[AB]$
- كل محور للقطعة $[AB]$ هو مستقيم من المستوى المورى للقطعة $[AB]$

نتيجة :

في المستوى نعلم أنه إذا كانت A ، B نقطتين متباينتين فإن مجموعة النقط H التي تتحقق المساواة $H = C = B$ هي محور القطعة $[AB]$.
وفي الفضاء لدينا نتيجة مماثلة :
إذا كانت A و B نقطتين متباينتين فإن مجموعة النقط H التي تتحقق المساواة $H = C = B$ هي المستوى المورى للقطعة $[AB]$


3 - مقارنة أطوال القطع الواصلة بين نقطة ومتعددة نقاط مستوى

1.3 - المسافة بين نقطة ومستوى :

(ط) مستوى ، A نقطة من الفضاء ، H نقطة تقاطع (ط) مع المستقيم الذي يشمل A ويعامد (ط)
مما كانت النقطة H من (ط) لدينا : $AH \geq AB$

بالفعل :

- إذا كانت a, b, c متساوية فإن المثلث $A B C$ قائم في H و A وتره



ومنه النتيجة

- إذا كانت نقطتان من النقط
الثلاث a, b, c متطابقين فإن
النتيجة واضحة .

يسمى الطول a بالتعريف
المسافة بين النقطة a والمستوى (P)

(الشكل 40)

2.3 - مقارنة أطوال القطع الواصلة بين نقطة و مختلفة نقطة مستو :

-نظرية :

(P) مستو ، a نقطة من الفضاء ، H نقطة تقاطع (P) مع
المستقيم الذي يشمل a ويعامد (P)
مهمها كانت النقطتان b و c من (P) لدينا :

$$H_b = H_c \Leftrightarrow a_b = a_c$$

$$H_b > H_c \Leftrightarrow a_b > a_c$$

بالشكل :

إذا كان $H_b = H_c = H$ فإن المثلثين القائمين $A B C$ و $A H C$ متساويان ومنه
 $a_b = a_c$

وإذا كان $a_b > a_c$ فإن المثلثين القائمين $A B C$ و $A H C$ مختلفان
وبالتالي $H_b > H_c$

إذن $H_b = H_c \Leftrightarrow a_b = a_c$


• إذا كان $\angle \alpha > \angle \beta$ فإنه توجد

نقطة P' من القطعة β تتحقق المساواة $\angle \alpha = \angle \beta'$ ومنه $\alpha' = \beta'$

وفي المستوى α لدينا : $\angle \beta' > \angle \beta \Leftrightarrow \alpha' > \alpha$
إذن :

$$\angle \alpha > \angle \beta \Leftrightarrow \alpha > \beta$$

(الشكل 41)



4 - المستويات المتعامدة

1.4 - تعريف :


(ط) مستو و (Δ) مستقيم عمودي على (ط)
كل مستو يحتوي على (Δ) يسمى مستويا عموديا على (ط)

التعريف :

يكون مستو (κ) عموديا على مستو (τ) إذا وفقط إذا احتوى (κ) على مستقيم عمودي على (τ)

• إذا كان المستوي (κ) عموديا على المستوي (τ) فإن (κ) يحتوى على مستقيم (Δ) يعampaد (τ).
لتكن M نقطة تقاطع (Δ) و (τ). المستويان (τ) و (κ) متقاطعان وتقاطعهما مستقيم

(و). يشمل M



(الشكل 42)

ليكن (φ') المستقيم من (ℓ) العمودي على (φ) في النقطة M المستقيم (φ') عمودي على المستقيمين المتتقاطعين (Δ) و (φ) من (κ) . فهو عمودي على (κ) إذن المستوى (ℓ) عمودي على المستوى (κ) ومنه النتيجة التالية

إذا كان مستو (κ) عموديا على مستو (ℓ) فإن المستوى (ℓ) عمودي على المستوى (κ) ونقول إن المستويين (κ) و (ℓ) متعامدان

2.4 - نظريات :

1. إذا كان (κ) و (ℓ) مستويين متعامدين وكانت A نقطة من (κ) فإن (κ) يحتوي على المستقيم الذي يشمل A ويعامد ℓ

البرهان :


(ℓ) و (κ) مستويان متعامدان تقاطعهما المستقيم (φ) .

A نقطة من (κ) ، (Δ) مستقيم يشمل A ويعامد (ℓ) .

(Δ') مستقيم من (κ) يشمل A ويعامد (φ) . بما أن المستويين (ℓ) و (κ) متعامدان فإنه يوجد ، في المستوى (ℓ) مستقيم (φ') يعامد المستوى (κ) .

(الشكل 43)

المستقيم (φ') عمودي على كل مستقيم من (κ) فهو عمودي على (Δ')



: لدينا

(Δ') يعَامِد المستقيمين المتتقاطعين (ω) و (ω') فهو إذاً عمودي على المستوى (κ)

المستقيمان (Δ') و (Δ) يشْمَلان النقطة Ω ويَعَامِدُان المستوى (κ) فهما متطابقان

إذن (Δ) \supseteq (κ)

• مما سبق نستنتج أيضا النتيجة التالية

إذا كان (κ) و (κ') مستويين متعامدين وكان (ω) مستقيم تقاطعهما فإن كل مستقيم من (κ) عمودي على (ω) يكون عموديا على (κ')


2. إذا كان (κ) و (κ') مستويين متتقاطعين وكان كل منها عمودياً على مستوى (κ) فإن مستقيم تقاطع (κ) و (κ') يكون عمودياً على (κ)

البرهان :

لتكن Ω نقطة من مستقيم تقاطع (κ) و (κ'). حسب النظرية السابقة كل من (κ) و (κ') يحتوي على المستقيم الذي يشمل Ω ويعَامِد المستوى (κ) .

إذاً هذا المستقيم هو مستقيم تقاطع (κ) و (κ')

(الشكل 44)



3. إذا كان (κ) و (κ') مستويين متوازيين وكان (κ) مستويا

عموديا على (κ) فإن (κ) عمودي على (κ')

البرهان :

بما أن $(ك)$ و $(ط)$ متعامدان فإن $(ط)$ يحتوي على مستقيم عمودي على $(ك)$ وهذا المستقيم عمودي على $(ك')$ لأن $(ك)$ و $(ك')$ متوازيان إذن $(ط)$ عمودي على $(ك')$

(الشكل 45)

4. إذا كان مستقيم $(ف)$ ومستوى $(ط)$ عموديين على نفس المستوى $(ك)$ فإن $(ف)$ و $(ط)$ متوازيان

البرهان :

المستوى $(ط)$ يحتوي على مستقيم (Δ) عمودي على $(ك)$ لأن $(ط)$ و $(ك)$ متعامدان.

المستقيمان $(ف)$ و (Δ) متوازيان لأنهما عموديان على نفس المستوى $(ك)$

إذن $(ف)$ و $(ط)$ متوازيان لأن $(ط)$ يحتوي على المستقيم (Δ) الموازي للمستقيم $(ف)$

(الشكل 46)

5 - الزوايا الثنائية :


1.5 - تعريف :

(ط) و (ك) مستويان متقاطعان

تقاطع نصف فضاء مغلق حده (ط) مع نصف فضاء مغلق حده


(ك) يسمى زاوية ثنائية

- مستقيم تقاطع المستويين (ط) و (ك) يسمى حرف الزاوية الثنائية
- يسمى نصفا المستويين اللذان يحددان زاوية ثنائية وجهي هذه الزاوية الثنائية
- نرمز إلى الزاوية الثنائية التي وجهاها (ط') و (ك') بالرمز [ط' ، ك']
- إذا كان (ط) و (ك) متعامدين نقول إن الزاوية الثنائية قائمة



(الشكل 47)

2.5 - المقطع القائم لزاوية ثنائية :
إذا كانت [ط' ، ك'] زاوية ثنائية حرفها (ف) فإن تقاطعها مع مستو عمودي على (ف) هو زاوية [م س ، مع] حيث $M \perp F$ ،
[م س] \subset (ط') ، [مع] \subset (ك') ، تسمى الزاوية [م س ، مع]
مقطعا قائما لزاوية الثنائية [ط' ، ك']



(الشكل 48)

-تعريف :

يسمى تقاطع زاوية ثنائية مع مستوى عمودي على حرفها مقطعاً قائماً لها

نتائج :

نذكر فيما يلي نتائجتين متعلقتين بالمقاطع القائمة لزاوية ثنائية

1) كل المقاطع القائمة لزاوية ثنائية متقاربة

2) تكون زاويتان ثانية متقاربتين إذا وفقط إذا تفاصي مقطع قائم لإحداهما ومقطع قائم للأخرى


3.5 - المستوى المنصف لزاوية ثنائية :

[ل ، ل'] زاوية ثنائية حرفها (و)

[م س ، م ع] مقطع قائم لها

[م ص] منصف الزاوية [م س ، م ع]

يسمى نصف المستوى (ل') الذي حده (و) ويحتوي على [م ص]
منصف الزاوية الثنائية [ل ، ل']



(الشكل 49)

تمارين

المستويات والمستقيمات في الفضاء

1. (ط) مستو، أ نقطة من (ط) و(Δ) مستقيم في (ط) لا يشمل النقطة
أ. ب نقطة من الفضاء لاتتنتمي إلى (ط).
أثبت أن المستقيمين (Δ) و(أب) ليسا في مستو واحد.
2. (Δ) و(Δ') مستقيمان ليسا في مستو واحد.
أ، ب نقطتان مختلفتان من (Δ).
أ، ب' نقطتان مختلفتان من (Δ').
أثبت أن النقط أ؛ ب؛ أ'؛ ب' ليست في مستو واحد.
3. (Δ) و(Δ') مستقيمان ليسا في مستو واحد.
أ نقطة من (Δ) و أ' نقطة من (Δ').
(Δ) و أ' يعینان مستويان (ط)؛ (Δ') و أ' يعینان مستويان (ط').
عین مستقيم تقاطع المستويين (ط) و (ط').
4. أ، ب، ح، د أربع نقاط ليست في مستو واحد.
1) أثبت أن ثلاثة نقاط منها ليست على إستقامة واحدة.
2) عین عدد المستويات المعينة بالنقط الأربع.
ثم عین مستقيمات تقاطع هذه المستويات مثنى مثني
5. (ط) مستو. (Δ) و(Δ') مستقيمان في (ط) متتقاطعان. د نقطة من الفضاء لاتتنتمي إلى (ط).
(ك) المستوى المعین بالنقطة د والمستقيم (Δ).
(ك') المستوى المعین بالنقطة د والمستقيم (Δ').
عین مستقيم تقاطع المستويين (ك) و (ك').

6. (ط) مستو. (Δ) و (Δ') مستقيمان في (ط) متلاقيان في نقطة α .
 (ج) مستقيم يقطع (ط) في نقطة m مختلف عن α .
 عين مجموعة المستقيمات التي تقطع في آن واحد المستقيمات الثلاثة (Δ ، Δ') و (Δ''). .
7. (Δ) و (Δ') مستقيمان ليسا في مستو واحد .
 α ، β نقطتان من (Δ) و α' ، β' نقطتان من (Δ') .
 أثبتت أن المستقيمين ($\alpha\beta$) و ($\alpha'\beta'$) ليسا في مستو واحد .
8. (ط) مستو. α ، γ نقطتان مختلفتان من (ط) .
 α نقطة لاتنتمي إلى (ط) . m نقطة من المستقيم ($\alpha\beta$) و γ نقطة من المستقيم ($\alpha\gamma$) .
 أثبت أنه إذا قطع المستقيم ($m\gamma$) المستوى (ط) فإنه يقطع المستقيم ($\alpha\gamma$) .
9. $\alpha\beta\gamma\delta$ رباعي في مستو (ط) . نفرض أن $\alpha\beta\gamma\delta$ ليس شبه منحرف .
 m نقطة لاتنتمي إلى (ط) .
 عين مستقيم تقاطع المستويين ($m\alpha$) و ($m\gamma$) .
 ثم مستقيم تقاطع المستويين ($m\alpha$) و ($m\beta$) .
10. $\alpha\beta\gamma\delta$ متوازي أضلاع في مستو (ط) .
 m نقطة لا تنتمي إلى (ط) .
 عين مستقيم تقاطع المستويين ($m\alpha$) و ($m\beta$) .
11. (ط_1) و (ط_2) مستويان متلاقيان و (Δ) مستقيم تقاطعهما .
 α ، β نقطتان مختلفتان من (ط_1) بحيث المستقيم ($\alpha\beta$) يقطع المستقيم (Δ) في النقطة γ .
 m نقطة لا تنتمي إلى المستويين (ط_1) و (ط_2) بحيث يقطع المستقيمان ($\alpha\beta$) و ($m\beta$) المستوى (ط_2) في النقطتين α' ، β' على الترتيب .
 أثبتت أن النقطة الثالثة α' ، β' ، γ على استقمة واحدة .

12. (ط) مستو. (Δ) مستقيم يقطع (ط) في نقطة هـ .
 أ، ب نقطتان من (Δ) و هـ نقطة من الفضاء بحيث يقطع المستقيمان (Δ)
 و (هـ بـ) المستوى (ط) في النقطتين أـ، بـ .
 أثبت أن النقط الثلاث هـ، أـ، بـ على إستقامة واحدة .

13. أـ بـ حـ مثلث في مستو (ط) .
 أـ، بـ، حـ متصفات القطع [بـ حـ] ، [حـ أـ] ، [أـ بـ] على الترتيب .
 هـ نقطة لا تتنمي إلى المستوى (ط) .
 أثبت أن المستويات (دـ حـ)، (دـ بـ)، (دـ حـ) تقاطع حسب
 مستقيم واحد يطلب تعينه .

14. أـ بـ دـ رباعيّ وجوه . مـ منتصف القطعة [أـ دـ] .
 هـ مركز ثقل المثلث أـ بـ حـ .
 • أثبت أن المستقيم (مـ هـ) يقطع المستوى (بـ دـ) في نقطة يـ .
 • أثبت أن الرباعي مـ يـ دـ متوازي أضلاع .

15. أـ بـ دـ رباعيّ وجوه . هـ مركز ثقل المثلث بـ حـ دـ .
 هـ مركز ثقل المثلث أـ دـ .
 أثبت أن المستقيمين (أـ هـ) و (بـ هـ) متقطعان .

16. أـ بـ دـ رباعيّ وجوه . (ط) هو المستوى (بـ دـ) .
 (Δ) مستقيم من (ط) يقطع المستقيمات (بـ حـ)، (حـ دـ)،
 (بـ يـ) في ثلاث نقاط مختلفة . هـ نقطة من القطعة [أـ حـ] .
 (كـ) هو المستوى المعين بالنقطة هـ والمستقيم (Δ) .
 1) عـين مستقيم تقاطع المستوىين (كـ) و (أـ بـ حـ) .
 2) عـين تقاطع المستقيم (أـ بـ) مع المستوى (كـ) .
 3) عـين مستقيم تقاطع المستوىين (كـ) و (أـ بـ دـ) .
 أثبت أن هذا المستقيم يقطع المستقيم (بـ دـ) في نقطة تتنمي إلى (Δ) .

أنتوازي في الفضاء

17. (φ_1) و (φ_2) مستقيمان ليسا في مستوى واحد .
أ) نقطة من (φ_1) و (Δ) المستقيم الذي يشمل α ويواري (φ_2) .
1) أثبت أن المستوى (ط) المعين بالمستقيمين (φ_1) و (Δ) يوازي تماماً (φ_2) .
2) بين أن المستوى (ط) ثابت ، عندما تغير النقطة α في (φ_1) .
18. (φ_1) و (φ_2) مستقيمان ليسا في مستوى واحد . و α نقطة من الفضاء .
أثبت أنه يوجد مستوى وحيد يشمل α ويواري المستقيمين (φ_1) و (φ_2) .
19. (φ) و (Δ) مستقيمان متوازيان من مستوى (ط) .
 (κ) و (κ') مستويان متقاطعان يحتويان على (φ) و (Δ) على الترتيب .
 (Δ') مستقيم تقاطع المستويين (κ) و (κ') .
ما هي وضعية المستقيم (Δ') بالنسبة إلى المستوى (ط) .
20. (ط) و (κ) مستويان متقاطعان و (φ) مستقيم تقاطعها .
 (Δ) مستقيم بحيث (Δ) و (φ) ليسا في مستوى واحد .
و α نقطة من (Δ) .
- 1) ارسم المستويين $(\text{ط}')$ و (κ') اللذين يشملان α ويواريان (ط) و (κ) على الترتيب .
2) أثبت أن $(\text{ط}')$ و (κ') متقاطعان .
- 3) إذا كان (φ') مستقيم تقاطع المستويين $(\text{ط}')$ و (κ') ما هي وضعية المستقيم (φ') بالنسبة إلى كل من (ط) ، (κ) و (φ) ؟
21. (φ) مستقيم يوازي مستوى (ط) .
أ) ب نقطتان مختلفتان من (φ) . م ، β نقطتان من (ط) .
1) أثبت أن المستويين (أ ب م) و (أ ب ط) يقطعان (ط) .
2) إذا كان (Δ) مستقيم تقاطع المستويين (أ ب م) و (ط) وإذا كان (Δ') مستقيم تقاطع المستويين (أ ب ط) و (ط) أثبت أن المستقيمين (Δ) و (Δ') متوازيان .
في أي حالة يتطابق فيها المستقيمان (Δ) و (Δ') ؟

22. أ ب ح د رباعي وجوه .
 أ ب ، ب ح ، د متصرفات القطع [أ ب] ، [ب ح] ، [ح د] ، [د أ]
 على الترتيب .
 أثبت أن الرباعي أ ب ح د متوازي أضلاع .

23. أ ب ح د رباعي وجوه . (ط) مستو يوازي كلا من المستقيمين (أ ب)
 و (ح د) ويقطع المستقيمات (أ ح) ، (أ د) ، (ب د) ، (ب ح) في النقط
 م ، ب ، م' ، ب' على الترتيب .
 بين أن الرباعي م ب م' ب' متوازي أضلاع .

24. (ف) و (ف') مستقيمان ليسا في مستو واحد .
 (Δ) مستقيم لا يوازي (ف) ولا يوازي (ف') .
 أنشئ مستقىما (Δ') يوازي (Δ) ويقطع كلا من (ف) و (ف') .
 25. (ط) مستو ، (Δ) مستقيم و أ نقطة .
 أنشئ مستقىما يشمل أ و يقطع (Δ) و يوازي (ط) .

26. (ط) و (ط') مستويان و أ نقطة .
 أنشئ مستقىما يشمل أ و يوازي (ط) و (ط') .

27. أ ب ، ح ، د أربع نقط من مستو (ط) .
 نفرض أن المستقيمين (أ ب) و (ح د) يتقاطعان في النقطة ك
 وأن المستقيمين (أ د) و (ب ح) يتقاطعان في النقطة ل .
 م نقطة لا تتبع إلى (ط) .

ليكن (ط') مستويًا يقطع كلا من المستقيمات (م أ ب) ، (م ب) ، (م ح د) ،
 (م د) في النقط α ، β ، γ ، λ على الترتيب .
 1) عين مستقيم تقاطع المستويين (م أ ب) و (م ح د) .
 ثم عين نقطة تقاطع المستقيم (م ك) والمستوي (ط') .
 2) كيف يؤخذ المستوى (ط') حتى يكون :
 $(\beta \alpha) // (\lambda \gamma)$ أو $(\lambda \gamma) // (\beta \alpha)$ ؟

3) لتكن \mathfrak{M} نقطة من الفضاء .
 أنشئ المستوى (\mathfrak{T}') الذي يشمل النقطة \mathfrak{M} بحيث يكون الرباعي $\alpha \beta \gamma \delta$ متوازي أضلاع .

28. (\mathfrak{T}) و (\mathfrak{T}') مستويان غير متوازيين .
 أب ح د متوازي أضلاع في (\mathfrak{T}) . ب' ، ح' ، د' أربع نقط من المستوى (\mathfrak{T}') بحيث تكون المستقيمات $(\mathfrak{A}\mathfrak{B}')$ ، $(\mathfrak{B}\mathfrak{D}')$ ، $(\mathfrak{H}\mathfrak{D}')$ ، $(\mathfrak{H}\mathfrak{B}')$ متوازية .

ما نوع الرباعي $\mathfrak{A}'\mathfrak{B}'\mathfrak{H}'\mathfrak{D}'$ ؟

29. أب ح د متوازي أضلاع في مستوى (\mathfrak{T}) .
 م ، \mathfrak{M} نقطتان لا تنتهيان إلى (\mathfrak{T}) بحيث يكون الرباعي $\mathfrak{A}'\mathfrak{B}'\mathfrak{M}\mathfrak{D}$ متوازي أضلاع .
 أثبت أن $(\mathfrak{B}\mathfrak{M}) // (\mathfrak{D}\mathfrak{C})$ وأن $(\mathfrak{B}\mathfrak{C}) // (\mathfrak{M}\mathfrak{D})$.

30. (\mathfrak{T}) و (\mathfrak{T}') مستويان متوازيان تماماً .
 أب ح مثلث في (\mathfrak{T}) . م ، \mathfrak{M} نقطتان متباينتان من (\mathfrak{T}') .
 1) عين مستقيم تقاطع المستويين $(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C})$ و (\mathfrak{T}') .
 2) عين مستقيم تقاطع المستويين $(\mathfrak{A}\mathfrak{H}\mathfrak{M})$ و (\mathfrak{T}') .
 3) عين مستقيم تقاطع المستويين $(\mathfrak{A}\mathfrak{D}\mathfrak{C})$ و $(\mathfrak{A}\mathfrak{H}\mathfrak{M})$.

31. [أس] و [بج] نصفا مستقيمين غير محتويين في نفس المستوى .
 م ، \mathfrak{M} نقطتان حيث : $\mathfrak{M} \in [\text{أـس}]$ ؛ $\mathfrak{M} \in [\text{بـج}]$ ر $\mathfrak{R} = \text{بـج}$
 1) أنشئ المستوى (\mathfrak{T}) الذي يحتوي على [بـج] و يوازي [أـس]
 2) أثبت أن المستقيم الذي يشمل النقطة م و يوازي المستقيم $(\mathfrak{A}\mathfrak{B})$ يقطع المستوى (\mathfrak{T}) في نقطة م' .

عين مجموعة النقط م' عندما تتغير النقطة م في [أـس] .
 3) إذا كانت α ، β ، δ متصفات القطع $[\mathfrak{A}\mathfrak{B}]$ ، $[\mathfrak{M}\mathfrak{M}']$ و $[\mathfrak{M}\mathfrak{D}]$ على الترتيب ، أثبت أن المستوى $(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{M}\mathfrak{D})$ يوازي المستوى (\mathfrak{T}) .

التعامد في الفضاء

32. أ ب ح د ب ح د مكعب

أثبت أن المستقيمين (أ ب) و (ح د) متعامدان
وأن المستقيمين (ب د) و (ح د) متعامدان .

33. (Δ) و (Δ') مستقيمان متتقاطعان في مستوى (ط) .

(ك) و (ك') مستويان عموديان على (Δ) و (Δ') على الترتيب .
أثبت أن المستويين (ك) و (ك') متتقاطعان وأن مستقيم تقاطعهما عمودي على (ط) .

34. (ط) و (ط') مستويان متتقاطعان ومستقيم تقاطعهما (Δ) .

نقطة لا تنتمي إلى المستويين (ط) و (ط') .

المستقيم الذي يشمل أ العمودي على (ط) يقطعه في النقطة ه .

المستقيم الذي يشمل أ العمودي على (ط') يقطعه في النقطة ه' .

1) أثبت أن (Δ) عمودي على المستوى (أ ه ه') .

2) إذا كانت م نقطة تقاطع (Δ) مع المستوى (أ ه ه')

أثبت أن (م) عمودي على (Δ) .

35. (و) و (Δ) مستقيمان متعامدان وغير محتويين في نفس المستوى .

نقطة من (و) ، ه نقطة من (Δ) بحيث يكون (أ ه) عموديا على (Δ) .

أثبت أنه منها كانت النقطة ه من (و) فإن (ه ه) عمودي على (Δ) .

36. (و) و (Δ) مستقيمان متعامدان ومتتقاطعان في النقطة أ .

(و') المستقيم الذي يشمل أ العمودي على المستوى المعين بالمستقيمين (و) و (Δ) .

1) أثبت أن (Δ) عمودي على المستوى (ط) المعين بالمستقيمين (و) و (و') .

2) أثبت أن (ط) هو المستوى الوحيد الذي يحتوي على (و) ويعامد (Δ) .

37. (و) و (Δ) مستقيمان متعامدان وغير محتويين في نفس المستوى .

نقطة من (و) و ه نقطة من (Δ) بحيث : (أ ه) \perp (Δ) .

(ط) المستوي المعين بالنقطة \mathfrak{h} والمستقيم (\mathfrak{w}) .

1) أثبت أن (ط) عمودي على (Δ) .

2) أثبت أن (ط) هو المستوي الوحيد الذي يحتوي على (\mathfrak{w}) ويعامد (Δ) .

38. 1) (Δ) مستقيم وم نقطة من (Δ) .

(ط) و ($\text{ط}'$) مستويان متقاطعان وتقاطعهما (Δ) .

(\mathfrak{w}) المستقيم من (ط) الذي يشمل \mathfrak{m} ويعامد (Δ) ؛ (\mathfrak{w}') المستقيم من ($\text{ط}'$) الذي يشمل \mathfrak{m} ويعامد (Δ) .

أثبت أنه يوجد مستو وحيد يشمل النقطة \mathfrak{m} ويعامد (Δ)

2) (Δ) مستقيم وم نقطة لا تنتمي إلى (Δ) ، (Δ') المستقيم الذي يشمل \mathfrak{m} ويواري (Δ) .

باستعمال نتيجة السؤال السابق ، أثبت أنه يوجد مستو وحيد يشمل النقطة \mathfrak{m} ويعامد المستقيم (Δ) .

39. (ط) مستو و \mathfrak{h} نقطة من الفضاء .

(\mathfrak{w}) و (\mathfrak{w}') مستويان متقاطعان من (ط) .

حسب الترين السابق نعلم أنه يوجد مستو وحيد (κ) يشمل \mathfrak{h} ويعامد (\mathfrak{w}) و يوجد مستو وحيد (κ') يشمل \mathfrak{h} ويعامد (\mathfrak{w}') .

أثبت أن المستويين (κ) و (κ') متقاطعان وأن مستقيم تقاطعهما (Δ) يعامد المستوى (ط) .

استنتج أنه يوجد مستقيم وحيد يشمل \mathfrak{h} ويعامد المستوى (ط)

40. نعتبر ، في مستو (ط) ، دائرة (ω) قطرها $\mathfrak{a} \mathfrak{b}$

(Δ) المستقيم العمودي على (ط) في النقطة \mathfrak{a} .

\mathfrak{h} نقطة من (Δ) و \mathfrak{h} نقطة من (ω) .

1) أثبت أن المستقيم ($\mathfrak{a} \mathfrak{h}$) عمودي على المستوى ($\mathfrak{h} \mathfrak{b}$) .

2) استنتاج أن المثلث $\mathfrak{h} \mathfrak{b} \mathfrak{a}$ قائم .

41. $\mathfrak{a} \mathfrak{b} \mathfrak{h}$ ، $\mathfrak{a} \mathfrak{b} \mathfrak{c}$ مثلثان متساويا الساقين وغير محتويين في نفس المستوى حيث

$\mathfrak{h} = \mathfrak{h} \mathfrak{b} \mathfrak{c}$ و $\mathfrak{a} \mathfrak{b} = \mathfrak{a} \mathfrak{c}$.

ي منتصف القطعة [أ ب]

1) أثبت أن المستقيم (أ ب) عمودي على المستوى (ح ي د).

2) أثبت أن المستقيمين (أ ب) و (ح د) متعامدان.

42. أ ب ح مثلث في مستوى (ط).

(Δ) المستقيم العمودي على (ط) في النقطة أ . م نقطة من (Δ).

م' نقطة من [ب ح] ؛ ب' نقطة من [م ح] وب'' نقطة من [أ ح]

حيث : $(M M') \perp (B H)$ و $(B B') \perp (M H)$ و $(B B'') \perp (A H)$

1) أثبت أن (أ م') عمودي على (ب ح).

2) أثبت أن (ب ب'') عمودي على المستوى (م أ ح).

3) أثبت أن (م ح) عمودي على المستوى (ب ب' ب'')

4) إذا كانت ه' نقطة تقاطع المستقيمين (أ م') و (ب ب'')

وكانت ه نقطة تقاطع المستقيمين (أ ب'') و (ب ب'')

أثبت أن (ه ه') عمودي على المستوى (م ب ح)

43. أ ب ح مستطيل في مستوى (ط).

(Δ) و (Δ') المستقيمان العموديان على (ط) في النقطتين ح ، د على الترتيب .

ه نقطة من (Δ) و ه' نقطة من (Δ') حيث $(B H) \perp (A H')$

1) أثبت أن (أ ب) عمودي على المستوى (أ د ه')

2) أثبت أن (أ ه') عمودي على المستوى (أ ب د)

3) أثبت أن (ب د) عمودي على المستوى (أ ب ه')

4) إذا كان ه منتصف القطعة [ب د] ، أثبت أن النقطة ه تتبع إلى المستوى

آخر لقطعة [أ ب].

44. أ ب ح مثلث في مستوى (ط).

نقطة تلافي أعمدته و (Δ) المستقيم عمودي على (ط) في النقطة ه . د نقطة

من (Δ) .

أثبت أن :

$(A D) \perp (B H)$ و $(B D) \perp (A H)$ و $(H D) \perp (A B)$.

45. أب ح د رباعي وجوه بحيث يكون $(\Delta) \perp (ab)$
و $(\Delta) \perp (ad)$.

المستقيم الذي يشمل النقطة د ويعامد المستوى (ab) يقطع هذا المستوى في النقطة د.

أثبت أن د هي نقطة تلاقى أعمدة المثلث أب ح.

46. 1) أب ح د مربع . عين مجموعة النقط د من الفضاء بحيث تكون الأطوال د، د ب، د ح، د د متساوية .

2) نفس السؤال إذا كان أب ح د مستطيلا .

3) نفس السؤال إذا كان أب ح د معينا .

47. (ط) و(ط') مستويان متعمدان .

(Δ) مستقيم عمودي على (ط) و(Δ') مستقيم عمودي على (ط') .

1) أثبت أن المستقيمين (Δ) و(Δ') متعمدان .

2) أثبت أن : (Δ) // (ط') و(Δ') // (ط)

48. لتكن ، في مستوى (ط) ، دائرة د قطرها أب .

(Δ) المستقيم العمودي على (ط) في النقطة د . ح نقطة من (Δ) .
د نقطة من (د) .

1) أثبت أن المستويين (حأد) و (ح ب د) متعمدان .

2) د' نقطة من القطعة [حأ].

المستوى (ك) الذي يشمل د' ويعامد (حأ) يقطع (ح ب د) في النقطة د' .

ويقطع (ح ب) في النقطة ب' .

أثبت أن المثلث 'أ' ب' د' قائم .

49. د دائرة في مستوى (ط) مركزها م .

(Δ) المستقيم العمودي على (ط) في النقطة م .

ح نقطة من (Δ) ؛ د نقطة من (د) و (د) الماس للدائرة د في النقطة د .

أثبت أن المستوى المعين بالنقطة ح والمستقيم (د) عمودي على المستوى (أب ح) .

50. أ ب ح د رباعي وجوه حيث : أ ب = ح د و أ د = ب د و أ ب = ب د .
ه منتصف القطعة [أ ب] و ه' منتصف القطعة [ح د] .

- 1) أثبت أن المستويين (ه ح د) و (ه' أ ب) متعامدان
- 2) أثبت أن المستوى (ه ح د) عمودي على المستويين (أ ب ح) و (أ ب د)
وأن المستوى (ه' أ ب) عمودي على المستويين (أ ح د) و (ب ح د) .

محتويات الكتاب

الجزء الأول

الباب الأول :

14	1. مبادئ في المطلق
23	2. الجمل المفتوحة والمكتملة
28	3. المطلق والمجموعات
35	4. أنماط البرهان
38	تمارين

الباب الثاني :

46	5. القواسم والمضاعفات
56	6. العمليات في المجموعة ح
64	7. المtribيات في المجموعة ح
69	8. حصر عدد حقيقي
78	تمارين

الباب الثالث :

90	9. مراجعة المفاهيم الأساسية في الهندسة المستوية
105	10.مجموعات فقط من المستوى
116	11. الإنشاءات الهندسية
121	تمارين

الباب الرابع :

134	12. العلاقات
142	13. الدوال والتطبيقات
154	14. العمليات الداخلية
166	تمارين

الباب الخامس :

182	15. أشعة المستوى
189	16. المحور والمعلم الخطري
202	17. العالم للمستوى
212	18. مركز المسافات المناسبة
220	19. المستقيم في الهندسة التحليلية
234	تمارين

الجزء الثاني

الباب السادس :	
20. كثيرات الحدود 4	
21. المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى 17	
22. المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية 33	
23. جمل معادلات وجمل متراجحات 57	
تمارين 76	
الباب السابع :	
24. الأقواس الموجهة 107	
25. الزوايا الموجهة 118	
26. حساب المثلث 129	
27. المعادلات المثلثية الأساسية 141	
تمارين 158	
الباب الثامن :	
28. عموميات على الدوال العددية لتغير حقيقي 173	
29. الدالة التآلفية 183	
30. الدالة $s \leftarrow a s^2 + b s + c$ 190	
31. الدالة $s \leftarrow \frac{a}{s}$ 204	
تمارين 211	
الباب التاسع :	
32. التحويلات النقطية في المستوى 230	
التناظر بالنسبة إلى مستقيم 235	
33. الانسحاب وتحاكي 240	
تمارين 251	
الباب العاشر :	
34. المستويات والمستقيمات في الفضاء 261	
35. التوازي في الفضاء 268	
36. التعامد في الفضاء 278	
تمارين 292	

